Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

WARFARINA



Nomenclatura Química:
3-alfa-fenil beta acetil etil 4-hidroxicumarina ó 4-hidroxi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)cumarina.
Clasificación Química: cumarina.
Acción: ingestión.

Uso: rodenticida.

Información General:

La warfarina produce hemorragias internas, sin ocasionar dolores ni convulsiones, característica ésta que no crea desconfianza, ni alarma en el resto de la colonia que lo sigue ingiriendo, ocasionando la muerte al cabo de 4 - 5 días de iniciada la aplicación.
Propiedades físicas y químicas del principio activo: cristales incoloros.
Punto de fusión 159 - 161 ºC. Solubilidad: prácticamente insoluble en agua, fácilmente soluble en acetona, moderadamente soluble en alcoholes.

Mecanismo de acción: anticoagulante.

Recomendaciones de uso: no manipular directamente este producto con las manos, pues el olor humano infunde desconfianza a los roedores y se abstienen de ingerir el producto. Para dosificar utilizar una cuchara u otro elemento.

Restricciones de uso: como rodenticida está exento de período de carencia.

Lugares de uso: en jardines, almacenes, depósitos, galpones, silos, áreas cultivadas y no cultivadas.
Colocar los cebos en lugares protegidos que permitan el paso de los roedores pero que impidan el acceso a animales de mayor tamaño. Convendrá también aplicar este producto en los caminos y salidas de las cuevas, para que el animal pise el producto. Las ratas por su natural instinto de limpieza se lamen las patas, ingiriendo así el veneno.

Modo de empleo: en los lugares frecuentados por las ratas, se colocarán pequeñas latitas o platillos chatos con suficiente cantidad de raticida, que deberá preparase previamente para formulaciones líquidas al 0,25% con 1 litro de producto más 9 litros de agua. La cantidad a colocar por platillo para la formulación líquida, será de 30 a 50 cm3 y para el caso del cebo al 0,025% de 50 - 100 g de raticida, que pueden ser aumentados a 450 g o más cuando se trata de combatir un proceso de infestación de ratas en el interior de grandes galpones o depósitos. La dosis de raticida deberá ser repetida diariamente, hasta que se observe que ya no son ingeridas, lo que permitirá presumir que las ratas han muerto y pronto deberá buscárselas en las inmediaciones de sus refugios para enterrarlas o quemarlas.

Derrames:
Humedecer con agua cuidadosamente el material sólido para evitar que se disperse. Juntar el material en
recipientes bien cerrados, Lavar al área del derrame con agua. Debe impedirse que las aguas de lavado penetren en los sumideros superficiales. El producto
derramado no puede ser reutilizado y se debe eliminar según legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

DL 50 para ratas: 3 mg/kg.

No tóxico para abejas.
Se produce la muerte luego de 3 días seguidos de una dosis de 3 mg/kg para gatos y de 1mg/kg para cerdos.
Antídoto: vitamina K por vía oral o endovenosa y combinado con transfusiones de sangre.
Para mayor información ver el capítulo “Intoxicaciones con Productos Fitosanitarios”, específicamente el tema rodenticidas anticoagulantes tipo cumarínicos e idandionas.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.

Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE