ZETAMETRINA

Marcas comerciales: BISTAR 20 EW - FENIX 20 EW - FURIA - FURIA 18 EC - FURY 20 EW - MUSTANG 20 EW - PROFIT 18 EC - PROFIT 40 CE.

Nomenclatura Química:
zetametrina: S-cyano(2-fenoxifenil) metil (±) cis/trans 3-(2,2-dicloroetenil)-2,2 dimetilciclopropano carboxilato
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: piretroide.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Algodón	Oruga de la hoja (*Alabama argillacea)*	PC 18%: 20 - 30 cm3/ha PC 40%: 10 a 15 cm3/ha	14	Cuando se observe una infestación generalizada de 5 orugas/planta. Repetir si hay re-infestación. Las dosis recomendadas sólo controlan larvas entre el 1° y 3° estadio.
	Oruga del capullo del algodonero (*Helicoverpa gelotopoeon)*	PC 18%: 85 - 100 cm3/ha PC 40%: 40 a 50 cm3/ha		Cuando el 10% de los capullos tengan larvas o daños producidos por las mismas o 20 larvas cada 100 plantas.
	Picudo del algodonero (*Anthonomus grandis)*	PC 18%: 170 - 220 cm3/ha PC 40%: 80 a 100 cm3/ha		Aplicar con 7 a 10% de botones florales atacados y/o ante la presencia de 2 adultos en 100 pimpollos y/o cápsulas. La dosis menor sólo debe ser usada con bajos niveles de infestación. Repetir las aplicaciones hasta que se encuentre bajo nivel de daño.
Girasol	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)*	PC 18%: 100 cm3/ha PC 40%: 50 cm3/ha	30	Cuando se observen 5 orugas por planta.
	Oruga cortadora (*Agrotis spp.)*	PC 18%: 70 - 85 cm3/ha PC 40%: 40 cm3/ha		Aplicación curativa: cuando se registre 1 oruga y 2 plántulas cortadas cada 15 metros de surco.
		PC 18%: 85 - 100 cm3/ha PC 40%: 40 a 50 cm3/ha		Aplicación preventiva en pre emergencia del cultivo.
Maíz		PC 18%: 70 - 85 cm3/ha PC 40%: 40 cm3/ha		Aplicación curativa: cuando se registre 5% de plántulas dañadas y 2 orugas/100 plantas.
		PC 18%: 85 - 100 cm3/ha PC 40%: 40 a 50 cm3/ha		Aplicación preventiva en pre emergencia del cultivo.
Soja	Alquiche chico (*Edessa meditabunda)* Chinche de la alfalfa (*Piezodorus guildinii)* Chinche marrón (*Dichelops furcatus)* Chinche verde (*Nezara viridula)*	PC 18%: 220 - 250 cm3/ha PC 40%: 110-125 cm3/ha		PC 18%: Aplicar cuando se observe 1 chinche cada 3 m/lineales (Muestreo con paño vertical. Distancia entre hileras: 0,52 m. Evitar monitorear en horas de mayor temperatura e insolación). PC 40%: Aplicar cuando se observen 2 chinches por metro lineal de surco. Utilizar las dosis mayores cuando la infestación sea más intensa.
	Barrenador del brote (*Epinotia aporema)*	PC 18%: 100 cm3/ha en mezcla solamente. PC 40%: 50 cm3/ha en mezcla solamente.	14	Antes de la floración cuando se detecte 30% de brotes atacados y a partir de floración cuando se observen los primeros daños a flores y vainas. Mezclar esta dosis con 650 cm3/ha de clorpirifos 48%.
	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)* Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)* Oruguita verde (*Loxostege bifidalis)*	PC 18%: 80 - 100 cm3/ha PC 40%: 25 a 30 cm3/ha		PC 18%: Aplicar con 5 orugas mayores de 2 cm y hasta 10 orugas menores de 2 cm, preferentemente antes del cierre del surco. Tener en cuenta el estado fenológico, condición hídrica, espaciamiento entre hileras y grupo de madurez. PC 40%:Dosificar de acuerdo al desarrollo del cultivo y grado de infestación. Antes de floración con 15 orugas por metro de surco y más de 20 % de defoliación. Desde floración, cuando haya 10 orugas por metro lineal de surco y más de 10 % de daño al follaje.
	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)*	PC 18%: 80 - 100 cm3/ha PC 40%; 40 cm3/ha		

Información General:

La zetametrina es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión.
Para la aplicación, emplear equipos de aspersión a mochila o motorizados, perfectamente calibrados y provistos de agitadores.
En aplicaciones aéreas, se recomienda emplear caudales no inferiores a 8 l/ha cuando se utilice como vehículo agua.

Uso: insecticida (20 % EW).

Cultivo	Plaga	Dosis	Momento de Aplicación
Algodón	Oruga capullera (*Heliothis spp.)*	80 - 100 cm3/ha	Cuando el 10% de los capullos tengan larvas o daños producidos por las mismas o 20 larvas cada 100 plantas.
	Oruga de la hoja (*Alabama argillacea)*	20 - 30 cm3/ha	Cuando se observe una infestación generalizada de 5 orugas por planta. Las dosis indicadas solo controlan los tres (3) primeros estadios larvales.
	Picudo del algodonero (*Anthonomus grandis)*	160 - 200 cm3/ha	Aplicar con 7 a 10% de botones florales atacados y/o ante la presencia de 2 adultos. La dosis menor sólo debe ser usada con bajos niveles de infestación. Repetir las aplicaciones hasta que la plaga se encuentre bajo nivel de daño.
Girasol	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)*	100 cm3/ha	Cuando se observen 5 orugas por planta.
	Oruga cortadora (*Agrotis spp.)*	80 - 100 cm3/ha	Aplicación preventiva en pre emergencia del cultivo.
		80 cm3/ha	Aplicación curativa: cuando se registre 1 oruga y 2 plántulas cortadas cada 15 metros de surco.
Maíz		80 - 100 cm3/ha	Aplicación preventiva en preemergencia del cultivo.
		80 cm3/ha	Aplicación curativa: cuando se registre 5% de plántulas dañadas y 2 orugas cada 100 plantas.
Maíz	Chinche de los cuernos (*Dichelops furcatus)*	250 - 300 cm3/ha	Aplicar antes de la emergencia del cultivo. Utilizar la menor dosis cuando se haya detectado 1 chinche/m2* y la mayor dosis ante infestaciones superiores o preventivamente en lotes con ataques el año anterior.
Soja	Barrenador del brote (*Epinotia aporema)*	100 cm3/ha (en mezcla solamente).	Antes de la floración cuando se detecte 30% de brotes atacados y a partir de floración cuando se observen los primeros daños a flores y vainas. Mezclar esta dosis con 650 cm3/ha de clorpirifós 48%.
	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)* Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)* Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)* Oruguita verde (*Loxostege bifidalis)*	70-90 cm3/ha	Aplicar con 5 orugas mayores de 2 cm. y hasta 10 orugas menores de 2 cm., preferentemente antes del cierre de surco. Tener en cuenta el estado fenológico, condición hídrica, espaciamiento entre hileras y grupo de madurez.

Derrames:
Se debe aislar y marcar el área del derrame. Vestir ropas protectoras y usar equipos de protección personal. Mantener a los animales y personas sin protección adecuada alejados del área.
Evitar que el producto alcance corrientes o fuentes de agua. Hacer endicamientos de manera de confinar el derrame y proceder a absorberlo con una sustancia absorbente, como arcilla, arena o tierra. Recoger o bombear los desperdicios en un tambor y proceder a identificarlo.
Para limpiar y neutralizar el área del derrame, herramientas y equipos, lavar con una solución que se encuentre disponible (p. ej. lavandina, o soda cáustica y etilenglicol).
Posteriormente lavar el área con un jabón fuerte y agua. Absorber como antes todos los excesos de liquido y agregarlos a los tambores de desperdicios.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Ventilación: se deben usar extractores en todos los procesos donde se emita vapor o polvo. Se deben ventilar los vehículos de transporte antes de proceder a descargarlos.
Ropa de trabajo: de acuerdo a las concentraciones encontradas vestir overolls o uniformes de mangas largas y cobertura para la cabeza. Para mayores exposiciones, como en el caso de derrames, usar un traje que actúe como barrera total, del tipo de impermeable de goma. Todos los artículos de cuero que puedan haber sido contaminados, tal como zapatos, cinturones y correas de relojes, deben ser retirados y destruidos. Se debe lavar toda la ropa de trabajo antes de volver a usarla; esto debe hacerse por separado de la ropa de hogar.
Protección ocular: se debe usar antiparras o una máscara de cara en el caso de exposición a vapor, salpicaduras o polvo.
Protección respiratoria: en caso de exposición a vapor, salpicaduras o polvo, usar como mínimo un respirador-purificador de media cara o cara completa aprobado para pesticidas por una organización de certificación como U.S. NIOSH/MSHA, EU CEN o similar. La selección del respirador debe basarse en las concentraciones encontradas en el aire.
Guantes: usar guantes protectores para productos químicos, confeccionados en materiales como nitrilo, neoprene o de la marca Viton ®. Debe lavarse cuidadosamente el exterior de los guantes con agua y jabón antes de quitárselos. Se los debe inspeccionar regularmente para detectar rajaduras.
Higiene personal: debe haber disponible agua limpia para lavado en caso de contaminación de piel u ojos. Lavar la piel antes de comer, beber o fumar. Bañarse al finalizar el día de trabajo.

Información Toxicológica:

Del formulado al 18%

Toxicidad oral aguda:	DL50: 198 mg/kg
Toxicidad dermal aguda:	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: 1,36 mg/l (4h)
Irritación dermal:	Moderado irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Del formulado al 20%

Toxicidad oral aguda:	DL50: 200 mg/kg
Toxicidad dermal aguda:	DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: 5,97 mg/l
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Del formulado al 40%:

Toxicidad oral aguda:	DL50: 137,5 mg/kg
Toxicidad dermal aguda:	DL50: > 722,2 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: 3,10 mg/l
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Moderadamente tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces e invertebrados acuáticos:	Extremadamente tóxico

Primeros auxilios: en caso de ingestión accidental, dar papilla de carbón activado y purgante salino no oleoso (30 g de sulfato de sodio). Procurar asistencia médica de inmediato. Por salpicaduras en piel u ojos enjuagar con abundante agua limpia.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
BISTAR 20 EW	FMC	38289	EW	20%	II
FENIX 20 EW	FMC	38647	EW	20%	II
FURIA	FMC	32672	EC	18%	II
FURIA 18 EC	FMC	38383	EC	18%	II
FURY 20 EW	FMC	35047	EW	20%	II
MUSTANG 20 EW	FMC	35162	EW	20%	II
PROFIT 18 EC	FMC	38140	EC	18%	II
PROFIT 40 CE	FMC	33745	EC	40%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.