ZINEB

Nomenclatura Química:
zineb: etilen-bisditiocarbamato de zinc.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: ditiocarbamato.
Acción: de contacto y preventiva.

Uso: fungicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Acelga	Viruela de la acelga y remolacha (*Cercospora beticola)*	PC 70%: 200 - 250 g/hl	15	Cuando aparezcan las primeras manchas o con condiciones climáticas favorables a la enfermedad; repetir cada 10 - 15 días.
Ajo Cebolla	Mildiu del ajo y la cebolla (*Peronospora destructor)*	PC 70%: 250 - 300 g/hl	10	Al aparecer los primeros signos, repetir cada 10 - 15 días.
	Roya del ajo y la cebolla (*Puccinia porri)*	PC 70%: 200 - 250 g/hl		
Almácigos	Mal de los almácigos (*Rhizoctonia spp.)*			La primera aplicación cuando nacen las plantitas, repitiendo semanalmente y después de riesgos o lluvias.
Apio	Viruela del apio (*Cercospora apii)*	PC 70%: 200 g/hl	15	Desde al almácigo; repitiendo cada 10 - 15 días.
Arveja o alverja	Roya de la arveja (*Uromyces pisi)*	PC 70%: 180 - 250 g/hl	10	Al aparecer los primeros signos, repetir cada 10 - 15 días.
Berenjena	Tizón temprano de la papa (*Alternaria solani)*	PC 70%: 200 g/hl	15	Desde el trasplante, repitiendo cada 10 - 12 días.
Cítricos o citrus	Acaro del tostado, Plateado de los limones, Naranja negra (*Phyllocoptruta oleivora)*	PC 70%: 100 - 160 g/hl	10	A la caída de los pétalos; repetir si se observa incremento en la población de ácaros.
	Antracnosis de los citrus (*Colletotrichum gloeosporioides)* Melanosis (*Diaporthe citri)* Sarna del naranjo agrio (*Sphaceloma fawcettii var. scabiosa)* Sarna del naranjo dulce (*Sphaceloma fawcettii var.viscosa)*	PC 70%: 180 - 250 g/hl		Primera aplicación: antes de la floración. Segunda aplicación: con la fruta cuajada y del tamaño de una arveja. En ataques fuertes, repetir a las 2 - 3 semanas.
Clavel	Mancha gris del clavel (*Alternaria dianthicola)* Roya del clavel (*Uromyces dianthi)* Viruela del clavel (*Septoria dianthi)*			Aplicaciones semanales preventivas antes de la floración; después de ésta, repetir cada 2 - 3 semanas según condiciones climáticas.
Crisantemo	Mancha parda de la hoja (*Septoria chrysanthemi)* Roya del crisantemo (*Puccinia tanaceti)*			Aplicaciones preventivas antes y después de la floración, repitiendo si predomina alta temperatura y humedad.
Dalia	Mancha parda de la dalia (*Entyloma calendulae var. dahliae)*	PC 70%: 200 g/hl		Al observarse los primeros signos, repitiendo cada 10 - 15 días, según condiciones climáticas.
Espárrago	Roya del espárrago (*Puccinia asparagi)*	PC 70%: 180 - 200 g/hl	15	Al aparecer los primeros signos, repetir cada 10 - 15 días, según condiciones climáticas.
Frutales de carozo	Mal de la munición (*Stigmina carpophila)*	PC 70%: 200 - 250 g/hl		Ver: Restricciones de Uso en Información General. Al hincharse las yemas y después de formados los frutos. En otoño, antes de caer las hojas, con la dosis mayor.
	Podredumbre morena de los frutales (*Monilia cinerea)* Podredumbre morena de los frutales (*Monilinia fructicola)* Sarna de los frutales de carozo (*Fusicladium carpophilum)*	PC 70%: 180 - 250 g/hl		Ver: Restricciones de Uso en Información General. Después de formado el fruto: repetir cada 10 - 20 días, según condiciones climáticas.
	Torque (*Taphrina deformans)*	PC 70%: 200 - 250 g/hl		Ver: Restricciones de Uso en Información General. Al hincharse las yemas y en otoño antes de caer las hojas.
Garbanzo	Roya del poroto (*Uromyces appendiculatus)*	PC 70%: 180 - 250 g/hl	10	Al aparecer los primeros signos, repetir cada 10 - 15 días.
Gladiolo	Viruela del gladiolo (*Septoria gladioli)*	PC 70%: 200 g/hl		Al observarse los primeros signos, repitiendo cada 10 - 15 días, según condiciones climáticas.

Manzano Peral	Sarna del manzano (*Venturia inaequalis)* Sarna del peral (*Venturia pirina)*	PC 70%: 200 - 250 g/hl	20	No menos de 4 aplicaciones: al hincharse las yemas, antes de la floración, a la caída de los pétalos y 10 días después. Repetir si las condiciones son favorables a la enfermedad. Seguir las indicaciones del Servicio de Alarma, donde lo hubiere.
Melón Pepino	Antracnosis de las cucurbitáceas (*Colletotrichum lagenarium)* Mildiu de las cucurbitáceas (*Pseudoperonospora cubensis)*	PC 70%: 200 - 300 g/hl	10	Al aparecer los primeros signos, repetir cada 8 - 10 días.
Papa	Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)* Tizón temprano de la papa (*Alternaria solani)*	PC 70%: 200 - 250 g/hl	7	Aplicar 1,8 - 2,5 kg/ha cualquiera sea el equipo usado. Cuando las plantas tienen 15 - 20 cm. Repetir cada 7 días, hasta la declinación. Seguir las indicaciones del Servicio de Alarma donde lo hubiere.
Pimiento	Viruela del pimiento (*Cercospora capsici)*		15	Cuando aparezcan las primeras manchas o con condiciones climáticas favorables a la enfermedad; repetir cada 10 - 15 días.
Poroto	Roya del poroto (*Uromyces appendiculatus)*	PC 70%: 180 - 250 g/hl	10	Al aparecer los primeros signos, repetir cada 10 - 15 días.
Remolacha	Viruela de la acelga y remolacha (*Cercospora beticola)*	PC 70%: 200 - 250 g/hl		Cuando aparezcan las primeras manchas o con condiciones climáticas favorables a la enfermedad; repetir cada 10 - 15 días.
Rosales	Mancha negra del rosal (*Diplocarpon rosae)* Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)* Roya del rosal (*Phragmidium mucronatum)*	PC 70%: 180 - 250 g/hl		Al comenzar la brotación, repitiendo cada 10 - 15 días según condiciones climáticas.
Sandía Zapallo criollo Zapallo de angola	Antracnosis de las cucurbitáceas (*Colletotrichum lagenarium)* Mildiu de las cucurbitáceas (*Pseudoperonospora cubensis)*	PC 70%: 200 - 300 g/hl	10	Al aparecer los primeros signos, repetir cada 8 - 10 días.
Tabaco	Moho azul del tabaco (*Peronospora tabacina)*		20	Iniciar en el almácigo desde que las plantas tienen 1 cm de altura hasta el trasplante, cada 4 - 8 días y luego de lluvias o riegos. Aplicar 2 - 4 litros de solución cada 10 m2 de almácigo, la dosis mayor para las últimas aplicaciones.
Tomate	Antracnosis del tomate (*Colletotrichum phomoides)* Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)* Tizón temprano de la papa (*Alternaria solani)* Viruela del tomate (*Septoria lycopersici)*	PC 70%: 200 - 250 g/hl	15	Aplicar 1,8 - 2,5 kg/ha cualquiera sea el equipo usado. Cuando las plantas tienen 15 - 20 cm. Repetir cada 7 días, hasta la declinación. Seguir las indicaciones del Servicio de Alarma donde lo hubiere.
Vid	Antracnosis de la vid (*Sphaceloma ampelinum)* Peronóspora (*Plasmopara viticola)* Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)* Podredumbre negra de la vid (*Phoma uvicola)*	PC 70%: 200 - 300 g/hl	10	Iniciar cuando los sarmientos tienen 6 - 8 cm; repetir antes de la floración y después de cuajado el fruto. Si hay condiciones favorables a la enfermedad, continuar hasta que la fruta esté pintona.

Información General:

Propiedades físicas y químicas del principio activo: polvo con ligero color, prácticamente inodoro. Al calor se descompone a 157 ºC, sin fundirse.
Presión de vapor: insignificante. Densidad (20 ºC): aproximadamente 1,74.
Solubilidad (a temperatura ambiente): cerca de 10 mg/l de agua; escasamente soluble en solventes orgánicos comunes. Inestable a la luz excesiva y a humedad.

Compatibilidad: este producto puede usarse con la mayoría de los insecticidas y fungicidas, excepto con los de reacción alcalina (como caldo bordelés, oxicloruro de cobre o polisulfuro de calcio).
Las mezclas deben utilizarse inmediatamente.

Equipos de aplicación: puede aplicarse con todo tipo de pulverizadoras, terrestres o de mochila, manuales o motorizadas, que aseguren una cobertura correcta del cultivo a tratar.

Recomendaciones de uso: por ser un fungicida preventivo, es necesario cubrir bien los brotes, hojas y frutos antes que se produzca el ataque de los hongos patógenos.
Los intervalos entre pulverizaciones no son estrictos y deben acortarse si se produce una lluvia o si las condiciones climáticas son favorables al desarrollo de las enfermedades (alta temperatura y humedad).

Restricciones de uso:
- Suspender los tratamientos: papa, 7 días antes de la cosecha; ajo, cebolla, arveja, cítricos, garbanzo, melón, pepino, poroto, sandía, zapallo y vid, 10 días antes de la cosecha; acelga, apio, berenjena, espárrago, pimiento y tomate, 15 días antes de cosecha; manzano, peral y tabaco, 20 días antes de la cosecha.
- Florales y ornamentales: sin restricciones.

Derrames:
Tanto el producto como su dilución derramada se debe neutralizar con una solución de soda cáustica o cal. Posteriormente agregar material adsorbente (arena o tierra). Barrer y disponer en contenedores bien identificados como así también el agua de lavado para su posterior eliminación. Lavar el área con abundante agua o solución detergente. No contaminar fuentes de agua.

Clasificación (modo o sitio de acción): M3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Evitar la inhalación, el contacto con la piel, ojos y la contaminación de alimentos. Usar ropa apropiada, sombrero, careta, antiparras, guantes y botas de goma durante la aplicación. Después del tratamiento del día, lavarse con abundante agua y jabón las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. No beber, comer o fumar durante el tratamiento con este producto. No destapar los picos pulverizadores con la boca. No pulverizar contra el viento. Lavar la ropa usada durante el tratamiento, con agua caliente y jabón. No utilizar este envase para conservar alimentos o agua para consumo, ni otro destino.

Información Toxicológica:

Consultar la información toxicológica que corresponda al producto registrado.

Riesgos ambientales: no tóxico para abejas. Tóxico para peces. Baja toxicidad para la fauna silvestre.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional. Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.