CYPRODYNIL + FLUDIOXONIL

Marcas comerciales: SWITCH 62,5 WG.

Nomenclatura Química:
cyprodinil: (4 ciclopropil-6-metil-pirimidin-2-il)-fenil-amina
fludioxonil: .4-(2,2-difloruro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pirrol-3-carbonitrilo
Tipo de producto: químico
Clasificación Química: pirimidinamina + fenilpirrol.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Arándano	Moho gris (*Botrytis cinerea)*	120-200 g/100 l de agua Asegurar dosis aproximadas de 600-1000 g/ha	1 (*)	Aplicar preventivamente, ante condiciones predisponentes para la enfermedad, desde floración hasta 1 día antes de la cosecha.
Frutilla		120 g/100 l de agua (****) 500 - 600 g/ha		Aplicar bajo condiciones predisponentes (más de 3 días con tiempo nublado y fresco) o primeros síntomas de Botrytis spp. En ausencia de enfermedad, emplear la dosis más baja; en caso contrario subir la dosis. En caso de presentarse nuevamente condiciones predisponentes 10 días después de la aplicación, volver a aplicar. No realizar más de dos aplicaciones en la campaña. Puede producir fitotoxicidad si se producen diferencias de temperaturas superiores a 15 °C entre el día y la noche luego de la aplicación. Evitar las mezclas con productos emulsionables o coadyuvantes.
Tomate		600 - 1000 g/ha 80 - 100 g/100 l de agua (**)	3 (*)	Aplicar bajo condiciones predisponentes (más de 3 días con tiempo nublado y fresco) o primeros síntomas de Botrytis. En ausencia de enfermedad emplear dosis más baja; en caso contrario subir la dosis. En caso de presentarse nuevamente condiciones predisponentes 10 días después de la aplicación, volver a aplicar. No realizar más de 2 aplicaciones en la campaña. Puede producir fitotoxicidad si se producen diferencias de temperaturas superiores a los 15°C entre el día y la noche luego de la aplicación. Evitar las mezclas con productos emulsionables o coadyuvantes.
Vid (uva de mesa y uva de vino)	Complejo de podredumbre ácida (*Penicillium spp.; aspergillus spp.)* Complejo de podredumbre ácida (*Alternaria spp.; rhizopus spp.)*	800 g/ha 100 g/100 l de agua (***)	1 (*)	Realizar dos aplicaciones. 1) Una primera aplicación entre floración y cierre de racimos, en el momento de presentarse condiciones predisponentes (lloviznas o rocío intenso), para asegurar la sanidad el momento de envero. 2) Realizar una segunda aplicación en forma preventiva, 21 días antes de cosecha, para proveer protección hasta la post cosecha.
	Moho gris (*Botrytis cinerea)*			Se recomiendan aplicaciones preventivas en cierre de racimos para una buena protección hasta el envero. Es conveniente repetir la aplicación 21 días antes de cosecha para asegurar la conservación en post cosecha.

(*) En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
(**) Estimado en base a un volumen de aplicación de 750-1000 l/ha de agua.
(***) Estimado en base a un volumen de aplicación de 800 l/ha de agua.
(****)Estimado en base a un volumen de aplicación de 350-450 l/ha de agua.

Información General:

Fungicida con propiedades de contacto y sistémicas para el control de Botrytis (Botrytis cinerea), en los cultivos de vid, tomate, frutilla y arandanos, y el Complejo de podredumbre ácida (Aspergillus spp., Alternaria spp., Rhizopus spp. y Penicillum spp.) en el cultivo de vid. Combina las propiedades de sus dos principios activos, que actúan de forma diferente, disminuyendo así las probabilidades de desarrollo de resistencia. Interfiere en el ciclo de vida del hongo, principalmente durante los procesos de germinación de conidios, desarrollo del tubo germinativo, penetración y desarrollo del micelio dentro de los tejidos de la planta. El componente sistémico muestra una buena y rápida penetración en las hojas. Tiene buena traslocación acrópeta y traslaminar. Posee óptimas propiedades en lo que respecta a su actividad, resistencia al lavado, independencia de la temperatura y muy buena translocación.

Preparación: granulado dispersable en agua.
Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:
- Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen.
- Poner a funcionar el sistema de agitación.
- Agregar la cantidad necesaria de producto directamente al tanque y sin disolución previa, de acuerdo a la calibración realizada.
- Con el sistema de agitación en movimiento, verificar que el producto se disuelva completamente.
- Si se desea agregar cualquier otro producto, hacerlo a continuación sin detener la agitación (en caso de mezclar con productos envasados en bolsas solubles, agregar primero al agua las bolsas solubles y luego este producto). Mientras se sigue agitando, agregar más agua.

- Cuando el tanque esté lleno hasta sus 3/4 partes, se pueden agregar formulaciones líquidas.
- Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión.
- Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
- Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
- Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: debe aplicarse sobre el cultivo en el volumen necesario para lograr una buena cobertura. Se deben lograr al menos 50-70 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo a proteger. Se recomienda utilizar la cantidad de agua necesaria, de acuerdo al estado de desarrollo del cultivo, a fin de lograr una excelente cobertura del mismo. Evitar que se produzca escurrimiento por exceso de agua. Para equipos terrestres, utilizar volúmenes alrededor de 600 l/ha (no superar los 1000 l/ha). Los equipos de aplicación deberán estar correctamente calibrados con agua antes de la aplicación, con sus picos limpios y en buenas condiciones, para lograr una cobertura uniforme.
NO realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Restricciones de uso:
NO aplicar cuando se esperen diferencias de temperatura superiores a 15°C entre el día y la noche.
NO aplicar a través de ningún sistema de riego.
NO reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Advertencia: la experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes a los fungicidas, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento. Dado que la empresa no puede prever el desarrollo de una resistencia, la empresa no asume responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida resultante de la falta de actividad del producto contra estas posibles cepas resistentes. Para evitar la generación de resistencia rotar con fungicidas de diferente modo de acción.

Compatibilidad: es compatible con insecticidas y acaricidas usados corrientemente. Sin embargo, si se realizan aplicaciones con mochila, las mezclas con insecticidas líquidos y otros fungicidas pueden ser incompatibles. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Sólido: recoger con pala el producto derramado y la capa superficial de suelo afectado. Caldo de pulverización: contener y adsorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra). Barrer el producto absorbido y recoger. Depositar los derrames en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 9 (FRAC) + 12 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma.

Información Toxicológica:

Producto formulado:
DL 50 oral aguda: > 5000 mg/kg (rata)
DL 50 dermal aguda: > 2000 mg/kg (conejo)
LC50 inhalatoria = >2,51 mg/l (ratas)

Leve irritante dermal y ocular. No sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:
Moderadamente tóxico para peces. Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Prácticamente no tóxico para aves.
Virtualmente no tóxico para abejas.
No contaminar forrajes, estanques ni cursos de agua. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
SWITCH 62,5 WG	SYNGENTA AGRO	34163	WG	37,5% + 25%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.