AZOXISTROBINA + FLUDIOXONIL + METALAXIL - M

Marcas comerciales: DYNASTY CST SEMILLERO.

Nomenclatura Química:
azoxistrobina: metil (E)-2-{2-[6-(2-cianofenxi)pirimidin-4-iloxi]fenil}-3-metoxiacrilato.
fludioxonil: 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pirrol-3-carbonitrilo.
metalaxil-M: N-(2,6-dimetilfenil)-N-(2'-metoxiacetil)-D-alanina metil ester.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: estrobilurina + fenilpirrol + acilalanina.
Acción: sistémica.

Uso: curasemillas.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Momento de Aplicación
Algodón	Hongos del suelo (*Pythium spp.)* Hongos del suelo (*Fusarium spp.)* Hongos del suelo (*Rhizoctonia spp.)*	200 cm3/100 kg de semilla.	Se debe aplicar sobre las semillas a tratar en forma de dilución (slurry). La dilución, para 100 kg de semilla de algodón, se prepara agregando 1600-1800 cm3 de agua limpia a la dosis indicada de producto, logrando un volumen de dilución de 1800-2000 cm3/100 kg de semillas.

Información General:

Es un formulado de uso exclusivo en criaderos y/o semilleros.
Es un fungicida terápico para el tratamiento semillas de algodón, siendo efectivo en el control de un amplio espectro de hongos del suelo que afectan la emergencia y la fase de establecimiento de plantas del cultivo. Contiene en su formulación tres principios activos (azoxistrobina, fludioxonil y metalaxil-M) con tres modos de acción distintos. La azoxistrobina, perteneciente al grupo de las estrobilurinas, posee un amplio espectro de control y tiene cierto efecto de absorción sistémica por las raíces, aumentando la protección de las plántulas. Su acción fungicida resulta de la inhibición de la respiración mitocondrial en los hongos, debido a que previene la transferencia de los electrones entre el citocromo b y el citocromo c.
El fludioxonil, perteneciente al grupo de los fenilpirroles, controla un amplio espectro de hongos de la semilla y del suelo, cuando a través de la interferencia que realiza en el proceso de regulación osmótica de la membrana celular, lo que provoca la ruptura de las células fúngicas. Por otra parte, el metalaxil-M, perteneciente a la clase química de las fenilamidas, es un fungicida específico contra Oomycetes, que penetra la cubierta seminal y es sistemáticamente traslocado a todas las partes de la planta durante la germinación. Este activo actúa interfiriendo el proceso de síntesis de proteínas.
Debe ser usado exclusivamente con agregado de colorante o polímero o simultáneamente con otro terápico para tratamiento de semillas que tenga color en su formulación.

Preparación: el producto se debe aplicar sobre las semillas a tratar en forma de dilución (slurry). La dilución, para 100 kg de semilla de algodón, se prepara agregando 1600-1800 cm3 de agua limpia a la dosis indicada de producto, logrando un volumen de dilución de 1800 - 2000 cm3/100 kg de semillas.
Para la preparación de la dilución (slurry), respetar las siguientes indicaciones:
- Añadir agua al recipiente en donde se preparará la mezcla hasta la mitad del volumen total.
- Agregar luego la cantidad necesaria de producto, según la cantidad de semillas a tratar.
- Agitar en forma mecánica o manual, asegurando una mezcla homogénea.
- Otros productos compatibles pueden ser adicionados (insecticidas, colorantes, coadyuvantes).
- Completar con agua hasta el volumen total de dilución.
- Mantener la agitación durante todo el tiempo de uso.
- La dilución debe ser usada dentro de las 24 horas de preparada.
- Utilizar siempre agua limpia.

Este producto está especialmente diseñado para uso exclusivo en criaderos y/o semilleros.
Debido a su presentación incolora, debe agregarse un colorante para tratamiento de semillas, o bien mezclarse con curasemillas coloreados. También puede usarse en semillas que hayan sido previamente tratadas con curasemillas coloreados.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: el producto está formulado como una suspensión concentrada incolora para ser aplicada sobre las semillas de algodón. Para obtener una buena protección de cultivo es indispensable distribuir el producto homogéneamente, asegurando la cobertura uniforme de cada semilla. Se debe aplicar diluido por medio de un equipo para tratamiento de semillas.
NO aplicar directamente dentro de la sembradora. En el momento de la siembra, se debe calibrar la sembradora con semilla tratada con el producto, debido a que la semilla fluirá más lentamente.

Restricciones de uso: debido a su presentación incolora, este formulado es de uso exclusivo en criaderos y/o semilleros.

Período de carencia: exento para el uso como curasemillas. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Atención: la venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra está penada por la ley. La ley 18073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados al consumo humano o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas), la ley dictamina el decomiso y multa. Piense que una sola bolsa de semilla curada mezclada en varios silos de granos para el consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa para la alimentación humana o animal, por lo tanto los infractores serán severamente penados.

Compatibilidad: compatible con polímeros para recubrimiento de semillas y con polvos dispersables o suspensiones concentradas para tratamiento de semillas de reacción neutra (por ejemplo: tiametoxam 35% y 60%).
NO es compatible con formulaciones basadas en solventes orgánicos. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para el cultivo.

Fitotoxicidad: cuando es usado siguiendo las recomendaciones que figuran en el marbete, es bien tolerado por todas variedades de algodón. En caso de dudas, evaluar previamente la tolerancia del cultivo.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 11 (FRAC) + 12 (FRAC) + 4 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No fumar ni comer durante el tratamiento de la semilla, ni durante la manipulación de semilla tratada. En preparaciones prolongadas y sin la debida protección puede irritar la piel.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiar la ropa de trabajo y lavarla inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón, especialmente las manos, la cara y la piel expuesta. Guardar el sobrante en su envase original, bien cerrado. Limpiar el equipo aplicador, el lugar de trabajo y de almacenamiento de semilla tratada. Evitar el contacto con la semilla tratada durante su manipuleo (movimiento de bolsas, apertura de bolsas y llenado de cajón sembrador).

Información Toxicológica:

DL 50 oral aguda: >5000 mg/kg (rata)
DL 50 dermal aguda: > 5000 mg/kg (rata)
LC50 inhalatoria: >5,34 mg/l

Leve irritante dermal. Moderado irritante ocular. Sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:
Moderadamente tóxico para peces.
Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Prácticamente no tóxico para aves.
Virtualmente no tóxico para abejas.
Las semillas tratadas deben ser enterradas adecuadamente y deben ser completamente cubiertas por el suelo. Si quedara tratada, recogerla o enterrarla para evitar que sea ingerida por aves u otros animales.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
DYNASTY CST SEMILLERO	SYNGENTA AGRO	34302	FS	7,5% + 1,25% + 3,75%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.