FLUCARBAZONE SODICO

Marcas comerciales: EVEREST 70 WDG.

Nomenclatura Química:
flucarbazone sódico: sal sódica de 4,5-dihidro-3 metoxi-4 metil-5-oxo-N-(2-trifluorometoxi fenil sulfonil)-=1H-1,2,4-triazole-1-carboxamida
Tipo de productos: químico.
Clasificación Química: triazolinona.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Avena guacha, Avena negra (*Avena fatua)*	60 - 80 g/ha (*)	80	Estas dosis pueden aplicarse como producto solo o en mezcla con herbicidas graminicidas o latifolicidas (hormonales, hidroxibenzonitrilos o sulfonilureas). Se deberá agregar al caldo un coadyuvante no iónico al 0,25% de concentración (250 ml por cada 100 litros de agua y/o aceite coadyuvante parafínico metoxilado al 0,25%. No utilizar coadyuvantes siliconados. Iniciar los tratamientos antes que el trigo alcance el estado de 1 a 2 macollos (preferentemente 1 a 6 hojas) para una mayor selectividad del producto. Aplicar sobre malezas que estén en sus primeros estadios de desarrollo (preferentemente de 1 a 4 hojas) para una mayor efectividad del producto. Para complementar el control de malezas de hoja ancha se recomienda mezclar con metsulfuron metil a dosis de 5,0 g producto formulado/ha. Luego de 1 hora de aplicado, el producto es resistente a la lluvia. EVEREST®70 WDG es un producto de alta solubilidad en agua y la hidratación cuticular por rocío o condiciones de alta humedad relativa favorecerán la absorción y actividad del producto. Evitar aplicar en horas de alta insolación y/o condiciones de strés del cultivo y la maleza. Usar las dosis menores para infestaciones leves y/o malezas en sus primeros estadios de desarrollo y las dosis mayores para infestaciones altas y/o malezas más desarrolladas. Para un control efectivo de las malezas gramíneas, el producto debe aplicarse con una densidad de malezas inferior a 125 pl/m2. Antes de aplicar en trigos candeales, verificar la selectividad del producto o consultar al departamento técnico de UPL ARGENTINA S.A.. Leer detenidamente todas las indicaciones de la etiqueta antes de utilizar el producto.
	Raigrás (*Lolium multiflorum)* Raigrás perenne (*Lolium perenne)*	80 - 100 g/ha (*)		

(*) Realizar solo una aplicación por temporada.

Información General:

Herbicida sistémico y selectivo para trigo (Triticum aestivum y Triticum durum) de aplicación post-emergente, perteneciente al grupo químico triazolinonas, que controla malezas gramíneas y algunas especies de hoja ancha. Tiene actividad foliar sobre las malezas y también efecto residual en el suelo por absorción radicular (10 a 21 días según tipo de suelo y condiciones ambientales), lo que le confiere la propiedad de control de sucesivas camadas de germinación.
Es un inhibidor de la enzima acetolactato sintetasa (ALS), perteneciente a la clase sulfonil-amino-carbonil-triazolinona, y ejerce su acción en los cloroplastos y plástidos de las regiones meristemáticas, produciendo una muerte lenta y progresiva de las malezas (el proceso total puede demorar entre 7 y 14 días).
La formulación como gránulos no tiene riesgo de congelamiento en el periodo invernal.

Preparación de la mezcla: llenar el estanque de la máquina aplicadora hasta la mitad con agua. Pre-diluir el producto en un balde con agua y luego agregarlo al estanque. Completar el volumen de agua revolviendo constantemente. Posteriormente agregar los otros herbicidas. El surfactante debe ser adicionado como último componente de la mezcla.

Equipos de aplicación: puede aplicarse con equipos terrestres convencionales para herbicidas o por avión. Para aplicaciones terrestres se recomienda usar boquillas de abanico plano y un volumen mínimo de agua de 120 l/ha. Para aplicaciones aéreas se recomienda usar un volumen mínimo de agua de 25 l/ha. Una vez preparada la dilución del producto, deberá utilizarse ese mismo día.

Tipo de pastilla: abanico plano.
Presión: 40 - 60 lb/pulg2.
Número y tamaño de gotas: 20 - 30/cm2 de 200 - 300 micrones.

Condiciones y advertencias especiales: NO aplicar con vientos > 10 km/h.

Compatibilidad:
Es compatible con herbicidas graminicidas tales como clodinafop-propargil y con herbicidas latifolicidas tales como hormonales (por ejemplo 2,4-D y MCPA), hidroxibenzonitrilos (por ejemplo bromoxinil) y sulfonilureas (por ejemplo metsulfuron metil, iodosulfuron metil sodio y triasulfuron).

No se recomienda la mezcla con herbicidas latifolicidas tales como dicamba, picloram, clopiralid, insecticidas organofosforados y fungicidas que contengan tebuconazole u otros inhibidores de esterol (IBE's), ya que pueden afectar la selectividad y/o efectividad de EVEREST®70 WDG
Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa en pequeña escala para mezclas con otros productos.

Fitotoxicidad:
En general no presenta fitotoxicidad cuando se respetan las dosis de etiqueta y se siguen las condiciones de uso recomendadas.
Para evitar riesgo de fitotoxicidad en cultivos de trigo se recomienda lo siguiente:

- No aplicar en condiciones de sequía o exceso de humedad en el suelo ni tampoco con temperaturas inferiores a 0°C o superiores a 25°C.
- No aplicar en condiciones de deficiencia de nutrientes.
- No aplicar en trigos desarrollados, en suelos arenosos o limosos con un contenido de materia orgánica inferior al 2,0%.
- No mezclar con adyuvantes diferentes a los indicados en la etiqueta.

La fitotoxicidad en trigo puede manifestarse como un amarillamiento inicial del cultivo y una reducción de la altura pero no tendrá efecto sobre los componentes del rendimiento.

Cultivos rotacionales:
En la temporada siguiente a una aplicación de EVEREST®70 WDG no hay restricciones para la siembra de cultivos en suelos con pH menor o igual a 7,0 y materia orgánica igual o mayor de 2,0% y precipitaciones > 200 mm en el ciclo del cultivo. En esas condiciones se podrán sembrar trigo, cebada o canola como cultivos de invierno y también soja o maíz de segunda como cultivo de verano después de una aplicación de EVEREST®70 WDG en trigo, siempre que haya transcurrido un mínimo de 6 meses para cultivos de invierno, 75 días para soja de segunda y 120 días para maíz de segunda, desde la fecha del tratamiento con el producto. Una siembra anterior de estos cultivos podría producir amarillamiento en las primeras hojas y necrosis en los cotiledones.
Se restringe la siembra de cultivos rotacionales después de una aplicación de EVEREST®70 WDG (especialmente arveja, avena, brócoli, cebada, canola, garbanzo, lenteja, maíz, papa, repollo, soja, tomate, tréboles y zanahoria) bajo situaciones de suelos con pH superior a 7,0 , materia organica menor al 2,0% y precipitaciones – menores de 200 mm - durante el ciclo del cultivo de trigo.

Reingreso al área tratada: se puede reingresar al área tratada a las 12 horas de aplicado el herbicida.

Derrames:
El producto derramado no puede ser reutilizado. Contener el producto con material adsorbente (cal, arena, tierra, aserrín, etc.) y colocarlo en tambores identificados para su eliminación en un incinerador aprobado para sustancias químicas. No contaminar las aguas ni los desagües.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Protección facial, barbijo con filtro, guantes de PVC, pantalón largo, camisa de manga larga y botas de goma.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda:	DL50: >5000 mg/kg.
Toxicidad dermal aguda:	DL50: >5000 mg/kg.
Toxicidad Inhalatoria:	CL50: > 5,113 mg/l
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Primeros auxilios
Inhalación: llevar al paciente a un sitio con aire fresco y procurar ayuda médica.
Piel: lavar la zona afectada con agua y jabón.
Ojos: lavar cuidadosamente con abundante agua limpia por 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.
Ingestión: no provocar el vómito. Si la persona está consciente dar a beber uno o dos vasos de agua. Llamar al médico.

Advertencias para el médico:
Cuidado. No existe antídoto específico. En caso de ingestión realizar lavaje gástrico; posteriormente puede administrarse una suspensión de carbón activado y un purgante salino. Proseguir con tratamiento sintomático y de sostén.

Síntomas agudos: enrojecimiento en los ojos e irritación en la piel y sistema respiratorio.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para peces: Ligeramente tóxico. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existe agua libre en superficie. No contaminar fuentes de agua.
Aves: DL50 > 2000 Prácticamente no tóxico.
Abejas: DL50 > 200 microgramos por abeja. Virtualmente no tóxico.

En USA está clasificado por la EPA como "producto de riesgo reducido".

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
EVEREST 70 WDG	UPL ARGENTINA S.A.	37257	WG	70%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.