TRICLORFON

Nomenclatura Química:
triclorfon: 0,0 dimetil-2,2,2-tricloro-1-hidroxietil-fosfonato.
Clasificación Química: organofosforado.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	Momento de Aplicación
Ají Tabaco Tomate	Gusano cogollero (*Heliothis virescens)*	1000 - 1300 g/ha	Aplicar al observar los primeros ataques. Cebos: 2100 g de triclofon + 100 kg de harina de maíz. Aplicar sobre los cogollos.
	Marandová de las solanáceas (*Protoparce sexta paphus)*	650 - 850 g/ha	
Alfalfa	Isoca de la alfalfa (*Colias lesbia)*	250 - 350 g/ha	Iniciar los tratamientos cuando se encuentren 4 - 5 isocas por metro cuadrado.
	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)*	650 - 800 g/ha	
	Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*	420 - 600 g/ha	
Algodón	Oruga de la hoja (*Alabama argillacea)*	200 - 350 g/ha	Aplicar cuando el promedio sea de 5 o más orugas por planta.
	Trips (*Thrips spp.)*	170 - 200 g/ha	Iniciar los tratamientos cuando en las plantas de 3 a 4 hojas se encuentren 50 trips por hoja (emplear dosis mínima) o en plantas de más de 6 hojas cuando se encuentren 80 trips por hoja (emplear dosis máxima).
Cítricos o citrus Frutales de carozo Frutales de pepita	Mosca americana (*Anastrepha fraterculus)* Mosca del mediterráneo (*Ceratitis capitata)*	100 g/hl	Se pulverizan totalmente las plantas, comenzando 10 días antes de colorearse los frutos y se repite cada 7 a 10 días. Para aplicación de cebos tóxicos usar 250 g/100 litros de agua con el agregado de 0,5 a 1 kg de proteína hidrolizada, 1 kg de azúcar o 5 kg de melaza. Pulverizar la parte noroeste de la copa, fila por medio o árbol por medio alternativamente, desde que los frutos comienzan a colorearse cada 7 a 10 días.
Girasol	Gata peluda norteamericana (*Spilosoma virginica)*	650 - 850 g/ha	Aplicar cuando hay más de 3 orugas por planta.
	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)*		Aplicar cuando el promedio sea de 5 o más orugas por planta.
Maíz	Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*	500 - 650 g/ha	Aplicar al observar los primeros ataques.
Sorgo granífero	Mosquita del sorgo (*Contarinia sorghicola)*	350 - 450 g/ha	Aplicar cuando hayan aparecido el 90% de las panojas y 10% de ellas tengan florecido el cuarto superior. Repetir a los 5 días.

Información General:

Este producto puede aplicarse con equipos terrestres con picos de cono hueco para insecticidas que arrojen un caudal no inferior a 60 l/ha.

Compatibilidad: este producto es incompatible con productos de reacción alcalina y aceites minerales.

Derrames:
Barrer lentamente el producto derramado evitando generar polvo, recoger con pala y disponer en tambores cerrados e identificados para su disposición en sitios autorizados de acuerdo a las regulaciones locales. No incinerar a cielo abierto. No usar agua.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata): DL50: 500 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 2000 mg/kg

Riegos ambientales:

Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves: Moderadamente tóxico
Toxicidad para peces: Muy tóxico

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.