BRADYRHIZOBIUM SPP. + FLUDIOXINIL + METALAXIL - M

Marcas comerciales: RIZOPACK 102 HC - RIZOPACK 102 (RIZO - LIQ MAX, MAXIM XL) - RIZOPACK 202 (RIZO - LIQ TOP, MAXIM XL) - SUSTENTA PACK (NODUSEM + MAXIM XL).

Nomenclatura Química:
Bradyrhizobium spp.
fluodioxonil: 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-il)-1H-pirrol-3-carbonitrilo.
metalaxyl M: N-(2-6-dimetilfenil)-N-(2'-metoxiacetil)-D-alanina metil ester.
Tipo de producto: químico + biológico.
Clasificación Química: biológico (no corresponde c.q.) + fenilpirrol + acilalanina.
Acción: de contacto, sistémica y promotor biológico del crecimiento vegetal.

Uso: fungicida e inoculante.

Cultivo	Adversidad	Dosis	Momento de Aplicación
Soja	Patógenos (*Alternaria spp.; aspergillus spp.)* Patógenos (*Cercospora kikuchii ;cladosporium sp.*) Patógenos (*Fusarium spp.; penicillium spp.; phomopsis spp*) Patógenos (*Pythium spp.; phytophtora sojae*) Patógenos (*Rhizoctonia solanii; rhizopus spp.*)	Rizopack 102: 150 cm3 (Rizo - Liq Max) + 50 cm3 (Maxim XL) cada 50 kg de semilla.	Emplear inmediatamente antes de la siembra.
		Rizopack 102 HC: 200 mL (RizoLiq II) + 100 mL (Maxim XL) cada 100 kg de semilla.	
		Rizopack 202: 150 cm3 (Rizo - Liq Top) + 50 cm3 (Maxim XL) cada 50 kg de semilla.	Inmediatamente luego de tratar la semilla o hasta 7 días antes de la siembra en tratamiento simultaneo o bien hasta los 12 días antes de la siembra en tratamiento secuencial.
		Sustenta Pack: 200 mL (Nodusem) + 100 mL (Maxim XL) cada 100 Kg de semilla	Una vez preparada la mezcla que contiene MAXIM®XL, se recomienda realizar la inoculación antes de transcurridas las 2 horas de su preparación.

(*) Premax: producto específicamente diseñado para prolongar la supervivencia bacteriana luego del tratamiento de la semilla.

Información General:

Este producto contiene un inoculante líquido (Signum, Rizo - Liq Top), un protector - bacteriano (Premax) y un fungicida (Maxim XL).
Estos componentes presentan un orden de mezclado y aplicación a la semilla de acuerdo a las alternativas de uso (A ó B). Para ello se recomienda proceder como lo descrito en las indicaciones del marbete.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra o arena para contener y adsorber el derrame. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica + 12 (FRAC) + 4 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Protección facial, protección respiratoria, guantes de acrilonitrilo, pantalón largo, camisa de manga larga y botas de goma.

Información Toxicológica:

Productos no tóxicos (Signum, Rizo - Liq Top y Premax)

Para el producto formulado Maxim XL (2,5% + 1%):
DL50 oral aguda(rata): > 3000 mg/kg
DL50 dermal aguda (rata): > 4000 mg/kg

Para el producto formulado Maxim XL (2,5% + 1%):
Riesgos ambientales:
muy tóxico para organismos acuáticos.
Ligeramente no tóxico para aves.
Ligeramente tóxico para abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Grado/Conc.	C.T.
RIZOPACK 102 HC	RIZOBACTER ARGENTINA	276	AL + FS	(1x10 exp10 CFU/cm3)+ 2,5% + 1%	III
RIZOPACK 102 (RIZO - LIQ MAX, MAXIM XL)	RIZOBACTER ARGENTINA	30	AL + FS	(5x10 exp9 bact/cm3)+ 2,5% + 1%	III

RIZOPACK 202 (RIZO - LIQ TOP, MAXIM XL)	RIZOBACTER ARGENTINA	24	AL + FS	(1x10 exp.10 bact/cm3) + 2,5% + 1%	III
SUSTENTA PACK (NODUSEM + MAXIM XL)	RIZOBACTER ARGENTINA	370	AL + FS	(1x10 exp9 bact/cm3) + 2,5% + 1%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.