BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM

Marcas comerciales: ARYBIUM - HICOAT DRY - HICOAT SUPER - HISTICK PLUS.

Nomenclatura Química:
Bradyrhizobium japonicum.
Tipo de producto: biológico.
Clasificación Química: biológico (no corresponde c.q.).
Acción: promotor biológico del crecimiento vegetal.

Uso: inoculante.

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Soja	100 cm3 en 50 kg de semillas 100 – 200 gr/ 100 Kg de semilla de soja (*) 200 ml/100 kg de semilla de soja (*) 6 litros para 3000 kg de semilla de soja (*)	Tratamiento de semillas previo a la siembra.

(*) Recomendación para los productos de BASF.

Información General:

Inoculante compuesto por un medio estéril con bacterias fijadoras de Nitrógeno genéticamente seleccionadas.
Provee al cultivo, cepas de bacterias fijadoras de nitrógeno que se incorporan al medio previamente esterilizado, como así también al envase que lo contiene. De esta forma se suministran exclusivamente rizobios sobre las semillas, sin organismos contaminantes.
Aplicando este inoculante de acuerdo a las instrucciones enunciadas, proporciona no menos de 80.000 bacterias viables específicas por semilla. A la elaboración contiene 5x109 bacterias viables/cm3 de inoculante. A vencimiento contiene más de 1x108 bacterias viables/cm3 de inoculante (equivalente a 80.000 bacterias viables específicas por semilla), cuando el producto se almacena en condiciones refrigeradas.

Instrucciones para el uso:
Se aplica directamente sobre la semilla en forma alternada, mezclada convenientemente.
Para una mejor homogeneización se recomienda aplicar fuera de la tolva de la sembradora. En ambos casos, mezclar bien hasta lograr una distribución uniforme sobre la superficie de las semillas.
Tambor: Agite antes de usar. Aplique directamente la dosis recomendada sobre la semilla y mezcle bien. Realice la inoculación en un momento próximo a la siembra (las semillas deben sembrarse dentro de las 24 horas posteriores al tratamiento). Si las semillas van a ser tratadas con insecticidas, fungicidas o micronutrientes, dicho tratamiento debe ser previo a la inoculación. Máquina: Agite antes de usar. Coloque la dosis recomendada de inoculante directamente en el recipiente específico para el inoculado líquido. Regule la máquina para aplicar la dosis recomendada. Sembradora: Agite antes de usar. El producto puede aplicarse a las semillas en la tolva de la sembradora, cuidando de cubrir uniformemente las semillas.

Precauciones:
Almacenar en lugar fresco y a la sombra, a temperaturas inferiores a 21ºC.
Verificar la fecha de vencimiento impresa.
Abrir las bolsitas solamente al momento de uso. Una vez abiertas, pierden su condición de esterilidad.
Durante la aplicación, evitar exponer el producto al sol y vientos desecantes.
Utilizar agua de buena calidad, no clorada, sin desinfectantes.
Los recipientes y utensilios que se utilicen para la aplicación del producto, deben estar perfectamente limpios.
Sembrar en suelos húmedos y en época y temperatura adecuada, procurando una rápida germinación.
No exponer al sol. Antes de usar, verificar la fecha de vencimiento. Conservar refrigerado a 4 – 10 °C. No dejar semilla inoculada expuesta a la luz solar, vientos o altas temperaturas. Mantenga el envase cerrado hasta su uso.

Restricciones de uso:
Es aconsejable evitar las siembras en horarios de máxima intensidad solar. De no ser posible, recomendamos colocar bolsas de arpillera mojadas sobre la tapa de la tolva para mitigar las altas temperaturas.
Tener en cuenta que en suelos ácidos disminuye la supervivencia de los rizobios.
Evitar el contacto directo de los fertilizantes con el inoculante.
No inocular más semillas de la que se van a sembrar en medio día de trabajo

Compatibilidad:
Es compatible con la mayoría de los fungicidas líquidos o en polvo de uso habitual, que se deberán aplicar primero y posteriormente inocular.
Importante: este producto está esterilizado previo a la incorporación de rizobios suministrando exclusivamente bacterias fijadoras de nitrógeno a las semillas sin otros organismos contaminantes.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico. Los derrames de productos líquidos se deben contener

y adsorber empleando tierra o arena. El material deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales vigentes.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar guantes de acrilonitrilo, protección ocular, protección respiratoria adecuada, botas de goma, ropa de mangas y piernas largas y delantal durante la aplicación.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Grado/Conc.
ARYBIUM	UPL ARGENTINA S.A.	21064	LÍQUIDO	5x10 exp9 bact, viables/ ml
HICOAT DRY	BASF	21700	SOLIDO	7,9x10 exp8 UFC/gr a la elaboración (*)
HICOAT SUPER	BASF	21123	LÍQUIDO	1x10 exp10 bacterias viables a la elaboración (*)
HISTICK PLUS	BASF	21055	LÍQUIDO	5x10 exp9 bacterias viables a la elaboración (*)

(*) y no menos de 1x108 al vencimiento

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.