Versión Digital de la Guía de Productos Fitosanitarios - CASAFE - Edición 2015/2017
Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

DIAZINON

Nomenclatura Química:
éster(2-isopropil-4-metil-6-pirimidil)dietílico del ácido tiofosfórico ó éster O,O-dietil-O- 2-isopropil-6-metilpirimidin-4-il fosforotioato fosfotioico
Clasificación Química: organofosforado.
Acción: de contacto, ingestión e inhalación.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Áreas cultivadas	Hormiga cortadora colorada (*Acromyrmex striatus)* Hormiga de fuego (*Solenopsis richteri)* Hormiga invasora (*Iridomyrmex humilis)* Hormiga minera (*Atta sexdens)* Hormiga negra común (*Acromyrmex lundi)*	PC 50% 1,35 l/hl PC 60% 1,12 l/hl		De esta emulsión aplicar 0,5 litro por cada hormiguero y en los alrededores.
Cebolla	Mosca de la semilla (*Hylemya cilicrura)*	PC 50% 2,22 l/hl PC 60% 1,85 l/hl	30	Al aparecer la plaga.
Cítricos o citrus	Pulgón de los citrus (*Toxoptera aurantii)* Pulgón del algodonero (*Aphis gossypii)*	PC 50% 56 cm3/hl PC 60% 47 cm3/hl	35	Al observar la presencia de la plaga y previamente al enrulamiento de la hoja.
Duraznero	Pulgón negro del duraznero (*Brachycaudus persicae)* Pulgón verde del duraznero (*Myzus persicae)*			Aplicar a la aparición de la plaga.
Florales	Pulgón del crisantemo (*Macrosiphoniella sanborni)* Pulgón del rosal (*Macrosiphum rosae)*			A la aparición de la plaga, mojando bien las hojas.
Hortalizas	Pulgón de la papa (*Macrosiphum euphorbiae)* Pulgón del repollo (*Brevicoryne brassicae)* Pulgón verde del duraznero (*Myzus persicae)*			Aplicar cuando se observan los primeros pulgones en cultivo.
Manzano	Gusano de la pera y la manzana (*Carpocapsa pomonella)*	PC 50% 112 cm3/hl PC 60% 93 cm3/hl	25	Se recomienda 4 a 5 aplicaciones, que se inician con la caída de los pétalos para terminar 10 días antes de la cosecha.
	Pulgón lanígero (*Eriosoma lanigerum)*	PC 50% 56 cm3/hl PC 60% 47 cm3/hl		Al aparecer la plaga.
Menta	Pulgón de la menta (*Kaltenbachiella pallida)*	PC 50% 3,4 - 5,6 l/ha PC 60% 2,8 - 4,7l/ha	15	Aplicar al surco al momento de la plantación.
Ornamentales	Pulgón del crisantemo (*Macrosiphoniella sanborni)* Pulgón del rosal (*Macrosiphum rosae)*	PC 50% 56 cm3/hl PC 60% 47 cm3/hl		A la aparición de la plaga, mojando bien las hojas.
Peral	Herrumbre del Peral (*Epitrimerus pyri)*	PC 50% 56 cm3/hl PC 60% 42 cm3/hl	25	(1º) Con yema punta verde, (2º) al darse vuelta los frutos, (3º) a 25 días antes de la cosecha.
	Psílido del peral (*Cacopsylla pyricola)*	PC 50% 56 cm3/hl PC 60% 47 cm3/hl		Cuando se hinchan las yemas y a la caída de los pétalos.
Tabaco	Gusano cortador u Oruga grasienta (*Agrotis ipsilon)*	PC 50% 3,4 - 5,6 l/ha PC 60% 2,8 - 4,7l/ha	15	En plantación, al momento de efectuar el transplante. Si fuera necesario, repetir al fertilizar.
	Gusano minador del tallo (*Faustinus cubae, f. variegatus)*			En almácigo cuando la planta tiene 2 a 3 hojas. En plantación, luego del transplante aplicar en el surco y tapar. Si fuera necesario, repetir al fertilizar.
Tomate	Gorgojo del tomate (*Phyrdenus muriceus)*			En plantación al momento del trasplante, luego tapar.

Información General:

Actúa por contacto e ingestión y ligeramente en profundidad sobre insectos y ácaros en los que inhibe la colinesterasa.
Estable en medio alcalino, se hidroliza lentamente en medio ácido. Tiene una persistencia en el follaje de 8 días aproximadamente.

ISBN: 978-987-1563-08-1

Puede utilizarse como parte de un Control Integrado de Plagas (C.I.P.). La selectividad a enemigos naturales puede incrementarse si los tratamientos se hacen en dormancia. Debido a su corto efecto residual, permite un rápido reestablecmiento de la población de insectos benéficos.

Equipos, volúmenes y técnica de aplicación
- Tratamiento de follaje:
Para conseguir un efectivo control cuidar que la pulverización llegue al interior de las plantas, incluso ramas y troncos, hasta punto de escurrimiento o punto de goteo. El nivel de cobertura debe ser de 50 a 70 gotas/cm2.
Utilizar pulverizadoras de alto o bajo volumen (mochilas, máquinas motopulverizadoras o de arrastre). En tratamientos de alto volumen se recomienda usar como mínimo 3000 litros de agua por hectárea en manzanos y perales y de 2000 litros de agua por hectárea en durazneros.
- Tratamiento en el suelo:
Aplicar en el terreno ya preparado para la plantación e incorporarlo al suelo mediante rastra o disco. Para cultivos en hileras se puede hacer el tratamiento en bandas al momento de la siembra o plantación. Tratar de aplicar el producto a la profundidad indicada en las recomendaciones de uso.

Compatibilidad:
Se puede mezclar con fungicidas e insecticidas orgánicos e inorgánicos no alcalinos de uso habitual. No obstante se recomienda efectuar una prueba previa de compatibilidad y de fototoxicidad de cualquier mezcla. En las condiciones de uso indicadas el producto no resulta fitotóxico.

Tratamientos de remanentes y envases vacíos:
En caso que el contenido de este envase sea utilizado parcialmente, el remanente deberá ser almacenado según las condiciones indicadas en esta etiqueta. A los envases vacíos se les debe realizar el triple lavado. El agua proveniente de esta limpieza se agregará al tanque de la pulverizadora, para ser utilizada en la tarea fitosanitaria prevista. Una vez finalizada la tarea y previa inutilización de los envases vacíos proceder a su identificación para su posterior destrucción.

Derrames:
Cubrir con material absorbente, tierra o arena, recogerlo y colocarlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción evitando la contaminación de aguas para beber y para riego. Si ocurre sobre piso impermeable, la inactivación se realizará con una solución de ácido muriático (ácido clorhídrico al 22%) 1 litro en 10 litros de agua; luego enjuagar con abundante agua.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar ropa protectora adecuada procurando que la misma esté siempre limpia, evitando emplear la que se hubiera contaminado por uso anterior. Durante la preparación y aplicación utilizar guantes, careta, sombrero, y botas de goma.

Información Toxicológica:

DL 50 oral aguda del P.F. para rata: 1783 mg/kg
DL 50 dermal aguda del P.F. para conejo: > 2000 mg/kg
Irritación de la piel: leve irritabilidad (conejo).
CL 50 inhalatoria: 23 mg/litro aire (1 hora) (rata).

Riesgos ambientales: Altamente tóxico para abejas. Moderadamente tóxico para peces. Extremadamente tóxico para aves.
Primeros Auxilios:
En caso de intoxicación llame al médico.
Coloque al paciente en un lugar ventilado
En caso de salpicaduras en los ojos: enjuagar con agua limpia durante 15 minutos.
En caso de salpicaduras en la piel: lavar con abundante agua y jabón.

En caso de ingestión: no inducir al vómito, este producto contiene solventes aromáticos. No administre nada por boca a un paciente inconsciente.

No irritante dermal - No irritante ocular.

Antídoto: sulfato de Atropina

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.