AZOXISTROBINA + PROPICONAZOLE

Marcas comerciales: QUILT.

Nomenclatura Química:
azoxistrobina: metil (E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi]fenil}-3-metoxiacrilato.
propiconazole: 1-[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il-metil]- 1H-1,2,4 triazol.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: estrobilurina + triazol.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: fungicida (Ready mix: 7,5 + 12,5%).

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cebada cervecera	Mancha borrosa de la cebada (*Bipolaris sorokiniana)* Mancha en red (*Drechslera teres)* Roya de la hoja de la cebada (*Puccinia hordei)*	800-1000 cm3/ha	30	Aplicar a partir de encañazón, cuando comiencen a aparecer los primeros síntomas.
Girasol	Escudo negro o Mancha negra del tallo (*Phoma macdonaldii)* Mancha de la hoja y tallo (*Alternaria helianthi)*	1000 cm3/ha		Realizar la aplicación con la aparición de los primeros síntomas, a partir de R1 (estrella o botón floral visible, Schneiter y Miller, 1981).
	Roya negra del girasol (*Puccinia helianthi)*			A la aparición de los primeros síntomas, a partir del estadio vegetativo V7-V8 (7-8 pares de hojas verdaderas con más de 4 cm de longitud, Schneiter y Miller, 1981). En caso de reinfección, repetir la aplicación en R1 (estrella o botón floral visible, Schneiter y Miller, 1981).
Maíz Maíz pisingallo	Antracnosis (*) (*Colletotrichum graminicola)* Fusariosis (*) (*Fusarium spp.)* Podredumbre de tallo y raíz (*) (*Fusarium verticillioides)* Podredumbre de tallo y raíz (*) (*Giberela zeae)* Podredumbre de tallo y raíz (*) (*Diplodia spp.)* Podredumbre de tallo y raíz (*) (*Stenocarpella macrospora)* Podredumbre de tallo y raíz (*) (*S. maydis)*	1000 cm3/ha + 500 cm3/ha de aceite mineral parafínico 42,8%	60	Aplicar en forma preventiva o a la aparición de los primeros síntomas, a partir de estadios vegetativos del cultivo en V10 (10 hojas desplegadas). (*) Control parcial.
	Roya del maíz (*Puccinia sorghi)*			Aplicar a la aparición de las primeras pústulas, en estadios vegetativos del cultivo a partir de V7 (7 hojas desplegadas Ritchie y Hanway, 1982). En caso de reinfección, repetir la aplicación en R1 (Floración femenina: aparición de estigmas).
Soja	Mancha marrón o Septoriosis (*Septoria glycines)* Mancha púrpura de la semilla (*Cercospora kikuchii)* Tizón de la hoja (*Cercospora kikuchii)*	800 - 1000 cm3/ha + 500 cm3/ha de aceite mineral parafínico 42,8%.	30	A partir de floración (R1 - R2) hasta el llenado de granos (R5 - R6), cuando se observen los primeros síntomas en la planta.
	Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)*	1000 cm3/ha + 500 cm3/ha de aceite mineral parafínico 42.8%.		Aplicar en forma preventiva, antes de la aparición de la enfermedad, cuando se detecten condiciones ambientales predisponentes. Luego de la primera aplicación, si las condiciones predisponentes persisten, se deberá repetir la aplicación a partir de los 14 días
Trigo	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Mancha de la hoja del trigo (*Septoria tritici)* Roya anaranjada del trigo (*Puccina recondita)*	800 - 1000 cm3/ha		A partir de encañazón, cuando comiencen a aparecer los primeros síntomas

Información General:

Fungicida sistémico y de contacto, con acción preventiva y curativa contra enfermedades de los cultivos de cebada cervecera, maíz, soja y trigo.
Combina la destacada acción preventiva y antiesporulante de azoxistrobina, perteneciente al grupo de las estrobirulinas, con el efecto erradicante de propiconazole perteneciente al grupo de los triazoles. La mezcla de ambos principios activos determina

una acción combinada, bloqueando el proceso respiratorio y la síntesis de ergosterol en los hongos. Asegura un amplio espectro de control, reduciendo el riesgo de aparición de cepas resistentes.

Preparación: producto formulado como suspoemulsión, conteniendo en dispersión estable partículas sólidas y glóbulos, que se encuentran en fase acuosa continua. Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:
- Agitar el producto antes de usarlo.
- Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen.
- Poner a funcionar el sistema de agitación.
- Agregar la cantidad necesaria de producto, de acuerdo a la calibración realizada, directamente al tanque y sin disolución previa.
- Con el sistema de agitación en movimiento, verificar que el producto se disuelva completamente.
- Agregar otros productos, en caso de realizar mezclas.
- Completar con agua el tanque, hasta el volumen final.
- Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspoemulsión.
- Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
- Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
- Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: el producto debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se debe lograr una cobertura de al menos 20 - 30 gotas/cm2 sobre el cultivo a proteger. Puede aplicarse con equipos terrestres de arrastre o autopropulsados, con barras provistas de picos de cono hueco para fungicidas, para lograr un tamaño de gota que alcance todas las partes verdes de la planta. Utilizar un volumen mínimo de agua de 200 l/ha, para lograr una buena penetración del producto y mojado del cultivo. Corroborar que los picos y sus componentes estén en buen estado y que la barra del equipo pulverizador esté ajustada a la altura suficiente para garantizar una cobertura completa. También puede aplicarse por avión, empleando un volumen mínimo de agua de 20 a 30 l/ha.
NO deben realizarse aplicaciones con gasoil. Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos.
NO realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora. Aplicar lejos de manantiales, cursos o fuentes de agua.

Restricciones de uso:
Periodo de carencia: se deben dejar transcurrir entre la última aplicación y la cosecha de: trigo, soja y cebada cervecera: 30 días; girasol y maíz: 60 días. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.
Advertencia: la experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes a los fungicidas, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento.
A los efectos de prevenir la resistencia, no se deben realizar más de tres aplicaciones por ciclo del cultivo. Rotar con fungicidas de diferente modo de acción.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE RESISTENCIA

El producto formulado pertenece al grupo 11 y al grupo 3 de los fungicidas.
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un fungicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de fungicida en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros fungicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar una población resistente a un fungicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.
Advertencia: la experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes a los fungicidas, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento. Para evitar la generación de resistencia rotar con fungicidas de distinto modo de acción.

Compatibilidad: compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas usados comúnmente. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 11 (FRAC) + 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Bañarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Del producto formulado

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: 1750 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 3,05 mg/l

Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	Sensibilizante

No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Moderadamente tóxico

Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad entre el área a tratar y el agua libre en superficie cercana.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
NO pastorear las áreas recientemente tratadas con el producto. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
QUILT	SYNGENTA AGRO	34364	SE	7,5% + 12,5%	II

El producto QUILT XTRA es de distribución exclusiva de Dow Agrosciences Argentina S.A.

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.