AZOXISTROBINA + DIFENOCONAZOLE

Marcas comerciales: AMISTAR TOP - QUADRIS SOL - QUADRIS TOP.

Nomenclatura Química:
azoxistrobina: metil (E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi]fenil}-3-metoxiacrilato
difenoconazole: 1-[2-(4-(4-clorofenoxi)-2-clorofenil)-4-metil-1,3-dioxolan-2-yl-metil]-1H-1,2,4-triazole.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: estrobilurina + triazol.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Arándano	Mancha de tallos y hojas (*Alternaria tenuissima)*	100-160 cm3/hl Asegurar dosis mínima de 750 cm3/ha	10 (*)	Aplicar a la aparición de los primeros síntomas o ante condiciones predisponentes para la enfermedad hasta 10 días antes de la cosecha. En caso de ser necesario, realizar una nueva aplicación.
Cerezo Ciruelo Damasco Durazno Guindo Nectarina (Pelón)	Podredumbre morena (*Monilia spp.)*	60 cm3/100 litros de agua 600 - 1000 cm3/ha	3 (*)	Aplicar ante condiciones predisponentes para el desarrollo de la enfermedad, a partir de floración. Repetir la aplicación en caso de ser necesario.
Colza	Mancha negra de las crucíferas (*Alternaria brassicae)* Oidio (*Erysiphe betae)* Phoma (*Phoma lingam)*	500 cm3/ha	50 (*)	A la aparición de los primeros síntomas, a partir de comienzo de elongación de vástago o roseta hasta final de floración.
Frutilla	Antracnosis (*Colletotrichum acutatum)* Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)*	120-160 cm3/hl (***) Asegurar dosis mínima de 500 cm3/ha	1(*)	Aplicar a la aparición de los primeros síntomas o ante condiciones predisponentes para la enfermedad. Si las condiciones favorables persisten, reaplicar entre 10 y 20 días posteriores para proteger hojas nuevas. Aplicar hasta 1 día antes de la cosecha. (***) Estimado en base a un volumen de aplicación de 350-450 litros de agua/ha.
Girasol	Escudo negro o Mancha negra del tallo (*Phoma macdonaldii)* Mancha de la hoja y tallo (*Alternaria helianthi)*	500 cm3/ha	35 (*)	Enfermedades de fin de ciclo. Realizar la aplicación con la aparición de los primeros síntomas, a partir de R1 (estrella o botón floral visible, Schneiter y Miller, 1981).
	Roya negra del girasol (*Puccinia helianthi)*			A la aparición de los primeros síntomas, a partir del estadio vegetativo V7-V8 (7-8 pares de hojas verdaderas con más de 4 cm de longitud Schneiter y Miller, 1981). En caso de reinfección, repetir la aplicación en R1 (estrella o botón floral visible, Schneiter y Miller, 1981).
Maní	Viruela tardía (*Cercosporidium personatum)* Viruela temprana (*Cercospora arachidicola)*	400 - 500 cm3/ha + 500 cm3/ha de aceite mineral parafínico. Que supere el 83% p/v/100 litros de agua.	15 (*)	A la aparición de los primeros síntomas. Repetir a los 21 días.
Papa	Tizón temprano de la papa (*Alternaria solani)*	400 - 600 cm3/ ha	30 (*)	Utilizar la dosis más alta según condiciones predisponentes para el desarrollo de la enfermedad.
Pimiento	Oidiopsis (*Leveillula taurica)*	100 cm3/100 litros de agua 650 - 750 cm3/ha (*)	3 (*)	Aplicar a la aparición de los primeros síntomas bajo condiciones predisponentes a la aparición de enfermedades. Asegurar una buena cobertura. Si las condiciones favorables persisten, re-aplicar entre 10 y 20 días posteriores. No aplicar AMISTAR ® TOP sobre plantines de pimiento ni durante las 2 semanas posteriores al trasplante. Puede causar síntomas de fitotoxicidad localizada en pimiento cuando las gotas de la aplicación permanecen sin evaporarse durante un período prolongado. Se recomienda no aplicarlo bajo condiciones de alta humedad o predisponentes para la ocurrencia de rocío o niebla. (*) Estimado en base a un caldo de aplicación de 650 - 750 litros/ha
Soja	Antracnosis (*Colletotrichum truncatum)* Mancha marrón (*Septoria glycines)* Tizón de la hoja	250 cm3/ha + 500 cm3/ha de aceite mineral parafínico. Que supere el 83% p/v/100 litros de agua.	35 (*)	A partir de la floración (R1 - R2) hasta el llenado de granos (R5 - R6) cuando se observen los primeros síntomas en la planta.

	(*Cercospora kikuchii)* Tizón del tallo y de la vaina (*Phomopsis sojae)* Tizón del tallo y de la vaina (*Phomopsis phaseolli)*			
	Mancha foliar por Phyllosticta (*Phyllosticta sojicola)*	250 a 300 cm3/ha + 500 cm3/ha de aceite mineral parafínico. Que supere el 83% p/v/100 litros de agua.		Aplicar partir de la floración (R1-R2) hasta el llenado de granos (R5-R6), cuando se observen los primeros síntomas en la planta.
	Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)*	300 cm3/ha + 500 cm3/ha de aceite mineral parafínico 42,8%.. Que supere el 83% p/v/100 litros de agua.		Aplicar en forma preventiva, antes de la aparición de la enfermedad, cuando se detecten condiciones ambientales predisponentes. Luego de la primera aplicación, si las condiciones predisponentes persisten se deberá repetir la aplicación a partir de los 14 días.
Tomate	Oidiopsis (*Leveillula taurica)* Tizón del tomate (*Alternaria spp.)*	100 cm3/hl 650-750 cm3/ha(**)	3 (**)	Aplicar como tratamiento preventivo o bajo condiciones predisponentes a la aparición de enfermedades. Si las condiciones favorables persisten, re-aplicar entre 10 y 20 días posteriores para proteger hojas nuevas. No aplicar sobre plantines de tomate ni durante las 3 semanas posteriores al trasplante. Puede causar síntomas de fitotoxicidad localizada en tomate cuando las gotas de la aplicación permanecen sin evaporarse durante un período prolongado. Se recomienda no aplicarlo bajo condiciones de alta humedad o predisponentes para la ocurrencia de rocío o niebla. (**)Estimado en base a un caldo de aplicación de 650-750 l/ha
Vid	Oídio (*Oidium tuckeri)*	30 - 40 cm3/100 litros de agua 300 - 400 cm3/ha	14 (*)	Aplicar como parte del programa preventivo)por calendario o sistema de alarma), con la dosis más baja, o bien a primera manifestación de síntomas, con la dosis más alta.
	Podredumbre ácida (*Aspergillus spp.)* Podredumbre ácida (*Rhizopus spp.)* Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)*	40 cm3/100 litros de agua 400 cm3/ha		Aplicar desde el momento de cuaje hasta 20 días antes de cosecha.
Yerba mate	Mal de la tela (Rhizoctonia binucleate)	400 cm3/ha + 1 litro/ha de aceite mineral parafínico que supere el 83% p/v	45	Aplicar a los primeros síntomas de enfermedad o bajo condiciones predisponentes a la aparición de enfermedad hasta 3 veces con un intervalo entre aplicaciones de 45 días.
Zapallito de tronco	Oídio de zapallito u oídio de las Cucurbitáceas (*Erysiphe cichoracearum)* Oídio de zapallito u oídio de las Cucurbitáceas (*Spharoetheca fuliginia)*	240-480 cm3/ha (**) 80-120 cm3/100 litros de agua (*)	1 (*)	Aplicar a los primeros síntomas de enfermedad o bajo condiciones predisponentes a la aparición de enfermedad. Si las condiciones favorables persisten, re-aplicar entre 10 y 14 días posteriores para proteger hojas nuevas. No aplicar durante las 3 semanas posteriores al nacimiento. Puede causar síntomas de fitotoxicidad localizada en zapallito cuando las gotas de la aplicación permanecen sin evaporarse durante un período prolongado. Se recomienda no aplicarlo bajo condiciones de alta humedad o predisponentes para la ocurrencia de rocío o niebla. (*) En caso de ser necesario utilizar aceite agrícola 0.5% volumen en volumen. De aceite mineral refinado que supere el 83% p/v. (**) Estimado en base a un caldo de aplicación de 300-400 l/ha.

(*) En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
(**)En caso de ser necesario, realizar una nueva aplicación.

Información General:

Es un fungicida que posee acción sistémica y de contacto, con características preventivas y curativas contra enfermedades de los cultivos de frutilla, girasol, maní, papa, pimiento, soja, colza, tomate, vid, arándanos, zapallito de tronco y yerba mate. También está recomendado para el uso en los cultivos de cerezo, guindo, durazno, nectarina, ciruelo y damasco.
Combina la acción preventiva y antiesporulante de azoxistrobina, perteneciente al grupo de las estrobilurinas, con el efecto erradicante de difenoconazole, perteneciente al grupo de los triazoles. La mezcla de ambos principios activos determina una acción combinada, bloqueando el proceso respiratorio y la síntesis de ergosterol en los hongos. Estas cualidades, aseguran un amplio espectro de control, reduciendo el riesgo de aparición de cepas resistentes.

Preparación: el producto es una suspensión concentrada que debe diluirse en agua.
Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:

- Agitar el producto antes de usarlo.
- Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen.
- Poner a funcionar el sistema de agitación.
- Agregar la cantidad necesaria directamente al tanque y sin disolución previa, de acuerdo a la calibración realizada.
- Con el sistema de agitación en movimiento, verificar que el producto se disuelva completamente.
- Agregar luego otros productos, en caso de realizar mezclas.
- Adicionar por último el coadyuvante aceite mineral parafínico 42,8%, únicamente en los cultivos de soja y maní.
- Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión.
- Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
- Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
- Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: el producto debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo a proteger. En cultivos extensivos, puede aplicarse con equipos terrestres de arrastre o autopropulsados, con barras provistas de picos de cono hueco para fungicidas, para lograr un tamaño de gota que alcance todas las partes verdes de la planta. Utilizar un volumen mínimo de agua de 150 l/ha, para lograr una buena penetración del producto y mojado del cultivo. También puede aplicarse en forma aérea, empleando un volumen mínimo de agua de 30 litros/ha. No se deben realizar aplicaciones con gasoil.
En el cultivo de vid, puede ser aplicado con atomizadores y equipos pulverizadores de alto y bajo volumen.
Se recomienda emplear pulverizadoras que tengan una uniforme distribución sobre el cultivo y que arrojen un volumen de 1000 l/ha.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización, Tomar las medidas necesarias, para evitar la deriva del producto hacia cultivos linderos, vegetación no blanco, fuentes hídricas y áreas pobladas. Dejar una zona o franja de seguridad sin tratar y especialmente en áreas de cultivos intensivos hacer uso de cortinas protectoras. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvias inmediatas. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Restricciones de uso:
No aplicar sobre plantines de tomate, ni durante las 3 semanas posteriores al trasplante.
No aplicar sobre tomate bajo condiciones de alta humedad o predisponentes para la ocurrencia de rocío o niebla.

Periodo de carencia: se deben dejar transcurrir los siguientes días entre la última aplicación de azoxistrobina 20% + difenoconazole 12,5% y la cosecha: colza: 50 días; yerba mate: 45 días; girasol, soja: 35 días; papa: 30 días; maní: 15 días; vid: 14 días; arándanos: 10 días, frutilla: 1 día; cerezo, guindo, ciruelo, durazno, nectarina (pelón), damasco, pimiento y tomate: 3 días; zapallito de tronco: 1 día. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Advertencia: la experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes a los fungicidas, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento. Para evitar la generación de resistencia, rotar con fungicidas de diferente modo de acción. No se deben realizar más de tres aplicaciones por ciclo del cultivo.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.
A los efectos de prevenir la resistencia, no se deben realizar más de tres aplicaciones por ciclo del cultivo. Rotar con fungicidas de diferente modo de acción.

Compatibilidad: compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas usados comúnmente. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos. En caso de realizar la mezcla en tanque con otros productos, agregar siempre por último el coadyuvante aceite mineral parafínico 42,8%, únicamente en los cultivos de soja y maní.

Fitotoxicidad
El producto no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta. En el cultivo de tomate puede causar síntomas de fitotoxicidad localizada, cuando las gotas de la aplicación permanecen sin evaporarse durante un período prolongado. Se recomienda no aplicarlo bajo condiciones de alta humedad o predisponentes para la ocurrencia de rocío o niebla.

Derrames:
Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 11 (FRAC) + 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo): DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: > 5 mg/l

Irritación dermal: Levemente irritante (Conejo)
Irritación ocular: Moderado irritante (Conejo)
Sensibilización dermal: Sensibilizante (guinea pigs)
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Moderadamente tóxico

Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad entre el área a tratar y el agua libre en superficie cercana.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Evitar la deriva durante las aplicaciones.
NO pastorear las áreas recientemente tratadas con el producto.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
AMISTAR TOP	SYNGENTA AGRO	34371	SC	20% + 12,5%	III
QUADRIS SOL	SYNGENTA AGRO	35433	SC	20% + 12,5%	III
QUADRIS TOP	SYNGENTA AGRO	38123	SC	20% + 12,5%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.