Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

DIFENOCONAZOLE + TIAMETOXAM

Nomenclatura Química:
difenoconazole: 1-[2-(4-(4-clorofenoxi)-2-clorofenil)-4-metil-1,3-dioxolan-2-il-metil]-1H-1,2,4-triazole.
tiametoxam:3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5]oxadiazinan-4-ilideno-N-nitroamina.
Clasificación Química: triazol + neonicotinoide.
Acción: sistémica.

Uso: curasemillas, fungicida e insecticida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	Momento de Aplicación
Trigo	Carbón hediondo o Caries (*Tilletia caries)* Carbón volador (*Ustilago tritici)* Gusano blanco (*Diloboderus abderus)*	250 cm3/100 kg de semillas de parte líquida 1 (difenoconazole) + 100 cm3/100 kg de semillas de parte líquida 2 (tiametoxam).	Tratamiento de semillas. Dosis según la cantidad de semillas a tratar. Si se desea un espectro más amplio de control de las enfermedades de la semilla y del suelo, agregar las siguientes dosis adicionales de difenoconazole (Parte Líquida 1) a las recomendadas en el cuadro anterior: - Golpe blanco del trigo (Fusarium graminearum) y Mancha de la hoja del trigo (Septoria tritici): 350 cm3/100 kg de semilla. - Para control parcial de Mancha amarilla (Dreschlera tritici repentis) y Pietín (Gaeumannomyces graminis): 550 cm3/100 kg de semilla.

Información General:

Fungicida/insecticida terápico para tratamiento de semillas. Provee control de enfermedades de las semillas de trigo y de insectos del suelo y aquellos que se alimentan o que succionan los tejidos vegetales del cultivo. Posee acción sistémica, es absorbido por la semilla y traslocado a través de la plántula. En el insecto afectado, muestra una rápida acción de contacto y estomacal, afectando el sistema nervioso del mismo. No afecta el poder germinativo de las semillas de trigo y les permite a éstas desarrollarse normalmente.

Preparación: el producto se debe aplicar sobre las semillas a tratar en forma de dilución (slurry). La dilución se prepara agregando al producto agua limpia en cantidad necesaria, hasta llegar a un volumen de 1 litro de caldo cada 100 kg de semilla.
1000 cm3/100 kg de semilla = 250 cm3 de parte líquida 1 + 100 cm3 de parte líquida 2 + 650 cm3 de agua
Para la preparación de la dilución (slurry), respetar las siguientes indicaciones: Añadir agua al recipiente en donde se preparará la mezcla hasta la mitad del volumen total. Agregar luego la cantidad necesaria de ambas partes del producto, según la cantidad de semillas a tratar. Agitar en forma mecánica o manual, asegurando una mezcla homogénea. Completar con agua hasta el volumen total de dilución. Mantener la agitación durante todo el tiempo de uso. La dilución debe ser usada dentro de las 24 horas de preparada. Utilizar siempre agua limpia.
El pack contenido en el bidón permite tratar 2000 kilos de semilla de trigo.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: el producto consta de dos partes, ambas formuladas como suspensión concentrada, que deben ser aplicadas sobre las semillas de trigo en forma de dilución. Para obtener una buena protección del cultivo, es indispensable distribuir el producto homogéneamente, asegurando que cada semilla quede cubierta en forma uniforme. El tratamiento en trigo se puede realizar con tambor rotativo de eje excéntrico, mezcladora tipo hormigonera, máquina mezcladora con sinfín o máquinas de tratamiento continuo con picos pulverizadores. Para obtener una buena protección del cultivo, es indispensable distribuir el producto homogéneamente, asegurando que cada semilla quede cubierta en forma uniforme. En el momento de la siembra, se debe calibrar la sembradora con semilla tratada con el producto, debido a que la semilla fluirá más lentamente.
NO aplicar ninguno de los dos productos directamente dentro de la sembradora.

Período de carencia: exento para el uso como curasemilla. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Atención: la venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra está penada por la ley. La ley 18073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados al consumo humano o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas), la ley dictamina el decomiso y multa. Piense que una sola bolsa de semilla curada mezclada en varios silos de granos para el consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa para la alimentación humana o animal, por lo tanto los infractores serán severamente penados.

Compatibilidad: puede mezclarse con otros terápicos para tratamientos de semillas. No se han detectado casos de incompatibilidad. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción según legislación local vigente. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En

Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC) + 4 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial/respiratoria y botas de goma.

Información Toxicológica:

Parte líquida 1 (difenoconazole 3%)
DL50 oral aguda: > 3000 mg/kg (rata).
DL50 dermal aguda: > 4000 mg/kg (rata).

Parte líquida 2 (tiametoxam 35%)
DL50 oral aguda: > 3000 mg/kg (rata).
DL50 dermal aguda: > 4000 mg/kg (rata).

No irritante dermal ni ocular. No sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:
Muy tóxico para peces y organismos acuáticos.
Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.

Altamente tóxico para abejas, aunque debido su uso como terápico de semillas, no se espera exposición para las mismas. Retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de siembra por un tiempo mínimo de 30 días. Tomar la precaución de no contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.
Ligeramente tóxico para aves. Las semillas tratadas deben ser enterradas adecuadamente y deben ser completamente cubiertas por el suelo. Si quedara semilla tratada, recogerla o enterrarla para evitar que sea ingerida por las aves u otros animales.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.