# BOSCALID + PYRACLOSTROBIN

**Marcas comerciales**: BELLIS.

**Nomenclatura Química:**
pyraclostrobin: (metil- N -[[[ 1-(4-clorofenil) pirazol-3-il] oxi] -o-tolil]-N-metoxicarbamato)
boscalid: 2-cloro-N-(4'clorobifenil-2-il)-nicotinamida.
**Tipo de producto:** químico + químico.
**Clasificación Química:** carboxamida + estrobilurina.
**Acción:** sistémica.

**Uso:** fungicida.

| Cultivo | Plaga | Dosis | TC | Momento de Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Almendro | Botrytis<br>(Botrytis cinerea) | 70 gr/hl | 25 | Iniciar las aplicaciones en el estadio de yema rosada y repetir en intervalos de 7 a 14 dias<br>Hasta 4 aplicaciones |
| Arándano | Alternaria<br>(*Alternaria tenuissima*)<br>Botrytis<br>(*Botrytis cinerea*)<br>Colletotrichum<br>(*Colletotrichum gloeosporioides*) | 1 kg/ha (volumen de agua 500 l/ha) | 7 | Aplicar preventivamente y ante condiciones climáticas predisponentes a las enfermedades. Es importante considerar la susceptibilidad varietal. Trabajar bajo esquema de monitoreo "MIE".<br>Número de aplicaciones: 1 aplicación. |
| Arveja | Antracnosis de la arveja<br>(Ascochyta pisi)<br>Oidio<br>(Erysiphe poligoni) | 0,25 kg/ha | 30 | Se recomienda realizar aplicaciones al inicio de floración, caso las condiciones sean favorables a la enfermedad repetir una segunda aplicación a los 14 días posteriores.<br>2 aplicaciones. |
| Berenjena | Tizón temprano<br>(Alternaria solanii) | 60 gr/hl | 15 | Preventivo, detección de primeros síntomas.<br>Número de aplicaciones: 3 aplicaciones. |
| Cebolla | Mildiu<br>(Peronospora destructor) | 0,3 kg/ha | 15 | Se recomienda realizar aplicaciones preventivas, iniciando los tratamientos cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad<br><br>3 aplicaciones. |
| Cerezo | Botrytis<br>(Botrytis cinérea)<br>Podredumbres postcosecha<br>(Rhizopus stolonifer) | 60 - 80 gr/hl | 1 | Aplicar en floración, comenzando desde botón floral. Si las condiciones son favorables para el desarrollo de las enfermedades aplicar nuevamente en plena flor. Utilizar la mayor concentración si el Tizón de la flor es causado por Botrytis cinerea.<br><br>1 a 2 aplicaciones cada 10-15 días según condiciones predisponentes para la enfermedad. |
| Damasco<br>Durazno | Podredumbre morena de los frutales<br>(*Monilinia fructicola*) | 50 gr/hl | 7 | Se recomienda en general la aplicación a inicio de madurez del fruto (envero) (7 a 15 días antes del inicio de la cosecha) según maduración por variedad o con la ocurrencia de frecuentes lluvias o granizo.<br>En la Zona de San Pedro e influencia, con primaveras húmedas, se recomienda aplicar en inicio de floración.<br>Número de Aplicaciones: 1 aplicación. |
| Frutilla | Botrytis<br>(*Botrytis cinerea*) | 0,75 kg/ha (volumen de agua de 400 l/ha) | 1 | Aplicar en condiciones climáticas predisponentes.<br>No realizar más de 2 aplicaciones por temporada. |
| Maní (2) | Marchitamiento<br>(Sclerotium rolfsii)<br>Viruela tardía<br>(Cercosporidium personatum)<br>Viruela temprana<br>(Cercospora arachidicola) | 0,35 - 0,5 kg Boscalid<br>+<br>Pyraclostrobin/ Ha<br>+<br>2 aplicaciones consecutivas de Pyraclostrobin<br>+<br>Epoxiconazole 0,75 l/ha | 50 | Programa de aplicaciones recomendado:<br>1º aplicación: Boscalid + Pyraclostrobin, aplicar preventivamente a los 60-70 días de emergencia del maní para lograr un mejor control de marchitamiento.<br>2º aplicación: 14-21 días de la 1º aplicación, según condiciones favorables para el desarrollo de las enfermedades (elevada humedad ambiente, lluvias y elevada temperatura), aplicar Pyraclostrobin + Epoxiconazole 0,75 l/ha (ver marbete del producto).<br>3º aplicación: 21-28 días de la 2º aplicación (según intensidad de la enfermedad), aplicar Pyraclostrobin + Epoxiconazole 0,75 l/ha (ver marbete del producto).<br>1 aplicación de Boscalid + Pyraclostrobin + 2 aplicaciones consecutivas de Pyraclostrobin + Epoxiconazole. |
| Manzana | Alternaria<br>(Alternaria spp)<br>Botrytis<br>(Botrytis cinerea) | 50 gr/hl | 1 | Aplicar de 7 a 15 antes de la cosecha<br>1 aplicación |
| Nuez Pecan | Sarna<br>(Cladosporium spp.) | | 14 | Aplicar preventivamente, antes del desarrollo de la enfermedad, y realizar aplicaciones con un intervalo de 7 a 21 días entre aplicaciones.<br>Hasta 4 aplicaciones |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Papa (1) | Tizón temprano<br>(Alternaria solani) | 0,25 kg/ha | 15 | Aplicar cada 15 días a partir de los 75 - 80 días de cultivo.<br>(Sudeste Provincia de Buenos Aires)<br>Número de Aplicaciones: No realizar más de 2 aplicaciones por temporada. |
| Peras | Alternaria<br>(Alternaria spp)<br>Botrytis<br>(Botrytis cinerea)<br>Cladosporium<br>(Cladosporium herbarum) | 50 gr/hl | 1 | Aplicar de 7 a 15 antes de la cosecha<br>1 aplicación |
| Pistacho | Botrytis<br>(Botrytis cinerea) | 60 gr/hl | 14 | Aplicar preventivamente, antes del desarrollo de la enfermedad.<br>1 aplicación |
| | Alternaria<br>(Alternaria spp.) | 70 gr/hl | | Aplicar preventivamente, antes del desarrollo de la enfermedad.<br>3 aplicaciones con un intervalo de 10 a 30 días entre aplicaciones |
| Pimiento | Oidiopsis<br>(Leveillula taurica)<br>Stemphyllium<br>(Stemphylium solani)<br>Tizón temprano<br>(Alternaria solani) | 60 gr/hl | 1 | Preventivo, detección de primeros síntomas.<br>Número de aplicaciones: 3 aplicaciones. |
| Tomate | | | 15 | |
| Vid | Botrytis<br>(Botrytis cinerea) | 1,2 kg/ha | | Desde pre cierre de racimo hasta 3 semanas pre-cosecha.<br>Número de aplicaciones: No realizar más de 2 aplicaciones por temporada. |
| | Oídio<br>(Oidium tuckeri) | 0,5 kg/ha | | Desde brotes de 15 cm a pre cierre de racimo.<br>Número de aplicaciones: No realizar más de 2 aplicaciones por temporada. |
| Zanahoria | Alternaria<br>(Alternaria spp.) | 0,5 kg/ha | 0 | Aplicar en forma preventiva y repetir las aplicaciones cada 7 a 14 días. Utilizar el intervalo más corto cuando se observa alta presión de la enfermedad<br>Hasta 3 aplicaciones |
| | Oidio<br>(Erysiphe sp.) | 0,7 kg/ha | | |

(1) Para el control de Tizón Tardío de la papa (Phytophtora infestans) aplicar productos específicos para su control.
(2) Bellis en maní; utilizar la dosis mayor con elevadas condiciones predisponentes.

**Información General:**

Es un fungicida a base de los principios activos boscalid y pyraclostrobin; de efecto preventivo, curativo y de acción prolongada. Actúa por inhibición de la germinación de esporas de hongos, la elongación del tubo terminativo, el crecimiento miscelar y la esporulación. Posee efecto translaminar y una acción sistémica local. Asimismo, otorga una prolongada persistencia de acción y reduce el riesgo de resistencia, ya que sus ingredientes activos pertenecen a diferentes grupos químicos. Como una práctica general de manejo de resistencia de hongos a fungicidas, se recomienda aplicar este producto en mezcla o alternado con otros fungicidas registrados, con distinto modo de acción.

Preparación de la solución
Debe ser aplicado con agua. Para preparar la mezcla, llénese el depósito de la pulverizadora con agua hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad.
Luego, con el agitador en funcionamiento, vierta la cantidad recomendada de producto al tanque del pulverizador. Complete el tanque con agua. Mantener el caldo en agitación durante toda la aplicación.

Equipos y técnicas de aplicación
En el cultivo de papa y maní: se pueden realizar la aplicación con equipos pulverizadores de arrastre o tres puntos provistos de barra y botalón. Utilizar volúmenes de agua que aseguren una buena cobertura del follaje, pastillas de cono hueco y presión adecuada.
En el cultivo de vid: se recomienda su aplicación con máquinas pulverizadoras de alto o bajo volumen manuales o con motor, efectuando un mojado completo de las plantas pulverizando hasta punto de goteo.
En el cultivo de tomate y pimiento: se recomienda la aplicación con mochilas de presión manual o motopulverizadoras con mangueras y lanzas de alta presión (entre 80 y 200 lbs/pulg2) y el mojado debe ser hasta punto de goteo cubriendo totalmente la planta. El volumen de agua necesario estará en función del tamaño del cultivo pudiendo variar de 500 a 2000 l/ha.
En el cultivo de durazno y damasco: se recomienda su aplicación con máquinas pulverizadoras de alto volumen, de gota trasportada por turbina. Debe efectuarse el correcto y completo mojado de toda la canopia, asegurando el correcto pulverizado de plantas perimetrales. El volumen de agua necesario estará en función del tamaño de las plantas. Ajustar por TRV. En plantas adultas puede variar entre 1800 a 2200 litros por hectárea. En plantas jóvenes o de poda corta puede variar entre 1000 y 1800 litros por hectárea.
En el cultivo de arándano: se recomienda la aplicación con mochilas de presión manual o pulverizadoras de alto volumen, de gota transportada por turbina, en función del tamaño de las plantas. El mojado debe ser completo, asegurando la entrada de las gotas al interior de la canopia. El volumen de agua necesario estará en función del tamaño del cultivo pudiendo variar de 200 a 1000 l/ha. Se recomienda ajustar por TRV.
En el cultivo de frutilla: Se recomienda la aplicación con mochilas de presión manual o mecánicas, provistas de pastillas de cono hueco y presión adecuadas. Los volúmenes de aplicación pueden variar de 400 a 500 litros por hectárea para surcos a 60 cm y densidades de 5 y 7 plantas por metro cuadrado. Se recomienda ajustar por TVR.
En el cultivo de cebolla: Se recomienda la aplicación con equipo pulverizador con un volumen de agua de 250 a 400 litros por hectárea.
En el cultivo de zanahoria: Se recomienda la aplicación con equipo pulverizador con un volumen de agua de 300 litros por hectárea.
En los cultivos de pera y manzana: Se recomienda la aplicación con un volumen mínimo de 2000 litros por hectárea.

En el cultivo de maní y arveja: Se recomienda la aplicación con equipo pulverizador con un volumen de agua de no inferior a 150 litros por hectárea.
En el cultivo de cerezo: considerar volúmenes de aplicación de 1500 litros por hectárea.
En el cultivo de Almendro y Pistacho: se recomienda la aplicación con un volumen entre 1200 y 1500 litros por hectárea dependiendo del tamaño de los árboles.
En el cultivo de Nuez Pecan: se recomienda la aplicación con un volumen de 1500 litros por hectarea dependiendo del tamaño de los árboles.

El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

Compatibilidad
Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios usados usados en los cultivos mencionados. Para mezclas específicas consultar con el departamento técnico BASF.

**Derrames:**
Barrer el material derramado y colocarlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior incinerado. No utilizar containers de aluminio ni de acero sin costuras. Posteriormente vierta agua sobre el área de derrame por un período prolongado evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas. Adsorber el líquido de enjuague con material adsorbente como arcilla, aserrín o material específico para derrames y colocarlo en el mismo container cerrado con el resto del producto derramado.
En caso de emergencia (Argentina), llamar al 02320 491510 al 13 ó 03402 490007 al 09

**Clasificación (modo o sitio de acción):** 7 (FRAC) + 11 (FRAC).

**Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:**
Protector facial, guantes de goma de nitrilo y botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos y mameluco o delantal extralargo.

**Información Toxicológica:**

| | |
|---|---|
| Toxicidad oral aguda (rata): | DL 50: 1490 mg/kg |
| Toxicidad dermal aguda (rata): | DL 50: > 2000 mg/kg |
| Toxicidad inhalatoria aguda: | CL 50 > 5,4 mg/l |
| Irritación dermal: | Irritante |

Riesgos ambientales

| | |
|---|---|
| Toxicidad para abejas: | Virtualmente no tóxico |
| Toxicidad para aves: | Prácticamente no tóxico |
| Toxicidad para peces: | Extremadamente tóxico |

No aplicar en forma terrestre dentro de los 10 metros de distancia de lagos, ríos, corrientes de agua permanente, lagunas naturales, estuarios, pantanos y criaderos comerciales de peces. En aplicaciones aéreas evitar que las mismas se realicen sobre superficies acuáticas. Deriva o escurrimientos desde áreas tratadas con el producto hacia cuerpos de agua adyacentes a la aplicación pueden resultar peligrosos para organismos acuáticos.

| Marca | Empresa | N° Inscrip. | Form. | Conc. | C.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| BELLIS | BASF ARGENTINA | 34561 | WG | 12,8% + 25,2% | II |

**Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.**
**Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.**