IPCONAZOLE + METALAXIL

Marcas comerciales: DIMENSION - RANCONA DIMENSION - RANCONA DIMENSION SEMILLERO.

Nomenclatura Química:
ipconazole: (1RS, 2SR, 5RS) (1RS, 2SR, 5SR)-2-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol
metalaxil: methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate
Tipo de producto. químico.
Clasificación Química: triazol + acilalanina.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: curasemillas y fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Momento de Aplicación
Maíz	Complejo de hongos del suelo o Damping-off (*Phytium spp.)* Hongo del suelo (*Aspergillus flavus)* Hongos del suelo (*Penicillium spp.)* Hongos del suelo (*Fusarium spp.)* Hongos del suelo (*Cladosporium spp.)*	75 - 100 cm3 cada 100 kg de semilla	Tratamiento de semilla previo a la siembra.
Soja	Complejo de hongos del suelo o Damping-off (*Phytium spp.)* Hongos del suelo (*Penicillium spp.)* Hongos del suelo (*Aspergillus spp.)* Hongos del suelo (*Alternaria spp.)* Hongos del suelo (*Rhizoctonia spp.)* Hongos del suelo (*Phomopsis spp.)* Hongos del suelo (*Cercospora kikuchii)*		
Maní	Damping-off (*Penicillium spp.)* Hongos del suelo (*Aspergillus spp.)*	100 - 125 cm3 cada 100 kg de semilla	
Arveja o Alverja	Damping off *(Fusarium spp.)* Damping-off *(Rhizoctonia spp.)*		

Nota: el uso de la dosis mayor es recomendado en casos de alta presión del inóculo de la enfermedad.

Información General:

Es un fungicida especialmente formulado como microemulsión para el tratamiento de semillas de maíz, soja, maní y arveja, que combina la acción de ipconazole y metalaxil. Tiene acción sistémica y de contacto logrando un excelente control de un amplio espectro de enfermedades diseminadas por las semillas como así también de hongos presentes en el suelo.

Es un producto formulado para ser usado con equipos específicos para tratamiento de semillas. Con ellos se logran los mejores resultados de aplicación. Cuando no se disponga de este tipo de equipamiento puede utilizarse un tambor rotativo de eje excéntrico u otro sistema rotativo de aplicación. Debe tenerse en cuenta que la distribución homogénea del producto es fundamental para la obtención de un resultado satisfactorio.

Instrucciones para el uso:
Preparación:
Se deberá diluir la dosis en agua de acuerdo a las recomendaciones dadas para cada cultivo. Puede aplicarse con inoculantes para leguminosas.
Es un producto formulado para ser usado con equipos específicos para tratamiento de semillas. Con ellos se logran los mejores resultados de aplicación. Cuando no se disponga de este tipo de equipamiento puede utilizarse un tambor rotativo de eje excéntrico u otro sistema rotativo de aplicación. Debe tenerse en cuenta que la distribución homogénea del producto es fundamental para la obtención de un resultado satisfactorio.
Dosis:
Maní: 750 cm3 (dosis de formulado + agua)
Maíz: 1000-1500 cm3 (dosis de formulado + agua)
Soja: 500 cm3 (dosis de formulado + agua)
Arveja: 500-600 cm3 (dosis de formulado + agua)

Compatibilidad
Antes de realizar mezclas con otros agroquímicos de uso corriente se recomienda hacer una prueba de compatibilidad en pequeña escala según recomendación de un Ingeniero Agrónomo. No aplicar con productos de reacción alcalina.:
Restricciones de uso: no corresponde período de carencia por tratarse de un producto de uso posicionado. No debe pastorearse o alimentarse ganado hasta transcurridas siete semanas desde la siembra. Se debe tener especial cuidado con el manejo de la semilla tratada.
No se recomienda el mezclado en el cajón de la sembradora

Atención: La venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra está penada por la ley. La ley 18073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados al consumo humano o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas), la ley dictamina el decomiso y multa.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico. Los derrames se deben contener y adsorber empleando tierra o arena. El material deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC) + 4 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Protector facial, protección respiratoria, guantes de goma de nitrilo y botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos.

Información Toxicológica:

Del producto formulado (2,5% + 2%)
DL50 oral aguda: > 3000 mg/kg
DL50 dermal aguda: > 4000 mg/kg
CL 50 Inhalatoria: > 3,42 mg/l. Categoría inhalatoria III: Cuidado.

Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	Leve irritante ocular. Leve Irritante ocular(Cuidado) - Categoría IV
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Primeros auxilios: por salpicaduras en ojos lavar con abundante agua limpia por 15 minutos.
En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
En caso de ingestión accidental enjuagar la boca y beber abundante agua.
En todos los casos LLAMAR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO.

Advertencia para el médico: aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales:
Toxicidad en abejas: virtualmente no tóxico. Uso posicionado.
Toxicidad para peces: ligeramente tóxico.
Toxicidad para aves: prácticamente no tóxico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
DIMENSION	UPL ARGENTINA S.A.	36682	MS	2,5% + 2%	III
RANCONA DIMENSION	UPL ARGENTINA S.A.	34972	MS	2,5% + 2%	III
RANCONA DIMENSION SEMILLERO	UPL ARGENTINA S.A.	36080	MS	2,5% + 2%	III

RANCONA DIMENSION SEMILLERO ha sido especialmente formulado sin colorante para incorporar un color a elección. Exclusivo para semilleros.

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.