PICOXYSTROBIN

Marcas comerciales: ACAPELA ONMIRA ACTIVE.

Nomenclatura Química:
picoxystrobin: metil (E)-2-[2-(6-trifluorometilpirydin-2-yloxymetil)-fenil]= 3-metoxyacrilato
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: estrobilurina.
Acción: sistémica, preventiva, curativa y antiesporulante.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cebada cervecera	Mancha en red (*Drechslera teres)*	300 cm3/ha + 750 cm3/ha de aceite mineral parafínico 42,8%	35	Con hoja bandera desplegada, cuando comiencen a aparecer los primeros síntomas en las dos hojas inferiores.
Papa	Tizón temprano (*Alternaria solani)*	500 cm3/ha	7	Iniciar las aplicaciones en forma preventiva cuando las condiciones son predisponentes para el desarrollo del patógeno; o frente a la aparición de los primeros síntomas.
Pimiento Tomate	Oidiopsis (*Leveillula taurica)*	75 - 85 cm3/hl	1	Iniciar las aplicaciones en forma preventiva cuando las condiciones son predisponentes para el desarrollo del patógeno; o frente a la aparición de los primeros síntomas.
Poroto	Mancha angular (*Phaeoisariopsis griseola)*	250 - 350 cm3/ha	35	Aplicación foliar utilizando pulverizadores terrestres.
Soja	Mancha marrón o Septoriosis (*Septoria glycines)* Mancha púrpura de la semilla, Tizón de la hoja (*Cercospora kikuchii)* Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)*	200 cm3/ha + 500 cm3/ha aceite mineral parafínico 42,8%	30	Aplicar en forma preventiva, antes de la aparición de la enfermedad, cuando se detecten condiciones ambientales predisponentes. Luego de la primera aplicación, si las condiciones predisponentes persisten, se deberá repetir la aplicación a partir de los 14 días.
Trigo	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Mancha de la hoja del trigo (*Septoria tritici)* Roya anaranjada del trigo (*Puccina recondita)*	300 cm3/ha + 750 cm3/ha de aceite mineral parafínico 42,8%		Con hoja bandera desplegada, cuando comiencen a aparecer los primeros síntomas en las dos hojas inferiores.
Zapallo	Oídio del zapallo (*Erysiphe cichoracearum)*	75 - 85 cm3/hl	1	Iniciar las aplicaciones en forma preventiva cuando las condiciones son predisponentes para el desarrollo del patógeno; o frente a la aparición de los primeros síntomas.

Información General:

Es un fungicida con acción sistémica y propiedades de redistribución, tales como movimiento en la serosidad de la hoja y actividad translaminar.
Actúa inhibiendo el proceso respiratorio de los hongos impidiendo la germinación de esporas y el desarrollo inicial del patógeno.
Equipo y técnica de aplicación: puede ser aplicado con equipos terrestres de arrastre o autopropulsados, cuyos picos estén provistos de pastillas de cono hueco con el fin de lograr una cobertura uniforme sobre todas las partes verdes de la planta (entre 40 y 60 impactos/cm2)
Utilizar un volumen mínimo de agua de 150 l/ha y una presión superior a 50 - 60 lb/pulg2, para lograr una buena penetración del producto y mojado del cultivo.
Puede aplicarse por avión empleando un volumen mínimo de agua de 20 - 30 l/ha (no aplicar con gasoil).
Los equipos de aplicación deberán estar correctamente calibrados con agua antes de la aplicación, con sus picos limpios, en buenas condiciones para lograr una cobertura uniforme. Luego de cada jornada de trabajo, lavarlo con abundante agua desechando la misma lejos de manantiales, cursos o fuentes de agua.
Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km por hora.

Compatibilidad: se puede mezclar con la mayoría de los agroquímicos de reacción neutra: en caso de duda realizar un ensayo de compatibilidad.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (arena,tierra). En ambos casos colocar el material recogido en tambores rotulados y cubrirlo totalmente con una solución al 1% de agua amoniacal (1 litro cada 100 litros de agua). Colocar el material impregnado en un recipiente bien identificado, para su posterior destrucción por empresas autorizadas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 11 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Formulación al 25% SC:

Durante la preparación y aplicación: use guantes, botas de goma, sombrero o casco, protector facial y ropa protectora adecuada. Usar equipo de protección personal para cargar el equipo (protector facial y ocular, guantes de nitrilo y botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos) y durante la aplicación (guantes de nitrilo y botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos).

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50: >2000 mg/kg.
Toxicidad dermal aguda (conejo):	DL 50: >2000 mg/kg.
Toxicidad inhalatoria (rata):	CL 50: 2,12-3,19 mg/l.
Irritación dermal:	Levemente irritante
Sensibilización cutánea (cobayos)	Sensibilizante débil
Irritación ocular (conejo):	Moderado irritante

Tratamiento: No existe antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático

Riesgos ambientales

Toxicidad para peces:	Muy tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ACAPELA ONMIRA ACTIVE	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	34512	SC	25%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.