PICOXYSTROBIN + CYPROCONAZOLE

Marcas comerciales: JUNO FUSION - ROZOX - STINGER.

Nomenclatura Química:
picoxistrobin: metil (E)-2-[2-(6-trifluorometilpirydin-2-yloxymetil)-fenil]-3-metoxyacrilato.
cyproconazole: 2-(4-clorofenil)-3-ciclopropil-1-(IH-1,2,4-triazol-1-il)-butano-2-ol.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: metoxiacrilato + triazol.
Acción: sistémica, residual, preventiva y curativa.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cebada	Mancha en red (*Drechslera teres)*	300 a 400 cm3/ha (*)(**)	35	El desarrollo de enfermedades normalmente ocurre desde principio de encañazón hasta hoja bandera completamente desplegada (última hoja que se despliega). Aplicar durante este período cuando aparezcan los primeros síntomas ó tan pronto como las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo de enfermedades. Dentro del período señalado es muy importante proteger la hoja bandera y la inmediata inferior, dada la importancia de las mismas en el llenado de granos y definición del rendimiento.
Trigo	Mancha amarilla (Drechslera tritici-repentis) Mancha de la hoja del trigo (Septoria tritici) Roya anaranjada del trigo (Puccina recondita)			
Maíz	Roya del común (*Puccinia sorghi)*	500 - 600 cm3/ha (**)	80	Aplicar a partir de V6, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.
	Tizón del Norte o de la hoja (*Exserohilum turcicum = helminthosporium turcicum)*	600 cm3/ha (**)		
Maní	Viruela tardía (*Cercosporidium personatum)* Viruela temprana (*Cercospora arachidicola)*	400 cm3/ha (**)	35	Aplicar al observar los primeros síntomas de la enfermedad. En caso de persistir condiciones favorables y aparecer nuevas pústulas, realizar una segunda aplicación a los 28 días.
Soja	Mancha marrón o Septoriosis (*Septoria glycines)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)* Mancha púrpura de la semilla, Tizón de la hoja (*Cercospora kikuchii)*	250 - 300 cm3/ha (**) (***)	30	Complejo de enfermedades de fin de ciclo: a partir de R3 hasta R5.5 cuando se observen los primeros síntomas en la planta.
	Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)*	300 cm3/ha (**)		Aplicar al observar los primeros síntomas (con el cultivo en el estado de R3 a R5). En caso de persistir condiciones favorables y aparecer nuevas pústulas, realizar una segunda aplicación.

(*) Utilizar la dosis mayor en las regiones trigueras IV y V Sur, o en caso de aplicaciones en cultivares de ciclo largo. También utilizar la dosis mayor en aquellas variedades caracterizadas como susceptibles, según calificación de cultivares o información zonal o regional del INTA.
(**) Para obtener mayor estabilidad y consistencia en los resultados de control se recomienda el agregado del coadyuvante aceite mineral a una dosis de 1 a 0,5 litros cada 100 litros de caldo de aplicación (1 - 0,5 %) o aceite mineral parafínico 42.8% a una dosis de 500 cm3/ha de caldo de aplicación.
(***) Utilizar la dosis mayor cuando las condiciones sean favorables al desarrollo de enfermedad. Caso contrario utilizar las dosis menores.

Información General:

Es un fungicida de uso agrícola, con propiedades sistémicas, acción preventiva, curativa post infectiva (en las primeras fases luego de la infección), y efecto residual, para el control de las enfermedades detalladas en los cultivos de trigo, maíz, cebada, soja y maní.
Actúa como inhibidor de la respiración mitocondrial de las células de los hongos interfiriendo en el ciclo de vida de los mismos, principalmente en los procesos de germinación de las esporas, infección y crecimiento de las hifas. Además, interrumpe la biosíntesis del ergosterol, el cual es un componente esencial de la pared celular de los hongos. Es transportado en forma translaminar y acropétala dentro de las hojas y posee movimiento sistémico vía xilema.
Es activo contra patógenos de las clases de los ascomicetes, basidiomycetes y deuteromicetes.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Para su preparación, seguir los pasos aconsejados en la etiqueta. Evitar que se produzca escurrimiento del mismo por exceso de agua.
Puede ser aplicado con equipos terrestres o aéreos. En aplicaciones terrestres se deben utilizar caudales no inferiores a 200 l/ha de agua, trabajando con una presión de 50 - 80 lb/pulg2 (5,5 - 7 bar) para lograr una buena penetración del producto y mojado del cultivo. Los picos más aptos son los de cono hueco y doble abanico plano. Se deben lograr entre 40 y 60 impactos/cm2 de la superficie foliar.
Con equipos aéreos se debe utilizar un caudal no menor de 30-40 l/ha, calibrando el equipo para asperjar entre 30-40 gotas/cm2. No aplicar utilizando gas oil. No exceder nunca el ancho efectivo de trabajo de la aeronave.
Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/h.

Recomendaciones de uso:
Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes, ya que no se podrá reutilizar en otra oportunidad, debiendo ser eliminado en forma segura, sin contaminar aguas cercanas.
Tratamiento de envases vacíos: realizar la técnica de triple lavado o lavado a presión inmediatamente luego de vaciar su contenido en la pulverizadora. Realizar el procedimiento 3 veces. Inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la

etiqueta. Los envases y bolsas inutilizados deben enviarse a Centros de Almacenamiento Transitorio habilitados para su disposición final. Utilizar el equipo de protección personal durante la realización de esta tarea.
Las cualidades preventivas y el efecto curativo del producto dan plasticidad para permitir el control de los patógenos durante todo su ciclo de desarrollo. Se recomienda que la aplicación se realice a la aparición de los primeros síntomas de enfermedad para evitar que el progreso del patógeno impacte sobre el rendimiento.
Es de uso exclusivo agrícola. No utilizar en cultivos ornamentales, hidropónicos o cualquier otro uso distinto de lo específicamente indicado en esta etiqueta. No debe aplicarse en cultivos sometidos a estrés ni debe aplicarse si se prevén lluvias dentro de las tres horas luego de la aplicación.

Período de carencia: Soja: 30 días; Trigo, Cebada y Maní: 35 días; Maíz: 80 días.
En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Tiempo de reingreso al área tratada: dejar transcurrir 12 horas después de la aplicación para ingresar al área tratada. En caso de necesitar hacerlo con anticipación, realizar el ingreso con el equipo de protección personal adecuado.

Compatibilidad: es compatible con la mayoría de los compuestos fitosanitarios excepto los de reacción alcalina como el caldo bordelés y polisulfuro de calcio. Los productos compatibles a ser utilizados deben estar registrados para ese uso particular.

No es fitotóxico para los cultivos recomendados y en las condiciones de uso detalladas.

Derrames:
Contener y absorber el producto derramado con material inerte (tierra, arena o aserrín). Barrer y recoger el mismo en bolsas o recipientes correctamente rotulados para su posterior destrucción por empresas autorizadas para tal fin. Lavar con abundante agua y jabón el área contaminada. Evitar que el derrame contamine aguas de riego y/o de uso doméstico. En caso de que esto ocurra, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal.

Clasificación (modo o sitio de acción): 11 (FRAC) + 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Utilizar indumentaria protectora adecuada: antiparras, barbijo, guantes impermeables, pantalón, camisa de manga larga y botas de goma.
En aplicaciones prolongadas y sin la debida protección, el producto puede irritar la piel. Utilizar siempre los equipos de protección recomendados.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50: > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo):	DL 50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL 50: poco peligroso (ingredientes activos).
Irritación dermal:	Levemente irritante
Irritación ocular:	Levemente irritante
Sensibilización cutánea:	No sensibilizante
Mutagénesis:	No mutagénico

Tratamiento: No existe antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
No se conocen síntomas específicos de intoxicación aguda. No presenta advertencias toxicológicas especiales.

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico.
Toxicidad para aves:	Ligeramente tóxico.
Toxicidad para peces y org acuáticos:	Muy tóxico

Precauciones ambientales:
Dejar 5 metros de franja de seguridad entre áreas tratadas y cuerpos o cursos de agua. Deben extremarse los cuidados para evitar la contaminación directa de los cuerpos de agua ya sea durante la aplicación y uso del producto, o durante las operaciones de carga y limpieza del equipo, enjuague de envases vacíos, etc. Evitar la deriva de la pulverización.
En todos los usos del producto debe dejarse una franja sin aplicar (zona buffer) de al menos 5 metros sobre las riberas de cuerpos o cursos de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
JUNO FUSION	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	37762	SC	20% + 8%	III
ROZOX	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	40646	SC	20% + 8%	III
STINGER	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	34642	SC	20% + 8%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.