Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

HIDRACIDO DEL ACIDO CITRICO + CU + ZN

Marcas comerciales: DENTAMET.

Nomenclatura Química:
hidrácido del ácido cítrico a base de Zn y Cu complejado con citratos.
Clasificación Química: biológico (no corresponde c.q.).
Acción: aporte de nutrientes, corrección de carencias de zinc y cobre y efectos bactericidas y fungicidas.

Uso: fertilizante.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Momento de Aplicación
Ajo Cebolla	Alternaria (*Alternaria spp.)* Mancha de la hoja (*Stemphylium sp)* Mildiu del ajo y la cebolla (*Peronospora destructor)*	2 - 4 l/ha	Aplicar en forma preventiva o al aparecer los primeros síntomas. Ante alta presión de la enfermedad, repetir a los 7 días.
Apio	Viruela del apio (*Septoria apiicola)*		
Arándano Frambueso	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)*	300 - 700 cm3/hl	Desde envero en adelante si existen condiciones predisponentes.
Cítricos o citrus	Antracnosis de los citrus (*Colletotrichum gloeosporioides)* Cancrosis de los citrus (*Xanthomonas campestris pv. citri)* Fumagina de los citrus (*Capnodium citri)* Mancha grasienta de los citrus (*Mycosphaerella citri)* Melanosis (*Diaporthe citri)* Sarna del naranjo agrio (*Sphaceloma fawcettii var. scabiosa)*	500 cm3/hl	1) Antes de la floración. 2) Después de la floración. 3) Fruto con 2-3 cm. de diámetro. 4) Repetir a los 25-30 días.
Crucíferas	Mildiu de las crucíferas (*Peronospora parasitica)* Pudrición bacteriana (*Erwinia sp.)*	2 - 4 l/ha	Aplicar en forma preventiva o al aparecer los primeros síntomas. Ante alta presión de la enfermedad, repetir a los 7 días.
Frutales de carozo	Roya (*Tranzchelia discolor)*	500 - 800 cm3/hl	Al observar los primeros síntomas.
	Torque (*Taphrina deformans)* Viruela holandesa (*Coryneum carpophilum)*		Yema hinchada, botón rosado, caída de pétalos.
Frutilla	Mancha angular (*Xanthomonas fragariae)*	500 cm3/hl	Según condiciones favorables, desde 10 días de trasplante.
	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)*		Desde envero en adelante.
Lechuga	Mildiu de la lechuga (*Bremia lactucae)* Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)*	2 - 4 l/ha	Aplicar en forma preventiva o al aparecer los primeros síntomas. Ante alta presión de la enfermedad, repetir a los 7 días.
Legumbres	Antracnosis de la arveja (*Ascochyta pisi)* Mildiu de la arveja (*Peronospora viciae pisi)*	2 - 3 l/ha	Con plantas de 20 cm, cada 20 días. Preventivo en pre y post floración.
Papa	Marchitez bacteriana de las solanáceas (*Pseudomonas solanacearum)* Pie negro de la papa (*Erwinia carotovora p.v. atroseptica)* Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)* Tizón temprano de la papa (*Alternaria solani)*	2 - 4 l/ha	Aplicar en forma preventiva o al aparecer los primeros síntomas. Ante alta presión de la enfermedad, repetir a los 7 días.
Peras	Tizón bacteriano de la flor (*Erwinia amylovora)*	800 cm3/hl	Inicio de floración y plena floración.
Pimiento Tomate	Cancro bacteriano del tomate (*Clavibacter michiganense)* Mancha bacteriana (*Xanthomonas sp.)*	2 - 4 l/ha	Aplicar en forma preventiva o al aparecer los primeros síntomas. Ante alta presión de la enfermedad, repetir a los 7 días.

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

	Peca bacteriana (*Pseudomonas sp.)* Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)* Tizón temprano de la papa (*Alternaria solani)*		
Vid de mesa y de vinificar	Peronóspora (*Plasmopara viticola)*	300 - 600 cm3/hl	Según condiciones favorables.
	Podredumbre de los racimos (*Alternaria spp.)* Podredumbre de los racimos (*Botrytis spp.)* Podredumbre de los racimos (*Penicillum spp.)* Podredumbre de los racimos (*Rhizopus spp.)* Podredumbres de los frutos (*Cladosporium spp.)*	500 - 800 cm3/hl	Floración, cierre de racimo, envero, precosecha, según condiciones favorables.

Información General:

Es un novedoso fertilizante quelatado, de fácil absorción, que mejora las condiciones de los cultivos, con efectos fungi - bacteriotóxicos.

Puede aplicarse sin límites hasta el día de la cosecha, inclusiva en cultivos de exportación.

Composición:

Cobre	26 gr/l
Zinc	47 gr/l
Agente complejante, ácido cítrico	214 gr/l
Total del complejo quelatado (hidrácidos de ácido cítrico)	287 gr/l

Modo de acción:
Zinc y Cobre quilatados con citratos fácilmente asimilables. Además de su natural aporte de nutrientes actúa como tóxico citoplasmático, resultado de la acción conjunta del ácido cítrico y la acumulación de iones metálicos en hongos y bacterias, afectando así a sus proteínas citoplasmáticas y celulares. Por otra parte presenta un efecto inhibidor sobre propágulos y esporas.

Modo de aplicación:
Pulverización foliar con todo tipo de pulverizadores, incluyendo nebulizadores (foggers).

Compatibilidad:
- Compatible con la mayoría de los agroquímicos.
- Es recomendable una prueba previa cuando se realicen mezclas para evitar incompatibilidades.
- No utilizar con aceites.

Derrames:

Contener el derrame de producto. Prevenir que los derrames ingresen en desagües, cursos de agua, piletas, etc.
Recoger con material absorbente y colocar en recipientes adecuados para su reciclado, reutilización o desecho.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Para evitar el contacto con la piel o los ojos, use mangas largas, mameluco, guantes de cuero y anteojos de seguridad con defensas laterales, protección respiratoria.

Información Toxicológica:

No afecta a los microorganismos benéficos.
Ante cualquier accidente químico consultar con Centros de Atención de Emergencias Toxicológicas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Grado/Conc.
DENTAMET	BROMETAN	14679	LÍQUIDO	21,4% de acido cítrico + 2,6% Cu + 4,7% Zn