SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO

Marcas comerciales: ADAMA MASTERCOP

Nomenclatura Química:
Sulfato de cobre pentahidratado.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: inorgánico.
Acción: de contacto, preventiva y curativa.

Uso: bactericida y fungicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Arveja o alverja Poroto	Antracnosis (*Colletotrichum spp.)*	150 - 175 cm3/100 litros de agua.	14	Aplicar después de la formación de las hojas verdaderas a intervalos de 7 a 10 días.
Cítricos o citrus	Cancrosis de los citrus (*Xanthomonas campestris pv. citri)*	250 cm3/100 litros de agua.		1° pulverización: en pre floración (agosto/septiembre); 2°: en post floración (octubre); 3°: en noviembre/diciembre; 4°: enero/febrero; 5°: marzo/abril. Es conveniente combinar con un antibiótico (300 cm3 de kasugamicina al 2%). Este calendario contempla la aplicación de los productos cada 50 - 60 días, cubriendo las brotaciones de primavera/verano.
Duraznero	Torque (Taphrina deformans) Viruela de los frutales de carozo (Stigmina carpophila)	150 - 175 cm3/100 litros de agua.		Efectuar la primera aplicación en otoño a la caída de las hojas, la segunda en primavera con brotes de 10 cm. La tercera antes de la floración y la cuarta al cuaje de los frutos.
Papa	Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)* Tizón temprano de la papa (*Alternaria solani)*	150 - 200 cm3/100 litros de agua.		Aplicar desde el momento en que las plantas tienen 15 cm de altura cada 15 días y después de cada lluvia. Si existen servicios de alarma zonal, pulverizar según lo indiquen. Combinar con 250 cm3 de kasugamicina al 2% para lograr mayor efectividad de control.
Peral	Tizón de las flores *(Pseudomonas syringae)*	75 cm3/100 litros de agua	60	Efectuar tres aplicaciones: 1ra finalizada la cosecha, 2da en plena floración, 3ra en plena brotación.
Tomate	Tizón tardío *(Phytophthora infestans) Tizón temprano (Alternaria solani)*	200 cm3/100 litros de agua.	14	Iniciar las aplicaciones desde el almácigo con carácter preventivo cada 15 - 20 días y hasta la pre-cosecha. Combinar con 250 cm3 de kasugamicina al 2% para logra mayor efectividad de control.
	Viruela del tomate (*Septoria lycopersici)*	150 - 200 cm3/100 litros de agua.		Efectuar la primera pulverización desde el almácigo, luego en el trasplante y repitiendo cada 10 días.
Vid	Mildiu (*Plasmopara viticola)*	150 - 175 cm3/100 litros de agua.		Iniciar cuando los brotes tienen de 12 a 15 cm de largo. Luego una segunda aplicación poco antes de la floración y una tercera en el envero cuando la uva comienza a pintar.

Información General:

Es un funguicida bactericida a base de sulfato de cobre pentahidratado, que controla un amplio espectro de enfermedades que atacan raíz, tallo, hojas y frutos. Posee una elevada acción de contacto preventiva y curativa, actuando en varias etapas del desarrollo de la enfermedad. Se dispersa fácilmente en la superficie de la planta logrando una cobertura uniforme. Su novedoso sistema de formulación le permite ser absorbido por las plantas evitando la pérdida de producto por lavado.

Instrucciones para su uso

Preparación:
Llenar con agua el tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su capacidad. Añadir la cantidad recomendada al tanque de mezcla, completar el llenado con agua y agitar bien antes de la aplicación.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Puede ser aplicado con cualquier maquina pulverizadora manual o a motor. También puede ser aplicado mediante equipos pulverizadores electrostáticos

Restricciones de uso:
Tiempo de reingreso al área tratada: 24 horas después de aplicado el producto.
En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Compatibilidad:
No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina ni con fenvalerato, clorpirifós y diclorán.

Fitotoxicidad:
No es fitotóxico para los cultivos recomendados y en las dosis que se indican.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Información Toxicológica:

CLASE III: PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO.

Categoría III (Inhalatoria): CUIDADO
Categoría IV: Leve Irritante ocular
No irritante dermal.
No sensibilizante

Aplicar terapia sintomática. No se conoce antídoto específico.
Grupo químico: inorgánico.

RIESGOS AMBIENTALES
Aves: Ligeramente tóxico.
Peces: Ligeramente tóxico. No contaminar lagos, arroyos ni depósitos de agua
Abejas: Virtualmente no tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA MASTERCOP	ADAMA ARGENTINA SA	34626	SC	21,4%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.