AMINOPYRALID + METSULFURON METIL

Marcas comerciales: TRONADOR XTRA.

Nomenclatura Química:
aminopyralid: sal potásica del acido 4-amino-3,6-dichloropiridin-2-carboxilico
metsulfuron metil: (metil 2-[[[[(4-metoxi-6-metil-1,3,5 triazin-2-il)]amino] carbonil] amino] sulfonil] benzoato)
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: ácido piridincarboxílico + sulfonilurea.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (post-emergente selectivo).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Abrepuños (*Centaure solstitialis)* Capiquí (*Stellaria media)* Cien nudos (*Polygonum aviculare)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Girasol guacho (*Helianthus annuus)* Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Mostacilla (*Rapistrum rugosum)* Nabón (*Raphanus sativus)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Violeta silvestre (*Viola arvensis)* Yuyo moro (*Lithospermum arvense)*	PC 44,38% + 30%: Zona Centro y Norte de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos con baja presión de malezas poligonáceas: 1 bolsita hidrosoluble (134 g) cada 12 a 13 ha. PC 44,38% + 30%: Zona Oeste de Buenos Aires, Este de La Pampa y Sur de Córdoba con baja presión de malezas poligonáceas: 1 bolsita hidrosoluble (134 g) cada 14 a 15 ha (1). PC 44,38% + 30%: Zona Sudeste y Sudoeste de Buenos Aires con alta presión de malezas poligonáceas: 1 bolsita hidrosoluble (134 g) cada 10 ha.	(*)	Desde que el cultivo de trigo tiene tres hojas hasta fines de macollaje. Aplicar cuando las malezas sean pequeñas y estén en activo crecimiento. En el caso de sanguinaria y enredadera anual aplicar cuando posean de una a tres hojas. (1) En suelos con mayor contenido de arena y en zonas de menores precipitaciones, utilizar la dosis menor.

Información General:

Es un herbicida selectivo para el control de malezas latifoliadas en el cultivo de trigo en aplicaciones de post-emergencia temprana. Formado por 2 (dos) herbicidas que se presentan en bolsitas hidrosolubles contenidas en un pouch de aluminio.
Puede ser aplicado en trigo a partir de la tercer hoja hasta fines de macollaje. Los síntomas de la actividad herbicida se pueden comenzar a ver horas o días después de la aplicación, dependiendo de la especie a controlar.

Instrucciones de uso:
1) Llenar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad con agua limpia.
2) Poner el agitador en marcha e incorporar las bolsitas hidrosolubles requeridas.
3) Agregar adyuvante Sandowet** a una concentración de 0,15-0,20 % v/v (0,15 a 0,20 litros cada 100 litros de caldo).
4) Completar la carga de agua, manteniendo la agitación a fin de lograr una suspensión homogénea.

** Marca registrada de Syngenta Agro S.A.

Preparar sólo la cantidad que se utilizará en el día. No dejar producto preparado de un día para el otro. Si el preparado queda en reposo durante varias horas, es necesario hacer funcionar el agitador o el retorno durante algunos minutos, antes de comenzar o reiniciar la pulverización.

Equipos, volumen y técnicas de aplicación:
Debe aplicarse sobre el cultivo con el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar.
Aplicar con pulverizadora terrestre de barra. El equipo debe contar con sistema de agitación.
Volumen mínimo: 80 - 120 litros/ha. Presión: 35 - 40 lb/pulg2. Pastillas: abanico plano (8002, 8003, 11002 y 11003).
Aplicar siempre con adyuvante no-iónico al 0,15%.

Número de gotas: aplicar 30 a 40 gotas/cm2.
Evitar que la deriva de la neblina de la pulverización entre en contacto con cultivos susceptibles. No aplicar con vientos superiores a 8 - 10 km/hora.

Restricciones de uso:

Se recomienda no realizar rotación a soja de segunda, en lotes de trigo tratados con el producto, si los suelos poseen un contenido de materia orgánica inferior al 1,8%.

Compatibilidad: no debe aplicarse mezclado con otros productos fitosanitarios como fertilizantes, insecticidas o fungicidas que no estén recomendados en esta etiqueta. Ante cualquier duda, se recomienda efectuar una prueba de compatibilidad en pequeña escala.

(*) Tiempo de carencia: En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Fitotoxicidad:
Bajo ciertas condiciones como lluvias excesivas, prolongado tiempo frío o grandes fluctuaciones de temperatura entre el día y la noche, previos o luego de la aplicación, metsulfuron metil puede producir pérdida del color verde intenso o detención del crecimiento en el cultivo.

Medidas precautorias generales:

Transporte: en el envase original sin abrir. No transportar junto con ropas, alimentos o semillas.

Después de aplicar o manipular el producto: lavarse bien con abundante agua y jabón. La ropa usada durante estas operaciones debe ser lavada separadamente de otras prendas.

Tratamiento de remanentes y envases vacíos: aplicar los remanentes del caldo de pulverización en banquinas o áreas sin cultivo para su descomposición natural.

Almacenamiento: en el envase original bien cerrado, en depósitos cubiertos, secos y ventilados, al resguardo de la luz solar, cerrados con candado y fuera del alcance de los niños.
el contacto con los ojos, la piel y la ropa. No aspirar las gotas de la aspersión.

Derrames:
En cualquier caso crear una barrera de contención para el derrame; evitar que el material tome contacto con desagües, cloacas, cuerpos o cursos de agua.

Producto sin preparar: barrer lentamente y recoger con pala, evitando generar polvo. No usar agua. Enviar para su incineración a instalaciones autorizadas, o disponer en sitios autorizados.
Caldo de pulverización: cubrir el producto con un material adsorbente (arena o tierra), y luego recogerlo con pala. Si el derrame se produce en cercanías de plantas o árboles, después de la limpieza inicial, remover 5 cm de tierra superficial.
En todos los casos, el material recogido se colocará en tambores y se enviará para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.
Método de destrucción de envases: las bolsas de plástico y aluminio que contienen las bolsitas hidrosolubles, deben ser remitidas para su incineración en condiciones y sitios autorizados, junto con los embalajes y sobre-envases de cartón.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (HRAC) + 2 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado; botas de goma; camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas; delantal; barbijo y antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Del producto formulado 44,38%+30%:

Toxicidad oral aguda:	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda:	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: > 5,1 mg/l
Irritación dermal:	Moderado irritante dermal
Irritación ocular:	Moderado irritante ocular
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Primeros auxilios:
En caso de intoxicación, llevar a la persona afectada a un lugar ventilado, llamar a un médico o trasladar a la persona a un servicio de emergencia, llevando el envase o la etiqueta del producto. Quién realice los primeros auxilios debe evitar tomar contacto directo con el producto.
Advertencias toxicológicas especiales: no posee.

Riesgos ambientales:

Prácticamente no tóxico para peces y organismos acuáticos. No pulverizar cerca de cursos de agua, canales y acequias para consumo o riego, para evitar su contaminación. Prácticamente no tóxico para aves y fauna silvestre. Virtualmente no tóxico para abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
TRONADOR XTRA	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	36481	WG	44,38% + 30%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.