PYRIPROXIFEN

Marcas comerciales: EPINGLE – EPINGLE ECO – ESTEEM – PORCEL ALB.

Nomenclatura Química:
pyriproxifen: (4-fenoxyfenil (RS)-2-(2-pyridyloxi) propil éter
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: juvenoides.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Limón	Cochinilla roja australiana (*Aonidiella aurantii)*	30 - 50 cm3/hl	25	Aplicar el producto una vez por temporada, a la caída de los pétalos o al momento del cuaje del fruto.
Manzano Peral	Carpocapsa (*Cydia pomonella)*	30 cm3/hl	7 28	Realizar la aplicación en el pico de la oviposición de cada generación de C. pomonella (de acuerdo a las lecturas de trampas de adultos) en mezcla con Assail (acetamiprid 5 g/hl) a intervalos de 14 días, con un máximo de 3 aplicaciones por temporada.
Tomate	Mosca blanca (*Bemisia tabaci)* Mosca blanca de los invernáculos (*Trialeurodes vaporariorum)*	50 - 75 cm3/hl (*)	7	Aplicar el producto al observarse la eclosión de huevos (*) y/o la aparición de las primeras ninfas. Repetir a intervalos de 7 a 14 días para el control de eclosiones posteriores: Como el producto no posee acción directa sobre formas adultas o aladas, se recomienda la mezcla con un insecticida adulticida. (*) A la dosis mayor, el producto manifiesta acción ovicida, principalmente en huevos de 1 a 3 días de edad.

(*) A las dosis mayores, el producto manifiesta actividad ovicida, principalmente en huevos 1 a 3 días de edad.

Información General:

Modo de acción: pyriproxifen es un regulador bioracional del crecimiento de los insectos, desarrollado a partir de la hormona juvenil natural (JH), razón por la cual a este tipo de insecticidas se los denomina como juvenoides. El producto genera un desequilibrio del balance hormonal que impide a los insectos pasar al próximo estadio de su ciclo biológico. De esta manera, el insecto permanece en el estadio que estaba hasta agotar sus reservas. Es por esto que cuanto más temprano se interfiera el desarrollo del ciclo biológico del insecto, más efectivos serán los tratamientos.
El modo de acción de pyriproxifen es completamente diferente a los insecticidas neurotóxicos (fosforados, carbamatos y piretroides), perturbando el ciclo de crecimiento del insecto, principalmente en las etapas de morfogénesis, embriogénesis y reproducción de cochinillas, moscas blancas, áfidos, trips y algunas especies de lepidópteros, siendo su efecto prácticamente nulo sobre los insectos benéficos (enemigos naturales), como parásitos, predatores y arañuelas, razón por la cual constituye una gran herramienta en el Manejo Integrado de Plagas (MIP). Pyriproxifen tampoco afecta a las abejas y otros insectos polinizadores. Pyriproxifen es de acción lenta, lo que le asegura un largo período de protección, reduciendo gradualmente la población de la plaga. No posee movilidad dentro de la planta, pero tiene buena acción translaminar.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Limón aplicar con equipos de alto volumen y alta presión, con manguera y turbina hasta punto de goteo, procurando un volumen de entre 30 y 40 litros por planta.
Tomate: aplicar con equipos terrestres, como mochilas o a motor, procurando una cobertura uniforme del cultivo, prestando especial atención al envés de las hojas. Se debe lograr una cobertura de 50-70 gotas/cm2, con tamaño de gotas de 200 a 400 micrones y un coeficiente de variación no mayor del 20%.
Manzano y peral:
Aplicar con equipos de alto volumen y alta presión, con manguera y turbina hasta punto de goteo, procurando un volumen de entre 30 y 40 litros por planta. El principal modo de acción de pyriproxifen en manzano es el efecto ovicida sobre *Cydia pomonella*. Es por eso que se recomienda la aplicación del producto previo al pico de oviposición de la plaga para proteger los frutos.

Recomendación de uso:
No realizar más de 3 aplicaciones por campaña (y no más de 2 aplicaciones consecutivas), para prevenir y/o evitar la aparición de individuos resistentes. Evitar aplicar frente a condiciones ambientales desfavorables: temperatura mayor de 30ºC; humedad relativa menor de 40 %; viento mayor a 15 km/h. Agregar coadyuvantes según recomendaciones locales.

Restricciones de uso:
Tiempo de reingreso al área tratada: 24 horas
Período de carencia en limón: 25 días, tomate y manzano 7 días, y peral: 28 días. En el caso que el cultivo o sus subproductos se destine a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Compatibilidad: es compatible con la mayoría de los productos comúnmente usados en los cultivos de limón, manzano, pera y tomate. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad química y biológica de cualquier mezcla que se intente hacer, consultar con un Ingeniero Agrónomo.

Fitotoxicidad: No se observaron casos de fitotoxicidad a las dosis recomendadas. No se producen efectos sobre los cultivos subsiguientes.

Almacenamiento:
No almacenar junto con productos para alimentación humana y animal. Mantener el producto

lejos de fuentes de calor, en lugar seco, fresco y bien ventilado. Guardar bajo llave en su envase original bien cerrado y etiquetado.

Tratamiento de remanentes y caldos de aplicación:
Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. El producto remanente en el tanque de la pulverizadora puede diluirse agregando agua limpia en una cantidad igual a cinco veces el volumen de caldo existente y aplicar sobre barbechos, caminos y áreas no cultivadas ni pastoreadas, lejos de la circulación frecuente de personas o animales. Los restos de producto puro no utilizado, pueden almacenarse en su envase original cerrado

Tratamiento y método de destrucción de envases vacíos: Los envases vacíos y demás desechos no pueden volverse a utilizar, ni enterrar, ni quemar a cielo abierto. Para bidones y botellas respetar las siguientes instrucciones: Realizar el Triple Lavado o lavado a presión según la Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Para el caso de envases que no pueden ser lavados como por ejemplo bolsas y envases de papel o cartón, inutilizarlos de la misma manera, perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases y bolsas inutilizadas deben enviarse a Centros de Acopio Transitorio más cercanos habilitados para su disposición final según la Ley Nacional Nº 27.279, Decreto Reglamentario Nº 134/18 y normativas provinciales específicas

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. El operario debe usar mameluco con delantal, guantes y botas. Colocar máscara para evitar su inhalación. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.
Los derrames se deben contener y adsorber empleando tierra o arena. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 7C (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: usar protector facial, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:

Producto formulado:
DL 50 oral aguda: > 8100 mg/kg (rata macho); 5700 mg/kg (rata hembra)
DL 50 dermal aguda: > 2000 mg/kg (rata)
LC50 inhalación: > 5120 mg/l (rata)

-Irritación dermal: Moderado irritante
-Irritación ocular: Moderado irritante
Efectos visibles de córnea involucrada o revisión de la irritación en 8 a 21 días.
-Sensibilización dermal: No sensibilizante

Aplicar tratamiento sintomático. No se conoce antídoto específico.
La administración de una suspensión de carbón activado y un purgante salino pueden favorecer la eliminación del producto y limitar su absorción desde el tracto digestivo. El suministro de cualquier tratamiento debe ser realizado por un médico. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

Riesgos ambientales:
Prácticamente no tóxico en aves.
Moderadamente tóxico en peces, por lo que se recomienda no aplicar en fuentes de agua natural o artificial. Dejar una distancia entre la aplicación y el curso de agua de 3 metros.
Virtualmente no tóxico para abejas.

Riesgos ambientales: prácticamente no tóxico en aves; moderadamente tóxico en peces, por lo que se recomienda no aplicar en fuentes de agua natural o artificial. Dejar una distancia entre la aplicación y el curso de agua de 3 metros. Virtualmente no tóxico para abejas / Ligeramente toxico para abejas (para el producto Porcel ALB)

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
EPINGLE	SUMITOMO CHEMICAL ARGENTINA SA	34721	EC	10%	III
EPINGLE ECO	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	41276	EC	10%	III
ESTEEM	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	36075	EC	10%	III
PORCEL ALB	ATANOR SCA	40816	EC	10%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.

Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.