Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

METOMINOSTROBIN



Nomenclatura Química:
(E)-2-(methoxyimino)-N- methyl-2-(2-.phenoxyphenyl) acetamide.
Clasificación Química: estrobilurina.
Acción: preventiva, curativa, erradicante y antiesporulante.

Uso: fungicida (foliar).

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Mancha marrón de la soja (*Septoria glycines)* Mancha púrpura de la semilla, Tizón de la hoja (*Cercospora kikuchii)*	187,5 - 250 cm3/ha (*)	14	Aplicar desde R3 hasta R6 cuando se observen presencia de síntomas en la planta.
	Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)*			Aplicar el producto desde el estadio de plena floración (R2) a madurez fisiológica (R6), en forma preventiva (sin detectar síntomas 0% de incidencia) hasta no más de un 5% de incidencia de la enfermedad en el tercio basal de la canopia del cultivo. En casos en que la enfermedad supere el 5% de incidencia, pero no exceda el 10% y/o se pretenda una mayor persistencia de control utilizar la combinación de dosis mayores.
Trigo	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)*	375 - 437,5 cm3/ha + 600 - 700 cm3/ha de tebuconazole EW.	25	Aplicar desde el estadìo de hoja bandera enrollada (Z 3.7) a hoja bandera desplegada (Z 3.9). Cuando se registren síntomas (pústulas y/o manchas) en hoja bandera menos 1 (HB-1).
	Mancha de la hoja del trigo (*Septoria tritici)* Roya anaranjada del trigo (*Puccinia recondita f. sp. tritici)*	312.5 - 375 cm3/ha + 500 - 600 cm3/ha de tebuconazole EW.		Aplicar desde el estadìo de hoja bandera enrollada (Z 3.7) a hoja bandera desplegada (Z 3.9). Cuando se registren síntomas (pústulas y/o manchas) en hoja bandera menos 2 (HB-2).

(*) En mezcla con tebuconazole 25 EW 300 - 400 cm3/ha.

Información General:

Modo de acción: metominostrobin es un fungicida de acción preventiva, curativa, erradicante y antiesporulante, perteneciente al grupo de los metoxiacrilatos o comúnmente denominados como estrobilurinas. Actúa inhibiendo el proceso de respiración celular de los hongos, lo que determina que sea particularmente efectivo en impedir la germinación de las esporas y el crecimiento inicial del micelio en la superficie de los vegetales.

Modo de aplicación: puede aplicarse con equipos terrestres o aéreos, siguiendo los siguientes parámetros en cuanto a calidad de aplicación: cobertura; 30 a 40 gotas/cm2, tamaño de gota; 200 a 400 micrones, uniformidad; 20% de coeficiente de variación.

Restricciones de uso: tiempo de reingreso al área tratada: no corresponde. Período de carencia en trigo: 25 días.

Recomendación: no presenta condiciones especiales de uso más que las indicadas: Evitar aplicar frente a condiciones ambientales desfavorables: temperatura mayor a 30°C, humedad relativa menor a 40%, viento mayor a 15 KPH. Agregar coadyuvantes según recomendaciones locales.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. El operario debe usar mameluco con delantal, guantes y botas. Colocar mascara para evitar su inhalación. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.

Los derrames se deben contener y absorber empleando tierra o arena. El material absorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 11 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

Información Toxicológica:

Principio activo:
DL50 oral aguda: > 776 mg/kg (rata macho); 708 mg/kg (rata hembra).
DL50 dermal aguda: > 2.000 mg/kg.
CL50 inhalatoria aguda: > 18.80 mg/l.

Producto formulado:
DL 50 oral aguda: > 500 mg/kg (rata macho); 570 mg/kg (rata hembra).
DL 50 dermal aguda: > 4.000 mg/kg.

Riesgos ambientales: prácticamente no tóxico en aves; moderadamente tóxico en peces, por lo que se recomienda no aplicar en fuentes de agua natural o artificial. Dejar una distancia entre la aplicación y el curso de agua de 3 metros. Virtualmente no tóxico para abejas.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.