IMIDACLOPRID + PENCYCURON

Marcas comerciales: PRESTIGE 29 FS.

Nomenclatura Química:
imidacloprid: 1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-=nitroimidazolidin-2-ilideneamina.
pencycuron: N-(4-chlorophenyl) -methyl]-N-cyclopentyl-N'-phenylurea.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: neonicotinoide + fenilurea.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: curasemillas, fungicida e insecticida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	Momento de Aplicación
Papa	Gorgojo del tomate (*Phyrdenus nicotianae)* Gusano blanco (*Maecolaspis bridarolli)* Gusano blanco (*Diloboderus abderus)* Gusanos alambre (*Agriotes spp.)* Pulgón verde de la papa (*Macrosiphum euphorbiae)* Pulgón verde del duraznero (*Myzus persicae)* Sarna negra (*Rhizoctonia solani)*	2,5 l/ha	Aplicación al suelo, conjuntamente con la operación de siembra de tal manera de ubicar el producto en la línea de caída de la papa "semilla".

Información General:

Es un producto compuesto por los ingredientes activos imidacloprid y pencycuron. Combina la aptitud fungicida preventiva y de contacto del pencycuron, con la aptitud insecticida sistémica y por contacto del imidacloprid. De esta manera, el producto, actúa como un eficiente insecticida y fungicida, asperjando la suspensión en el fondo del surco durante la plantación de papa.
Pencycuron es un fungicida perteneciente al grupo químico de las fenilureas especifico para el tratamiento de enfermedades causadas por hongos del complejo Rhizoctonia solani en papa. Pencycuron es un fungicida no sistémico, dotado de un largo período protector. Aún no está aclarado el mecanismo de acción de manera plena.
Imidacloprid actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, particularmente sobre la transmisión de los impulsos nerviosos. De esta manera se produce una excitación constante del sistema nervioso que finaliza con la muerte del insecto.

Instrucciones de uso: se aplica de manera preventiva durante la siembra, junto a la plantación asperjando en la línea de caída de la papa "semilla" en el fondo del surco. La aplicación debe ser realizada con el producto diluido. Esto permite una aplicación precisa de la dosis recomendada, lo cual se logra con instalaciones diseñadas para tal fin. Es suficiente un volumen de 50 a 70 l/ha de caldo.

Técnica y equipos de aplicación: el equipo a utilizar debe estar diseñado para tal fin, montado sobre la plantadora y con picos aspersores sobre cada línea de aplicación.

Es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos de reacción neutra.
NO aplicar en mezcla con otros productos sin realizar previamente una prueba en pequeña escala, de compatibilidad física y biológica de los componentes, y de fitotoxicidad para el cultivo.
NO hacer mezclas de tanque para más de un día de trabajo.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra ó arena para contener y adsorber el derrame. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (IRAC) + 20 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación..

Información Toxicológica:

Imidacloprid:
DL 50 oral: > 450 mg/kg de peso.
DL 50 dermal: > 5000 mg/kg de peso.
DL 50 inhalatoria: > 5323 mg/m3.

Pencycuron:
DL 50 oral:100 mg/kg de peso.
DL 50 dermal: > 5000 mg/kg de peso (exposición 24 hs).

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: No irritante

Riesgos ambientales:
Peces: muy tóxico. Debido a su forma de aplicación, no presenta riesgos. Se recomienda no aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existe agua libre en superficie. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el agua de limpieza de los equipos de aplicación.
Aves: moderadamente tóxico. No aplicar en áreas donde se hallen aves alimentándose activamente o en reproducción. No realizar las aplicaciones en zonas cercanas a dormideros de aves, montes, bosques, parques protegidos y reservas de fauna. No aplicar en áreas donde se conoce la existencia de aves protegidas.
Abejas: altamente tóxico. Ante la presencia de colmenas en el área circundante al lote a tratar, debe darse aviso al apicultor responsable con la antelación suficiente para que éste pueda retirar las mismas y trasladarlas a una distancia equivalente al máximo vuelo de las abejas. No utilizar cuando las abejas se encuentran en época de alimentación activa. Se recomienda, antes de aplicar el producto, eliminar las malezas que estén florecidas al momento de la aplicación y/o cortar la cubierta vegetal presente alrededor del cultivo si han alcanzado la fase de floración.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
PRESTIGE 29 FS	BAYER	34778	FS	14% + 15%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.