IMIDACLOPRID + THIODICARB

Marcas comerciales: CROPSTAR 60 FS.

Nomenclatura Química:
imidacloprid: 1-(6-cloro-3-piridil -metil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamida.
thiodicarb: dimetil N N 1t iobis[(metilimino) oxicarbonil] bis etanimidotioato.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: neonicotinoide + carbamato.
Acción: sistémica.

Uso: terapico para tratamiento de semillas.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Algodón	Pulgón (*Aphis gossypii)* Trips (*Frankliniella spp.)*	1400 cm3/100 kg de semilla.		La aplicación debe ser realizada con antelación a la siembra.
Maíz	Bicho torito o Bicho candado (*Diloboderus abderus)* Gusano blanco o Escarabajo rubio (*Cyclocephala signaticolis)* Gusano blanco o Vaquita tornasolada (*Colaspis spp.)* Gusanos alambre (*Agriotes spp.)* Salta Perico (*Conoderus spp.)*	0,8 - 1 cm3/1000 semilla.		
	Chicharrita del maíz *(Dalbulus maidis)*	1500 - 1750 ml/100 kg de semillas o 300 - 350 ml/ 60.000 semillas		
	Chinche de los cuernos (*Dichelops furcatus)* Gusano cogollero u Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*	1600 ml/100 kg de semilla		

Información General:

Este es un insecticida terápico para tratamiento de semillas formulado a base de imidacloprid y thiodicarb. Imidacloprid es un ingrediente activo insecticida, desarrollado para ser utilizado, entre otros usos, como terápico de semillas que actúa por contacto, ingestión y vía sistémica. Thiodicarb pertenece al grupo químico de los carbamatos.

Modo de acción: es un insecticida de acción sistémica que actúa mediante la inhibición de la colinesterasa, cuando los insectos ingieren o entran en contacto con el tejido.

Métodos de aplicación: la aplicación puede ser realizada con el producto diluido o sin diluir. Se debe lograr una aplicación exacta de la dosis recomendada por semilla lo cual se logra únicamente en instalaciones y maquinarias diseñadas para tal fin. Pueden ser equipos automatizados de aplicación.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra o arena para contener y adsorber el derrame. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (IRAC) + 1 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: No irritante

Riesgos ambientales: ligeramente tóxico para aves y peces. El patrón de uso planteado no presenta riesgos de contaminación para aguas piscícolas u otras fuentes de agua. Altamente tóxico para abejas. No presenta riesgo para las abejas dado el modo de aplicación.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CROPSTAR 60 FS	BAYER	34784	FS	15%+45%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.