PROTHIOCONAZOLE + TEBUCONAZOLE

Marcas comerciales: PUCARÁ.

Nomenclatura Química:
prothioconazole: 3H-1,2,4-Triazol-3-thiona, 2-(2-(1-clorociclopropil)-3-(2-clorofenil)-2-hidroxipropil)-1,2-dihidro.
tebuconazole: alfa-[2-(4 clorofenil)etil]-alfa-(1-1dimetiletil)-1 H-1,2,4 triazol-1 etanol.
Clasificación Química: triazol + triazol.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: fungicida y terápico para el tratamiento de semillas.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Agropiro Avena común	Alternaria (*Alternaria spp.)* Fusariosis (*Fusarium graminearum)* Podredumbre de la semilla y Dumping off (*Aspergillus spp.)* Podredumbre de los racimos (*Penicillum spp.)* Podredumbre de los racimos (*Rhizopus spp.)*	25 cm3/100 kg de semilla.		Tratamiento de semillas pre-siembra.
Cebada	Carbón cubierto (*Ustilago hordei)* Carbón desnudo de la cebada (*Ustilago nuda hordei)* Fusariosis (*Fusarium graminearum)* Mancha en red (*Drechslera teres)*	15 - 20 cm3/100 kg de semilla.		
Falaris Festuca Pasto ovillo Raigrás	Alternaria (*Alternaria spp.)* Fusariosis (*Fusarium graminearum)* Podredumbre de la semilla y Dumping off (*Aspergillus spp.)* Podredumbre de los racimos (*Penicillum spp.)* Podredumbre de los racimos (*Rhizopus spp.)*	40 cm3/100 kg de semilla.		
Trigo	Carbón cubierto del trigo (*Tilletia caries)* Carbón volador (*Ustilago nuda)* Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Tizón de la plántula (*Fusarium graminearum)*	15 - 20 cm3/100 kg de semilla.		

Información General:

Es un fungicida terápico para tratamiento de semillas que actúa en forma preventiva, curativa y erradicativa. Tiene acción sistémica y de contacto, controlando las enfermedades que son diseminadas vía semilla. Permite un buen establecimiento del cultivo y controla aquellas enfermedades que desde la semilla son llevadas a las estructuras reproductivas (carbones).
Prothioconazole tiene actividad sistémica pasando al interior de la semilla, llegando a controlar enfermedades en dichos sectores.
Tebuconazole tiene actividad sistémica pasando al interior de la semilla, llegando a controlar enfermedades en dichos sectores.

Técnicas y equipos de aplicación:
Es un producto formulado para ser usado con equipos específicos para tratamiento de semilla. Es con ellos donde se logran los mejores resultados de aplicación. Cuando no se posea este tipo de tecnología puede usarse tambor curasemilla u hormigonera, cuidando en estos casos de obtener una buena distribución del producto entre semillas y en la semilla. No es recomendado el mezclado en la sembradora o el paleo.
El volumen de aplicación deberá ser de 1,0 a 1,5 litros de caldo por cada 100 kg de semilla de trigo y cebada. Para semillas forrajeras, el volumen de aplicación deberá ser de 20 a 50 litros de caldo por cada 100 kg de semilla.

Es importante que:
- La semilla se encuentre clasificada.
- La semilla se encuentre limpia de tierra.
- La semilla no supere el 40% de incidencia de la enfermedad que se desea controlar.

Advertencias:
NO aplicar cuando la semilla esté con daño mecánico.

Compatibilidad:
NO aplicar en mezcla con otros productos sin realizar previamente una prueba en pequeña escala, de compatibilidad física y biológica de los componentes, y de fitotoxicidad para el cultivo.
NO hacer mezclas de tanque para más de un día de trabajo.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra o arena para contener y adsorber el derrame. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC) + 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protección respiratoria durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 5.000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 4.000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 2,233 mg/l
Irritación dermal (conejo):	No irritante
Irritación ocular (conejo):	Moderadamente irritante
Sensibilización dermal:	Sensibilizante

Riesgos ambientales: virtualmente no tóxico para abejas. Prácticamente no tóxico para aves. Extremadamente tóxico para peces. Por ser un producto indicado para el tratamiento de semillas no se espera que el mismo afecte a la población ictícola. Evitar derrames en cursos de agua y no contaminar fuentes de agua con el enjuague de los equipos de aplicación.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
PUCARÁ	BAYER	34789	FS	25% + 15%	III