TEBUCONAZOLE + TIRAM

Nomenclatura Química:
tebuconazole: alfa-[2-(4 clorofenil)etil]-alfa-(1-1dimetiletil)-1 H-1,2,4 triazol-1 etanol.
tiram: bislfuro de tetrametil tiocarbamilo.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazol + ditiocarbamato.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: fungicida curasemillas.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Carbón cubierto del trigo (*Tilletia caries)* Carbón volador (*Ustilago nuda f. sp. tritici)* Tizón de la plántula (*Fusarium graminearum)*	125 a 150 cm3/100 kg de semilla.		Con antelación a la siembra.

Información General:

Es un fungicida curasemillas que actúa en forma preventiva, curativa y erradicante. Tiene acción sistémica y de contacto, controlando las enfermedades que son diseminadas vía semilla. Permite un buen establecimiento del cultivo y controla aquellas enfermedades que desde la semilla son llevadas a las estructuras reproductivas (carbones).
Tebuconazole tiene actividad sistémica penetrando al interior de la semilla, para controlar las enfermedades indicadas. Tiram tiene actividad de contacto provocando un control sobre los patógenos externos. Puede ser utilizado en forma preventiva y curativa.

Técnicas y equipos de aplicación: es un producto formulado para ser usado con equipos específicos para tratamiento de semillas. Es con ellos donde se logran los mejores resultados de aplicación. Cuando no se posea este tipo de tecnología puede usarse tambor curasemillas u hormigonera, cuidando en estos casos de obtener una buena distribución del producto entre semillas y en la semilla. No es recomendado el mezclado en la sembradora o el pateo. El volumen de aplicación deberá ser de 1,5 a 2 litros de caldo por cada 100 kg de semilla de trigo.
Es importante que:
- La semilla se encuentre clasificada.
- La semilla se encuentre limpia de tierra.
- La semilla no supere el 40% de incidencia de la enfermedad que se desea controlar.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material aDsorbente (ej.: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados para su posterior destrucción según legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC) + M3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial / respiratorio durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Del principio activo tebuconazole:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 5000 mg/kg

Del principio activo tiram:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: 1800 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo): DL50: 1000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: 4,42 mg/l

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves: Moderadamente tóxico
Toxicidad para peces: Extremadamente tóxico

NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el agua de limpieza de los equipos de aplicación. Este producto es un terápico para tratamiento de semillas, por lo cual de acuerdo a su patrón de uso no presenta riesgos ambientales.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.