TEBUCONAZOLE + TRIFLOXISTROBIN

Marcas comerciales: CONSIST - NATIVO.

Nomenclatura Química:
tebuconazole: alfa-[2-(4 clorofenil)etil]-alfa-(1-1dimetiletil)-1 H-1,2,4 triazol-1 etanol
trifloxistrobin: metoximino-{2-[1(3-trifluorometil-fenil-)-etilidenamino-oximetil]-fenil}-metil éster del ácido acético
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazol + estrobilurina.
Acción: sistémica y mesostémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Acelga	Viruela de la acelga y remolacha (Cercospora beticola)	PF WG: 40 g/hl PF SC: 100 cm3/hl	7	Se recomienda aplicar preventivamente cuando se den las condiciones predisponentes o al observar los primeros síntomas. Repetir el tratamiento a los 14 días.
Ajo	Roya del ajo (Puccinia allii)	PF SC 100 cm3/hl PF WG: 40 g/hl	20	Aplicar frente a la presencia de condiciones predisponentes o ante la aparición de los primeros síntomas. Repetir la aplicación cada 10 - 14 días. No repetir la aplicación más de 3 veces.
	Mancha de la hoja (Stemphylium versicarum)			Aplicar preventivamente cuando las condiciones ambientales son predisponentes para la aparición de la enfermedad, o al observar los primeros síntomas.
Alcaucil	Oídio (Erysiphe cichoracearum)	PF WG: 50 g/hl PF SC 125 cm3/hl	7	Se recomienda aplicar preventivamente cuando se den las condiciones predisponentes o al observar los primeros síntomas. Repetir el tratamiento a los 14 días.
Apio	Viruela del apio (Cercospora apii)	PF WG: 40 g/hl PF SC: 100 cm3/hl		Se recomienda aplicar preventivamente cuando se den las condiciones predisponentes o al observar los primeros síntomas. Repetir el tratamiento a los 14 días.
Arándano	Alternaria (Alternaria spp.)	PF WG: 40 g/hl PF SC 100 cm3/hl	3	Se recomienda aplicaciones en plena floración, 70% de cuaje de frutos y en pre-cosecha para un buen control de las enfermedades. CONSIST se puede aplicar desde inicio de floración hasta 3-7 días antes de cosecha de forma preventiva cuando se den las condiciones predisponentes para la aparición de la enfermedad, o al observar los primeros síntomas. Rotar con productos de diferente grupo químico. No aplicar más de 3 veces.
	Moho gris (Botrytis cinerea)	PF WG: 60 g/hl PF SC 150 cm3/hl		
Cebolla	Mancha de la hoja del ajo y la cebolla (Alternaria porri)	PF WG: 40 g/hl PF SC: 100 cm3/hl	21	Iniciar la aplicación ante la aparición de las primeros síntomas sobre las hojas. En caso de ser necesario repetir el tratamiento a los 14 días
	Roya del ajo (Puccinia allii)			
Girasol	Roya del Girasol (Puccinia helianthi)	PF SC: 600-800 cm3/ha	28	Cuando el cultivo esté en estado fenológico V6 o R1, y comiencen a observarse síntomas de dichas enfermedades.
	Hongos del suelo (Phoma macdonaldii)			
	Hongos del suelo (Alternaria helianthi)			
	Septoria (Septoria helianthi)			
Lechuga	Moho gris (Botrytis spp.)	PF WG: 60 g/hl PF SC: 150 cm3/hl	5	Iniciar los tratamientos a partir de los 30 días del cultivo cuando este tenga 6-7 hojas. Con aplicaciones tempranas puede haber un retraso en el crecimiento del cultivo. En caso de ser necesario repetir el tratamiento a los 14 días.
Maíz	Roya del maíz (Puccinia sorghi)	PF SC: 600-800 cm3/ha	60	Aplicar cuando aparecen las primeras pústulas estando la octava hoja totalmente expandida (V8) hasta panojamiento (R1). Utilizar dosis alta a mayor presión de enfermedad.
	Helmintosporiosis común (Exserohilum turcicum)			
Manzano	Oídio del manzano y del peral (Podosphaera leucotricha)	PF SC 50 cm3/ha PF WG: 20 g/hl	35 días	Iniciar los tratamientos a partir de botón rosado. Repetir cada 10 - 12 días. No reiterar las aplicaciones por más de 3 veces. Combinar el plan de cura con productos de diferente modo de acción.
Melón	Oídio (Erysiphe cichoracearum)	PF WG: 40 g/hl PF SC: 100 cm3/hl	7	Aplicar cuando las condiciones ambientales sean predisponentes para la aparición de la enfermedad o. O al observar los primeros síntomas. En caso de ser necesario repetir tratamiento a los 14 días. Rotar con otros productos de diferente modo de acción. Emplear un caudal mínimo de 600 l/ha
	Oídio (Oidium ambrosiae)			
Papa	Tizón temprano de la papa (Alternaria solani)	PF SC: 400-600 cm3/ha	30	Aplicar el producto ante la aparición de los primeros síntomas. Repetir la aplicación luego de los 15 días de la primera aplicación.
Pimiento	Oidiopsis (Leveillula taurica)	PF SC 100 cm3/hl PF WG: 40 g/hl	3	Aplicar preventivamente cuando las condiciones ambientales son predisponentes para la aparición de la enfermedad, o al observar los primeros síntomas. Repetir a los 14 días en ataques severos.
Soja	Antracnosis de la soja	PF SC: 500 cm3/ha	20	

	(Colletotrichum glycines)			Aplicar ante la aparición de los primeros síntomas. No reiterar las aplicaciones más de 3 veces durante un ciclo de producción.
	Mancha marrón de la soja (Septoria glycines)			
	Mancha púrpura de la semilla (Cercospora kikuchii)			
	Tizón del tallo y de la vaina (Phomopsis sojae)			
	Mancha ojo de rana (Cercospora sojina)			
	Roya asiática de la soja (Phakopsora pachyrhizi)			
Tomate	Moho gris de la hoja del tomate (Cladosporium fulvum)	PF SC 100 cm3/hl	3	Aplicar preventivamente cuando las condiciones ambientales son predisponentes para la aparición de la enfermedad, o al observar los primeros síntomas. Repetir tratamiento a los 14 días.
		PF WG: 40 g/hl		
	Alternaria (Alternaria spp.)	PF SC 100 cm3/hl		
		PF WG: 40 g/hl		
	Oidiopsis (Leveillula taurica)	PF SC 100 cm3/hl		
		PF WG: 40 g/hl		
Vid	Oídio (Oidium tuckeri)	PF WG: 20 g/hl	12	Iniciar los tratamientos con brotes de 10 - 20 cm, repitiendo cada 15 - 20 días, dependiendo de la necesidad. Utilizar no menos de 200 g/ha. No reiterar las aplicaciones más de 3 veces. Alternar con productos de diferente modo de acción.
Trigo	Mancha amarilla (Drechslera tritici-repentis)	PF SC: 600-800 cm3/ha	35	Al observar las primeras pústulas o manchas.
	Roya anaranjada del trigo (Puccinia recondita f. sp. tritici)			
	Septoriosis de la hoja (Septoria tritici)			
Cebada	Mancha en red (Drechslera teres)	PF SC: 600 - 800 cm3/ha		Aplicar Nativo® al observar las primeras pústulas o manchas. Utilizar dosis alta a mayor presión de enfermedad.
	Roya de la hoja de la cebada (Puccinia hordei)			
Zapallito anco	Oídio de las cucurbitáceas (Sphaerotheca fuliginea)	PF WG: 40 g/hl PF SC: 100 cm3/hl	2	Aplicar cuando las condiciones ambientales sean predisponentes para la aparición de la enfermedad o. O al observar los primeros síntomas. En caso de ser necesario repetir tratamiento a los 14 días. Rotar con otros productos de diferente modo de acción. Emplear un caudal mínimo de 600 l/ha
	Oídio del zapallo (Oidium erysiphoides)			
	Oídio de las cucurbitáceas (Erysiphe cichoracearum)			
Zapallito de tronco	Oídio de las cucurbitáceas (Sphaerotheca fuliginea)			
	Oídio del zapallo (Oidium erysiphoides)			
	Oídio de las cucurbitáceas (Erysiphe cichoracearum)			
Nectarina	Podredumbre morena de los frutales (Monilinia fructicola)	PF SC 62,5 cm3/hl	15	Para podredumbre morena: Ante condiciones predisponentes aplicar entre el 20% y 40% de floración y entre el 80 y el 100 de la misma. En la etapa final del crecimiento de los frutos realizar 2 aplicaciones 30, 15 a 7 días antes de cosecha, de acuerdo a las condiciones ambientales. Rotar con productos de diferente grupo químico. Para oídio: aplicar desde caída de pétalos, repitiendo cada 15 días según necesidad. Rotar con productos de diferente grupo químico. Aplicaciones durante la pre-cosecha confieren protección durante la post-cosecha.
		PF WG: 25 g/hl		
	Podredumbre morena de los frutales (Monilia laxa)	PF SC 62,5 cm3/hl		
		PF WG: 25 g/hl		
	Oídio (Sphaerotheca pannosa var. persicae)	PF SC 62,5 cm3/hl		
		PF WG: 25 g/hl		
Durazno	Podredumbre morena de los frutales (Monilinia fructicola)	PF SC 62,5 cm3/hl		Ante condiciones predisponentes aplicar entre el 20% y 40% de floración y entre el 80 y el 100 de la misma. En la etapa final del crecimiento de los frutos realizar 2 aplicaciones 30, 15 a 7 días antes de cosecha, de acuerdo a las condiciones ambientales. Rotar con productos de diferente grupo químico. Aplicaciones durante la pre-cosecha confieren protección durante la post-cosecha.
		PF WG: 25 g/hl		
	Podredumbre morena de los frutales (Monilia laxa)	PF SC 62,5 cm3/hl		
		PF WG: 25 g/hl		

Información General:

El producto Twin Pack es un fungicida foliar que está compuesto por dos productos contenidos en un bidón pero separados, los cuales se deben mezclar en el tanque de la pulverizadora en el momento que se quiere aplicar. La Parte A contiene tebuconazole al 25% EW y la Parte B contiene trifloxistrobin al 50% SC. El producto ofrece las cualidades del trifloxistrobin que tiene actividad mesostémica caracterizada por una alta afinidad con las cerosidades de la superficie de las hojas, una distribución por movimiento de vapor superficial y reubicación en la superficie vegetal, y una penetración del tejido con movimiento translaminar. Trifloxistrobin es particularmente activo sobre la germinación de esporas y el crecimiento del micelio en la superficie de la planta. Inhibe también el desarrollo de patógenos, como la formación de haustorios en la epidermis del tejido vegetal. También ofrece las cualidades de

tebuconazole que es sistémico siendo absorbido y redistribuido por la savia dentro de las plantas de trigo. Lo cual le otorga una gran residualidad.
Tiene propiedades preventivas, curativas y erradicantes.

NO aplicar cuando el cultivo esté bajo situaciones de estrés tales como sequía prolongada, baja fertilidad, ataques de insectos, bajas temperaturas o heladas, porque el control puede ser deficiente y el cultivo resultará afectado.

NO aplicar si se espera una lluvia ya que el control puede ser no satisfactorio.

Posee acción sistémica y mesostémica.

Preparación:
Para la preparación del caldo de pulverización se deben seguir los siguientes pasos:
1- Cargar el tanque de la pulverizadora con agua limpia o filtrada, hasta la mitad de su capacidad.
2- Poner el agitador o el retorno en funcionamiento, y añadir el contenido de la Parte A y la Parte B en ese orden.
3- Completar la carga de agua del tanque, y mantener el removedor o el retorno en funcionamiento hasta la total homogeneidad del reparado.
Prepare lo que calcula que utilizará en el día. No es conveniente dejar producto preparado de un día para el otro. Si por cualquier causa la aplicación se interrumpiese durante algunas horas, antes de reiniciarla se deberá agitar algunos minutos para re-homogeneizar el preparado.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Puede ser aplicado con las pulverizadoras convencionales de bajo volumen, ya sean de arrastre como autopropulsadas, ser capaz de producir un exceso de flujo, de modo de mantener una remoción constante a través de retorno. Es importante lograr un correcto mojado de las plantas, logrando aplicar entre 50 y 70 gotas/cm2, utilizando un volumen de agua, orientativo, para aplicación terrestre de no menos de 150 l/ha y en área no menos de 15-20 l/ha. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a 15 km/h.
NO realizar las aplicaciones en las horas de más calor del día; tampoco si el follaje se encuentra mojado o existe posibilidad de una lluvia inminente.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente (ej.: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. La destrucción debe realizarse en un sitio autorizado, de acuerdo a la legislación local vigente.
En caso de derrame del producto sólido sin diluir, barrer y juntar el producto e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en sitios autorizados de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC) + 11 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Del producto formulado 50% + 25%:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: >= 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 4,65 mg/l
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	No irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Del producto formulado 10% + 20%:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: >= 2500 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 2430 mg/m3
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	Leve irritante (con total reversibilidad dentro de los 7 días siguientes)
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Riesgos ambientales:
Ligeramente tóxico para abejas. Ligeramente tóxico para Aves. Extremadamente tóxico para peces, por lo que se recomienda no aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existe agua libre en superficie dejando una franja de seguridad de 1 metro.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el agua de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el agua remanente sobre campo arado o camino de tierra.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.

CONSIST	BAYER	34940	WG	50% + 25%	IV
NATIVO	BAYER	34476	SC	10% + 20%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.