Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

IODOSULFURON METIL SODIO + METSULFURON METIL + ALCOHOL ALCOXILADO

Marcas comerciales: HUSSAR OD.

Nomenclatura Química:
Iodosulfuron metil sodio: metil 4 iodo 2 [3 (4 metoxi-6-metil-1,3,5, triazin-2- il) ureidosulfurfonil] benzoato.
Metsulfuron metil: metil 2-[((((4-metoxi-6-metil-1,3,5,triazin-2-il) amino) carbonil) amino) sulfonil) benzoato.
Alcohol alcoxilado.
Clasificación Química: sulfonilurea + sulfonilurea + tensioactivo no iónico.
Acción: sistémica y foliar.

Uso: herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Avena guacha, Cizznia, Avena negra, Avena invasora (**) (*Avena fatua)* Capiquí (*Stellaria media)* Cien nudos (*Polygonum aviculare)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Girasol guacho (*Helianthus annuus)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabón (*Raphanus sativus)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Pensamiento silvestre (*Viola arvensis)* Perejilillo (*Bowlesia incana)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Ryegrass (*) (*Lolium multiflorum)* Verónica (*Veronica persica)*	Parte 1 (iodosulfuron) 75 ml/ha + Parte 2 (metsulfuron) 5 g/ha + Parte 3 (alcohol alcoxilado) 200 ml/ha	60	Bajo condiciones normales, una aplicación por año es suficiente. El producto puede ser aplicado a partir de la tercer hoja verdadera del trigo, tan rápido como comiencen a crecer las malezas. El período óptimo de control es cuando la mayoría de las malezas han emergido y están entre 2 y 4 hojas (para malezas monocotiledóneas) o seis hojas (para malezas dicotiledóneas). De ésta forma se reduce la competencia de las malezas con el cereal. Por su flexibilidad, el producto también puede ser aplicado en una etapa más tardía de crecimiento de las malezas.

(*) 80% de la población entre 2 y 4 hojas.
(**) 80% de la población entre 2 y 4 hojas, efecto supresor.

Información General:

Es un herbicida en "Twin Pack" formado por los productos formulados a base de iodosulfuron metil sodio, metsulfuron metil y coadyuvante a base de alcohol alcoxilado.
Iodosulfuron es un ingrediente activo herbicida post emergente selectivo de uso en cereales, perteneciente al grupo de las sulfonilureas. Actúa sobre un amplio espectro de gramíneas y algunas dicotiledóneas. Por su modo de acción interfiere a nivel de la enzima "acetohydroxyacid synthase" (AHAS). Aunque tenga propiedades sistémicas vía Floema/Xilema, su principal acción es foliar.
Metsulfuron metil es un herbicida post emergente, perteneciente al grupo de las sulfonilureas, para el control de malezas de hoja ancha en trigo. Una vez aplicado es absorbido rápidamente a través del follaje y raíces de las plantas, inhibiendo el crecimiento de malezas susceptibles. Los síntomas visibles de la acción del herbicida es deteniendo el crecimiento a los pocos días luego de su aplicación, apareciendo partes cloróticas seguido de manchas necróticas, para el caso del iodosulfuron metil sodio. Los síntomas visibles en el caso del metsulfuron metil se presentan como decoloraciones y enrojecimientos de las malezas susceptibles. Las plantas susceptibles cesan el crecimiento casi inmediatamente después de la aplicación post emergencia, y estarán totalmente muertas a las 4 o 6 semanas luego de su aplicación.

Preparación: el Twin Pack está constituido por tres componentes empacados en forma separada que deben ser majenados según el siguiente esquema:

1- Llene la pulverizadora con agua hasta la mitad de su volumen y ponga los agitadores en marcha; o bien asegúrese que los mecanismos que funcionan con el caudal de retorno lo hagan satisfactoriamente.

2- Prepare una pre dilución del componente identificado como "Parte 2" (metsulfuron) en un balde limpio de 20 litros de agua confirmando visualmente la dilución de dicho componente.

3- Vuelque esa pre dilución de la "Parte 2" (metsulfuron) en el tanque del equipo de aplicación, siempre con los agitadores en marcha.

4- Una vez cumplimentado lo anterior, agregue las dosis indicada de la "Parte 1" (iodosulfuron) y la "Parte 3" (alcohol alcoxilado) dentro del tanque del equipo.

5- Complete la capacidad del tanque del equipo de aplicación.

Debe evitarse dejar el caldo preparado sin agitación, pues el producto puede precipitarse.

Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

Equipos, volúmenes y técincas de aplicación: el producto puede ser aplicado con las pulverizadoras convencionales de bajo volumen, ya sean de arrastre como autopropulsadas, siempre que estén provistas de un agitador adecuado.
En caso de no contar con este implemento, la bomba deberá ser capaz de producir un exceso de flujo, de modo de mantener una remoción constante a través del retorno.
Es importante lograr un correcto mojado de las malezas, con una distribución uniforme de 30 a 40 gotas/cm2 con un coeficiente de variación menor a un 30%. El volumen de aplicación deberá ser de 80 a 120 litros/ha, trabajando a un presión de 35 a 45 lib/pulg2, con pastillas de abanico plano y ángulo de pastillas entre 80º y 110º.
Debe evitarse toda posible deriva a cultivos cercanos sensibles al herbicida. Es conveniente verificar el correcto funcionamiento del equipo previo a la aplicación y calibrarlo con agua sobre el mismo terreno en que se va a utilizar. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a 15 km/h. No aplicar con humedad relativa menor a 65% y en casos de inversiones térmicas.

Entre la aplicación del producto y el re-ingreso al lote se debe esperar un lapso mínimo de 12 horas.

NO aplique el producto en pre-emergencia del trigo, ni a plantas bajo estres debido a la falta o exceso de precipitaciones, y/o en condiciones de temperatura muy bajas (heladas) en estas condiciones las malezas son menos susceptibles a la acción del herbicida. TAMPOCO aplique el producto si espera que llueva dentro de las 4 horas de realizada la aplicación.

Para evitar dañar a cultivos sensibles a este herbicida, luego de utilizar la pulverizadora es necesario eliminar los residuos del producto que pudieran haber quedado en la misma.

Compatibilidad: el producto es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos de reacción neutra. NO aplicar en mezcla con otros productos sin realizar previamente una pueba en pequeña escala, de compatibilidad física y biológica de los componentes, y de fitotoxicidad para el cultivo. NO hacer mezclas de tanque para más de un día de trabajo.

Fitotoxicidad: el producto no es fitotóxico a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej.: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. La destrucción debe realizarse en un sitio autorizado, de acuerdo a la legislación local vigente.
En caso de derrame del producto sólido sin diluir, barrer y juntar el producto e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en sitios autorizados de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): B (HRAC) ó 2 (WSSA) + B (HRAC) ó 2 (WSSA) + no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Riesgos ambientales: prácticamente no tóxico para aves.
Muy tóxico para peces y organismos acuáticos. Se recomienda dejar una franja de seguridad de 5 metros entre el área a tratar y el agua libre en superficie cercana. NO contaminar fuentes ni cursos de agua, aguas de riego ni receptáculos de agua. NO contaminar fuentes de agua arrojando remanentes de caldos de pulverizaciones. Asperjar el agua remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Virtualmente no tóxico para abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
HUSSAR OD	BAYER	35141	OD + WG + SL	10+60+99,7%	IV