# BENCILADENINA

**Marcas comerciales**: MAXCEL – MAXCEL BIORATIONAL.

**Nomenclatura Química:**
benciladenina: 6-benzyladinina[N-fenilmetil)-1H-purina- 6amina.
**Tipo de producto:** químico.
**Clasificación Química:** citoquinina sintética.
**Acción:** raleador e incremento del tamaño de frutos.

**Uso:** fitorregulador.

| Cultivo | Dosis | TC | Momento de Aplicación |
|---|---|---|---|
| Manzano<br>var. Royal Gala | 375 a 750 cm3/hl (75 a 150 ppm i.a.) | 70 | Aplicar cuando los frutos centrales (fruta reina) tenga un diámetro de 7 - 15 mm de promedio. Óptimo de 10 a 12 mm. |
| Peral<br>var. William´s | 500 a 750 cm3/hl (100 a 150 ppm i.a.) | 60 | Aplicar cuando los frutos centrales (fruta reina) tenga un diámetro de 7 - 15 mm de promedio. Óptimo de 10 a 12 mm. |

**Información General:**

Es un potente regulador de crecimiento vegetal que actúa en forma similar a las citoquininas (hormona vegetal). Promueve la división celular y la abscisión de frutos, mejorando la forma e incrementando el tamaño de la fruta. También aumenta el retorno floral.

Para aumentar la efectividad del producto se recomienda:
- Aplicar el producto al comienzo de una tendencia de temperaturas en alza, cuando se espere que las temperaturas máximas diarias para los 2 a 3 días a continuación del día de aplicación, sean de al menos 20 a 25°C.
- Se debe esperar mayor grado de raleo cuando las temperaturas máximas diarias sean de 30°C y más altas.
- Aplicar el producto en momentos del día donde la humedad relativa sea elevada, y la velocidad del viento baja, de modo de lograr un lento secado y una mayor absorción del producto.
- Evite aplicaciones cuando el follaje y los frutos estuvieran mojados como consecuencia de una lluvia ó por presencia de rocío, esperar al secado de los mismos para hacer la aplicación.
- No aplicar si se esperan lluvias dentro de las seis (6) horas de aplicado el producto.
- No aplique el producto a árboles o frutos que sufran de algún tipo de estrés.
- Evitar aplicar el producto con aguas de ph alcalino (superiores a 8,5); el ph óptimo para aplicar el producto debe estar entre 5 y 7.
- Use dosis más altas en plantaciones y en variedades que tengan antecedentes de difícil raleo, cuando las condiciones sean desfavorables y en condiciones de clima frío.
- Dirija el 80% de la aspersión hacia los 2/3 superiores de la copa de los árboles.
- Con este producto no es necesario el uso de surfactante.

Preparación:
Llenar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad con agua, agregar la cantidad necesaria de producto. Completar el faltante de agua, manteniendo en funcionamiento el sistema de agitación. Una agitación suave ayudará a dispersar el producto. Evite agitación excesivamente vigorosa que pueda provocar formación de espuma. Debido a su exclusiva formulación, no es necesario el agregado de coadyuvantes.

Equipos de aplicación: utilizar equipos para tratamiento de frutales, de alto volumen y presión, con manguera o turbina. Aplicar con suficiente volumen de agua para asegurar cobertura total ajustando los volúmenes según el tamaño de los árboles frutales, 1000 a 2000 L/ha es común para la mayoría de las plantaciones.

Restricciones de uso:
Evitar aplicar en presencia de condiciones climáticas desfavorables:
Temperatura > a 35ºC, muy baja humedad relativa y viento > a 15 Km/H
NO aplicar el producto en plantas bajo condiciones de estrés.

Ingreso al área tratada: 24 horas después de la aplicación.

Compatibilidad: Como parte de un programa de raleo/incremento de tamaño con MaxCel se puede usar un amplio rango de raleadores químicos, incluyendo formulaciones de NAA (ANA). Si se desea un raleo adicional, se pueden usar raleadores primarios en dosis y recomendaciones acorde a las respectivas etiquetas.
Si no se conoce la compatibilidad de MaxCel con otros productos, y la consiguiente respuesta en la planta, se debería ensayar a escala reducida. Consultar a un Ingeniero Agrónomo.

Fitotoxicidad: no se observa a las dosis recomendadas.

**Derrames:**
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. El operario debe usar mameluco con delantal, guantes y botas. Colocar máscara para evitar su inhalación. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.
Los derrames se deben contener y adsorber empleando tierra o arena. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a la legislación local vigente.

**Clasificación (modo o sitio de acción):** no aplica.

**Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:**
Carga del equipo: usar protector facial, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

**Información Toxicológica:**

Sustancia activa benciladenina:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: 1.690 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 200 mg/kg

Formulado al 1,9%:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 5.000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 5.000 mg/kg

Irritación dermal: Leve irritante
Irritación ocular: Leve irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Peligroso si se ingiere o inhala, debiendo evitarse el contacto del producto con la piel y la contaminación de alimentos. Durante su aplicación usar caretas antiparras, guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada. Lavarse con agua y jabón las manos y demás partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. Lavar los utensilios y la indumentaria no deberá usarse sin previo lavado.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Ligeramente tóxico
Toxicidad para peces: Ligeramente tóxico

NO aplicar en fuentes de agua natural ni artificial. Dejar una distancia entre la aplicación y el curso de agua 3 metros.

| Marca | Empresa | N° Inscrip. | Form. | Conc. | C.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| MAXCEL | SUMITOMO CHEMICAL ARGENTINA S.A. | 35176 | SL | 1,9% | IV |
| MAXCEL BIORATIONAL | SUMMIT AGRO ARGENTINA SA | 41283 | SL | 1,9% | IV |

**Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.**
**Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.**