TOPRAMEZONE

Marcas comerciales: CONVEY.

Nomenclatura Química:
topramezone: [3-(4,5-dihidro-isoxazol-3-il)-4-metane=sulfonil-2-metil-fenil]-(-5-hidroxi-1-metil-1H-pirazol-4-il)metanone.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: pirazol.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (Post Emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maíz	Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes minuta)* Grama (*Cynodon dactylon*) (*) Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabón (*Raphanus sativus)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Pie de gallina (*Eleusine indica)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Tupulo *(Sicyos Polyacanthus)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	100 cc/ha + 2000 cc/ha de Atrazina 50 o 1 kg/ha de Atrazina 90 %DG + Coadyuvante alcoxilatos de alcoholes grasos 250 gr/ha ó mezcla de ácidos y esteres de ácidos grasos al 0.5%	100	Post emergencia temprana de cultivo y malezas. Como único tratamiento post-emergencia para el control de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales. Aplicar cuando las malezas no excedan el estado de 3 hojas desarrolladas.
	80 cc/ha + 2000 cc/ha de Atrazina 50 o 1 kg/ha Atrazina 90 %DG + Coadyuvante alcoxilatos de alcoholes grasos 250 gr/ha ó mezcla de ácidos y esteres de ácidos grasos al 0.5%		Post emergencia de cultivo y malezas. Como tratamiento de repaso para el control de gramíneas anuales y malezas de hoja ancha. En pre emergencia, aplicar atrazina + acetoclor o atrazina + S-metolacloro a las dosis recomendadas según tipo de suelo.
Caña de azúcar	100 cc/ha + 2000 cc/ha de Atrazina 50 o 1 kg/ha de Atrazina 90 %DG + Aceite metilado de soja 1%		Post emergencia temprana de cultivo y malezas. Tratamiento post-emergente para el control de malezas de hoja ancha y gramíneas. Aplicar con tamaño adecuado de malezas.

(*) Nota: a la dosis de 100cc/ha de TOPRAMEZONE el control es parcial

Momento de Aplicación:
Maíz :Estado de crecimiento del maíz: Aplicar TOPRAMEZONE cuando el maíz tenga de 1 a 7 hojas verdaderas.
Caña de Azúcar: Estado de crecimiento de la caña de azúcar: Aplicar TOPRAMEZONE cuando la caña de azúcar no supere los 20 cm de altura.

Malezas de hoja ancha: Para un óptimo control de las malezas de hoja ancha, se recomienda la aplicación en el estado de 1 a 8 hojas verdaderas de las mismas.
Malezas gramíneas anuales: Para un óptimo control de las malezas gramíneas anuales, se recomienda la aplicación en el estado de 1 a 4 hojas verdaderas.
Malezas gramíneas perennes: Para un óptimo control de las malezas gramíneas perennes, se recomienda la aplicación cuando los estolones no superen los 10 cm de longitud,
TOPRAMEZONE efectivo sobre algunas especies de malezas tolerantes a herbicidas ALS o a triazinas (ej: Amaranthus quitensis).

De hoja ancha (Dicotiledóneas): Chamico (Datura ferox); Chinchilla (Tagetes minuta); Quinoa (Chenopodium álbum); Malva cimarrona (Anoda cristata); Nabo (Brassica campestris); Nabon (Raphanus sativus); Verdolaga (Portulaca oleracea); Tupulo (Sicyos Polyacanthus); Yuyo colorado (Amaranthus quitensis).
De hoja angosta (Monocotiledóneas): Capin arroz (Echinochloa crus-galli); Pasto cuaresma (Digitaria sanguinalis); Pie de gallina (Eleusine indica); Grama (*) (Cynodon dactylon)

Información General:

Topramezone es un herbicida sistémico de aplicación post-emergente para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha en el cultivo de maíz. Topramezone es absorbido por hojas, raíces y tallos y traslocado a los puntos de crecimiento de las malezas sensibles, proveyendo control post-emergente de las malezas emergidas. Topramezone controla las malezas por inhibición de la biosíntesis de carotenoides. Condiciones de temperatura y humedad de suelo favorables para el activo crecimiento de las plantas, son importantes para una óptima actividad de Topramezone. Topramezone debe ser aplicado conjuntamente (mezcla en tanque) con el herbicida atrazina y el coadyuvante. Como una práctica general de manejo de resistencia de malezas a herbicidas, este producto y otros productos con el mismo modo de acción deberían ser aplicados en combinación con, o secuencialmente a otros productos registrados con modos de acción diferentes. Sugerimos contactar a su representante BASF para información adicional. Topramezone debe ser aplicado en post-emergencia del cultivo y las malezas. Topramezone es efectivo en el control post-emergente de malezas anuales tanto en labranza convencional como en sistemas de siembra directa. Para un óptimo control de las malezas, Topramezone debe ser aplicado cuando las mismas se encuentren en activo crecimiento y no excedan el tamaño indicado. Cultivos bajo condiciones ambientales desfavorables (sequías, baja temperatura, etc.) en el momento de la aplicación de este herbecida, pueden mostrar algunos síntomas de fitotoxicidad. Eventualmente en estas condiciones, el cultivo tratado con Topramezone puede mostrar un blanqueamiento transitorio de la porción de la hoja que estuvo expuesta al herbicida. Este síntoma es transitorio y poco frecuente. El crecimiento no se ve afectado y las plantas recuperan su aspecto normal en 1 ó 2 semanas.

RESTRICCIONES DE USO
En el cultivo de caña: Uso posicionado
En el cultivo de maíz: Entre la última aplicación y la cosecha deberán transcurrir 100 días. En el caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

No utilizar otro producto inhibidor de HPPD en el mismo ciclo del cultivo.

Compatibilidad: Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios usados en el cultivo de maíz.

Reingreso al área tratada: Se recomienda esperar para reingresar al lote hasta el completo secado del producto sobre las hojas.
Fitotoxicidad: Bajo las condiciones de uso recomendadas, el producto no es fototóxico para los cultivos indicados.
Cultivos de rotación: Hasta disponer de mayor información sólo se recomienda la siembra de los siguientes cultivos en rotación luego de la aplicación de Topramezone: cereales de invierno, soja, maíz y colza. Para la siembra de cultivos no incluidos en este listado, consultar al Dpto. Técnico de BASF Argentina.

Restricciones a la rotación en el caso del cultivo de maíz: En suelos que cuenten con algunas de las siguientes características; más de 70% de arena y menos de 2% de materia orgánica, pH superiores a 7, o expuestos a condiciones de anaerobiosis se recomienda la utilización de la dosis menor de Topramezone. En este tipo de suelos además deben transcurrir al menos 9 meses entre la aplicación de Topramezone y la siembra posterior de soja con una acumulación de lluvias de al menos 300 mm en los primeros 3 meses después de la aplicación y un acumulado total de al menos 600 mm.

Derrames:
Recoger el líquido derramado con material absorbente (ej.: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos, etc) y recolectarlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. Luego manguerear el área de derrame por un período prolongado evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 27 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. Evitar el contacto con la piel. No comer, beber o fumar durante el tratamiento. Lávese cuidadosamente con jabón y agua después de la aplicación.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: 5,8 mg/l

Del formulado:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50: > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL 50: > 4000 mg/kg
Inhalación (rata):	CL 50: > 5,8 mg/l 4 h
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	No irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Primeros Auxilios:
En caso de ingestión: se evacuará el estómago, si el paciente está lúcido, con medidas mecánicas (estimulando fauces).
En caso de contacto con la piel: retirar las vestimentas y lavar la piel, incluyendo el cuero cabelludo, con abundante agua y jabón. Guardar la ropa en envases herméticos.
En caso de contacto con los ojos: lavar los ojos manteniendo los párpados abiertos durante 10 minutos con abundante agua. Retirar a los 5 minutos los lentes de contacto.
En caso de inhalación: una vez retirado el paciente del lugar, despejarles las vías aéreas y nebulizar con oxígeno humidificado.

Advertencias para el médico: Clase III. Ligeramente peligroso. Categoría inhalatoria: III. CUIDADO. Irritación dermal: leve irritante dermal. (Cuidado) Categoría IV. Irritación ocular: moderado irritante ocular. (Cuidado) Categoría III. Causa irritación moderada en los ojos. Tratar sintomáticamente. No hay antídoto específico.

Riesgos ambientales: Producto prácticamente no tóxico para aves y peces. Virtualmente no tóxico para abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CONVEY	BASF ARGENTINA	35058	SC	33,6%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.

Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.