MANDIPROPAMID

Marcas comerciales: REVUS.

Nomenclatura Química:
mandipropamid: 2-(4-cloro-fenil)-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-2-prop-2-iniloxi-acetamida
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: mandelamidas.
Acción: sistémica y residual.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Papa	Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)*	400 - 600 cm3/ha	7 (*)	Realizar las aplicaciones con criterio preventivo con intervalos de 10 días. Emplear las dosis más bajas en condiciones poco predisponentes y la más alta en caso de haber síntomas preexistentes y/o condiciones muy predisponentes para la enfermedad.

(*) En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse los límites máximos de residuos del país de destino y observar los períodos de carencia que correspondan a ese valor de tolerancia.

Información General:

Fungicida foliar para el control de Oomycetes en el cultivo de papa. Está especialmente indicado para el control de tizón tardío en la papa (Phytophthora infestans), protegiendo al cultivo de la enfermedad por un período de 7 a 10 días después de cada aplicación. El mandipropamid es rápidamente absorbido por las plantas, asegurando actividad translaminar. Mandipropamid tiene actividad contra la germinación de esporas e inhibe el crecimiento del micelio de los hongos, durante el período de incubación. Posee mayor acción residual que los fungicidas de contacto. El mandipropamid se introduce en el tejido vegetal a las pocas horas de ser aplicado, motivo por el cual lluvias posteriores no lavan el producto. Además, el mandipropamid no tiene efectos perjudiciales sobre insectos benéficos ni abejas.

Preparación: formulado como suspensión concentrada. Se mezcla fácilmente con agua.
Para una correcta preparación tener en cuenta las siguientes instrucciones:
-Agregar agua limpia al tanque de la pulverizadora hasta un cuarto de su capacidad y poner el sistema de agitación en funcionamiento.
-Agregar la cantidad requerida de producto, de acuerdo a la calibración realizada, directamente en el tanque y sin disolución previa. Verificar que el producto se disuelva correctamente.
-En caso de mezcla con otros productos, agregar siempre mandipropamid al tanque en primer lugar. Completar con agua el tanque, hasta el volumen final. Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento.
-Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
-Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
-Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: el producto debe aplicarse sobre el cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 50-70 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo a proteger. Puede aplicarse con equipos pulverizadores terrestres de arrastre o autopropulsados, utilizando volúmenes de aplicación entre 200 y 400 l/ha. Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar la aplicación. Corroborar que los picos y sus componentes estén en buen estado y que la barra del equipo pulverizador esté ajustada a la altura suficiente para garantizar una cobertura completa. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la deriva hacia cultivos linderos.
NO realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 15 km/hora.

Restricciones de uso:
Periodo de carencia: se deben dejar transcurrir al menos 7 días entre la última aplicación y la cosecha del cultivo de papa. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse los límites máximos de residuos del país de destino y observar los períodos de carencia que correspondan a ese valor de tolerancia.
NO reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.
Advertencia: la experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes a los fungicidas, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento. Se recomienda alternar las aplicaciones con fungicidas de diferentes modos de acción para reducir las posibilidades de aparición de patógenos resistentes.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE RESISTENCIAS
El producto formulado pertenece al grupo 40 de los fungicidas.
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un fungicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de fungicida en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros fungicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar una población resistente a un fungicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.

Compatibilidad: compatible con la mayoría de los productos comúnmente utilizados en el mercado. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para el cultivo.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en el cultivo de papa, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 40 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

DL50 oral aguda: > 5000 mg/kg (ratas)
DL50 dermal aguda: > 5000 mg/kg (ratas)
CL50 dermal aguda: > 4,89 mg/l aire (ratas)

Moderado irritante ocular. Leve irritante dermal. No sensibilizante dermal.
No existe antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales
Prácticamente no tóxico para peces y organismos acuáticos
Prácticamente no tóxico para aves
Virtualmente no tóxico para abejas.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
NO contaminar alimentos, forrajes, ni cursos de agua. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
REVUS	SYNGENTA AGRO	35415	SC	25%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.