PYRACLOSTROBIN + TIOFANATO METIL

Marcas comerciales: ACRONIS.

Nomenclatura Química:
pyraclostrobin: metil N-[2-[[1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-il]oximetil]fenil]-N-metoxicarbamato.
tiofanato metil: 1,2 bis-(3 metoxicarbonil-2-tioureido) benceno.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: estrobilurina + benzimidazol.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: fungicida terápico para tratamiento de semillas y fitorregulador..

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Alternaria (*Alternaria spp.)* Antracnosis (*Colletotrichum dematium)* Cancro de la soja (*Diaphorte phaseolorum)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)* Mancha púrpura de la semilla, Tizón de la hoja (*Cercospora kikuchii)* Patógeno del suelo (*Aspergillus flavus)* Patógeno del suelo (*Aspergillus niger)* Patógeno del suelo (*Penicillium spp.)* Patógeno del suelo (*Fusarium spp.)* Patógeno del suelo (*Rhizoctonia spp.)* Patógeno del suelo (*Rhizopus spp.)* Tizón del tallo y de la vaina (*Phomopsis phaseolli)*	100 cm3/100 kg de semilla		Tratamiento de semilla antes de la siembra.
Algodón	Mal de los almácigos en algodón (*Rhizoctonia solani)* Mal de los almácigos en algodón (*Fusarium spp,)*	100 cm3/100 kg de semilla En condiciones de monocultivo utilizar la dosis a 150 cm3/100 kg de semilla.		Tratamiento de semilla hasta 15 días antes de la siembra.
Arroz	Mancha castaña asociada a mancha de grano (*Bipolaris oryzae)* Mancha de tallo y vaina (*Rhizoctonia oryzae)*	100 cm3 a 150 cm3/100 kg de semilla (*)		Aplicar a la semilla de arroz antes de la siembra (**)
Papa	Sarna negra (*Rhizoctonia solani)*	3-4 l/ha		Tratamiento al surco en la plantación.
Maíz (***)	Patógeno del suelo (*Fusarium spp*.) Patogenos de la semilla (*Aspergillus spp*.) Penicillium (*Penicillum spp*.)	100ml/100Kg de semilla		Tratamiento de semilla antes de la siembra (***)
Girasol (***)	Alternaria *(Alternaria spp.)* Patógenos de la semilla *(Rhizopus spp.)* Patógenos del suelo *(Fusarium spp.)*	150ml/100Kg de semilla		
Poroto (****)	Podredumbre carbonosa (*Macrophomina phaseolina*)	100ml/100Kg de semilla		Tratamiento de semilla antes de la siembra

(*) Usar dosis de 150 cm3/100kg de semilla cuando las condiciones de siembra son favorables para el desarrollo de patógenos de suelo y semillas; como ser siembras tempranas, suelos fríos, antecedente de Rhizoctonia.
(**) Se recomienda diluir en 2,4 litros de agua cada 100kg de semilla de manera de lograr una distribución uniforme.
(***) Se recomienda diluir con agua hasta alcanzar un caldo total de 0,9 lts. cada 100kg de semilla, de manera de lograr una distribución uniforme.
(****) Se recomienda diluir Acronis con agua hasta alcanzar un caldo total de 0,5 lts. cada 100kg de semilla, de manera de lograr una distribución uniforme

Girasol: “En el caso de aplicar otros productos en el caldo de tratamiento reemplazar el volumen de agua por el correspondiente de los productos agregados totalizando un volumen del caldo total de 1,5 a 2,0 lts. cada 100kg de semilla, de manera de lograr una distribución uniforme”.

Maíz: “En el caso de aplicar otros productos en el caldo de tratamiento reemplazar el volumen de agua por el correspondiente de los productos agregados totalizando un volumen del caldo total de 0,9 lts. cada 100kg de semilla, de manera de lograr una distribución uniforme”.

Uso: regulador de crecimiento.

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Caña de azúcar	2,5 litros/ha.	Aplicar sobre la caña semilla o yemas uninodales en una sola aplicación.

Información General:

Es un fungicida sistémico para el tratamiento de semillas en soja, algodón, arroz, girasol, maíz y poroto para la aplicación al surco de plantación en el cultivo de papa que protege la germinación y favorece el desarrollo inicial del cultivo, promoviendo el establecimiento de un mejor stand de plantas. Se lo recomienda también, en el cultivo de caña de azúcar como regulador de crecimiento tanto de la brotación de yemas uninodales en invernáculo, como también del desarrollo inicial del cultivo a campo, aplicado en este caso, a la caña al momento de la plantación. Contiene dos principios activos en su formulación, pyraclostrobin y metil tiofanato, con diferentes modos de acción. Pyraclostrobin es una estrobilurina de última generación que posee rapidez de acción, eficacia y amplio espectro de control sobre patógenos, pertenecientes a las clases Ascomicetes, Basidiomicetes, Deuteromicetes y Oomicetes. Actúa como inhibidor del transporte de electrones en las mitocondrias de las células de los hongos, inhibiendo la formación de ATP, esencial en los procesos metabólicos de los hongos. Posee acción prolongada y ejerce una acción fisiológica positiva en la planta. El metil tiofanato es un fungicida bencimidazol sistémico, actúa atacando la fusión mitótica de la célula fúngica y ejerce un control preventivo y curativo de enfermedades. Protege a la semilla inhibiendo el desarrollo de los conidios y penetración de los tubos germinativos. Presenta también acción curativa y erradicante. Protege las semillas de enfermedades producidas por patógenos del suelo como Fusarium, Rhizotocnia controlando también hongos de semilla como Phomopsis spp., Cercospora kikuchii, Cercospora sojina (Mancha ojo de rana en la semilla), Alternaria spp, Colletotrichum ssp, Penicillium spp, Aspergillus ssp, Rhizopus spp, y Bipolaris oryzae.
En el cultivo de caña de azúcar, el producto aplicado a la caña semilla en la plantación, como así también en el tratamiento de yemas uninodales en invernáculo para la obtención de plantines, ejerce efectos fisiológicos positivos que favorecen tanto la mayor y más rápida brotación de las yemas como el desarrollo inicial del cultivo, con las consiguientes mejoras en los parámetros productivos del cañaveral.

El producto protege a la semilla inhibiendo el desarrollo de las esporas y penetración de los tubos germinativos. Presenta también acción curativa y erradicante.

Preparación: Importante: agitar bien el envase antes de usar. Es una suspensión concentrada para ser aplicada sobre las semillas de algodón, arroz, soja, girasol y maíz. Y en caña de azúcar para ser aplicada sobre las yemas uninodales o sobre la caña semilla a ser plantada.
El producto debe aplicarse diluido por medio de un equipo apropiado para el tratamiento de semillas. La dilución se prepara agregando la dosis recomendada de producto y agua. Es compatible con la aplicación de inoculantes y productos usualmente utilizados en tratamiento de semillas. El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: el producto puede ser aplicado mediante máquinas específicas para tratamiento de semilla o tambores rotativos de forma tal que haya una distribución homogénea del producto sobre las semillas. Tambores rotativos: colocar una cantidad de semillas con peso conocido en el interior del equipo de tratamiento y adicionar la dosis indicada de producto agitando hasta obtener una óptima cobertura de las semillas. El tiempo de mezcla y agitación es variable en función de cada equipo y de la cantidad de semilla y debe ser suficiente para que todo el producto cubra uniformemente las semillas. Tener atención que en el final del tratamiento no sobre producto en el fondo de equipo usado. Máquinas específicas de flujo continuo: el tratamiento puede ser realizado con diversos modelos de equipamientos. Observar cuidados especiales de manutención, regulación y limpieza de la unidad dosificadora de producto para evitar errores en la dosificación. Tratamiento a la plantación de papa: pulverizar con el equipo provisto en la plantadora.
En caña de azúcar, pulverizar las yemas uninodales o la caña semilla en la plantación. En este último caso podrá ser en la plantadora mecánica (plantación mecanizada) o en la plantación tradicional (pulverizar la semilla en el surco). En ambos casos asegurarse un buen mojado de la caña semilla a ser tratada.

Compatibilidad: No es recomendado la mezcla de PYRACLOSTROIN + TIOFANATO METIL con productos de reacción fuertemente alcalinas.
Para los cultivos de girasol y maíz, Acronis es compatible con metalaxyl como con tiametoxam.

Derrames:
Hacer un dique con material inerte (arena, tierra, arcilla) y transferir el material líquido y sólido impregnado a envases para su destrucción. Evitar que el derrame se dirija a alcantarillas o depósitos abiertos de agua o cursos de agua.

Clasificación (modo o sitio de acción): 11 (FRAC) + 1 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Utilizar protección ocular adecuada, protección respiratoria, guantes de acrilonitrilo, pantalón largo, camisa de manga larga y botas de goma.

Información Toxicológica:

DL 50 oral (ratas): 500 mg/kg.

DL 50 dermal (ratas): > 5000 mg/kg.
CL 50 aguda: > 5,2 mg/l.

Aplicar tratamiento sintomático. En el caso de ingestión, enjuagar la boca inmediatamente y beber abundante agua. Obtener asistencia médica. NUNCA inducir al vómito o dar algo por boca a una persona inconsciente o con convulsiones. El producto presenta efecto sensibilizante en la piel. No es irritante dermal.

Riesgos ambientales: Producto prácticamente no tóxico para aves y virtualmente no toxico para abejas. Muy toxico para peces. La semilla aplicada con este curasemillas deberá sembrarse a una distancia mínima de 10 metros de distancia de lagos, ríos, corrientes de agua permanentes, lagunas naturales, estuarios, pantanos y criaderos comerciales de peces.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ACRONIS	BASF ARGENTINA	35551	SC	5% + 45%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.