IMIDACLOPRID + BETA-CIFLUTRINA

Marcas comerciales: CONNECT - SOLOMON O-TEQ.

Nomenclatura Química:
imidacloprid: 1-(6-cloro-3-piridil -metil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamida
beta-ciflutrina: ciano - (4-fluoro-3-fenoxifenil)-metil-3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-dimetil-ciclopropanocarboxilato
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: neonicotinoide + piretroide.
Acción: de contacto, sistémica e ingestión.

Uso: insecticida (Formulación Suspensión Concentrada (SC)).

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Alquiche chico (*Edessa meditabunda)* Chinche de la alfalfa (*Piezodorus guildinii)* Chinche de los cuernitos (*Euschistus heros)* Chinche espinosa (*Dichelops furcatus)* Chinche verde (*Nezara viridula)* Isoca medidora (*Rachiplusia nu)* Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)*	750 cm3/ha(*)	64	Aplicar cuando se alcance el umbral de daño económico. Ver nota al pie del cuadro.
	Trips (*Caliothrips phaseoli)*	500 cm3/ha (*)		Aplicar cuando el 75% de las hojas del estrato inferior tenga síntomas de daño.(**)

* Agregar 500 cm3/ha de aceite mineral para aplicaciones terrestres y 1000 cm3/ha para aplicaciones aéreas. En ambos casos, el aceite debe ser agregado al tanque posteriormente a la carga del producto formulado.
** Es necesario lograr un buen mojado de toda la planta, ya que esta especie se concentra mayormente en el estrato inferior del cultivo, y en el envés de los foliolos.

Información General:

Compatibilidad (Formulación Suspención concentrada (SC))
Es compatible con fungicidas utilizados para el control de las Enfermedades de Fin de Ciclo y Roya de la Soja, como Sphere® y Folicur®.

Fitotoxicidad
No presenta fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

Uso: insecticida (Formulación Dispersión Oleosa (OD)*).

Cultivo	Plaga	Dosis	Momento de Aplicación
Soja	Picudo chico de la soja (*Promecops carinicollis)* Picudo grande de la soja (*Sternechus subsignatus)*	PF OD: 200 cm3/ha	Aplicar ante la presencia de 1 picudo por metro lineal de surco.
	Picudo negro de la vaina (*Rhyssomatus subtilis)*	PF OD: 200-250 cm3/ha	Aplicar ante la presencia de 2 picudos por metro de surco. Utilizar la mayor dosis a partir de R4.
	Chinche de la alfalfa (*Piezodorus guildinii)* Chinche de los cuernitos (*Euschistus heros)* Chinche verde (*Nezara viridula)* Isoca medidora (*Rachiplusia nu)* Oruga bolillera (*Helicoverpa gelotopoeon)* Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)*	PF OD: 250 cm3/ha	Aplicar según Umbrales de Daño Económico(UDE)
	Trips del poroto (*Caliothrips phaseoli)*	PF OD: 250-300 cm3/ha	Aplicar cuando el 75% de las hojas del estrato inferior tenga síntomas de daño. Aplicar la dosis mayor si se supera este umbral. Es necesario lograr un buen mojado de toda la planta, ya que esta especie se concentra mayormente en el estrato inferior del cultivo, y en el envés de los foliolos.
Berenjena	Mosca blanca	60-90 cm3/hl	Aplicar al observar los primeros ataques de la plaga. En caso de ser necesario, repetir el tratamiento a los 14 días. Emplear una

	(*Bemisia tabaci)* Mosca blanca de los invernáculos (*Trialeurodes vaporariorum)*		dosis mínima de 250 cm3/ha. Alternar con otros productos de distinto modo de acción.
Pimiento Tomate			Aplicar en aspersión foliar. Utilizar la dosis mayor cuando exista presión media a alta de la plaga y la dosis menor para aplicaciones preventivas o al observar la presencia de los primeros ejemplares. Repetir el tratamiento a los 14 días en caso de ser necesario.
Brócoli Coliflor Repollo	Isoca de las coles (*Plutella xylostella)* Isoca medidora (*Rachiplusia nu)* Pulgón del repollo (*Brevicoryne brassicae)*	40-60 cm3/hl	Aplicar en forma foliar. Utilizar la menor dosis en forma preventiva o al observar los primeros daños o los primeros pulgones en hojas. Con alta presión de plaga, usar la mayor dosis. Emplear un volumen entre 200 a 500 l/ha de acuerdo al desarrollo del cultivo, tratando de logar una adecuada distribución y cobertura del caldo de aspersión.
Lechuga	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)* Pulgón verde del duraznero (*Myzus persicae)*		Aplicar desde el transplante, utilizando la menor dosis en forma preventiva o al observar los primeros daños o los primeros pulgones en hoja. Con alta presión de plaga, usar la mayor dosis. Se puede repetir el tratamiento a los 14 días, no más de 3 aplicaciones en el cultivo. Emplear un volumen entre 300 a 600 l/ha de acuerdo al desarrollo del cultivo.
Maíz dulce	Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)* Pulgón del maíz (*Rhopalosiphum maidis)*		Aplicar en forma foliar al observar los primeros ataques de la plaga. Emplear una dosis mínima de 300 cm3/ha.
	Chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*)	350 cm3/ha	Aplicar en forma foliar en etapas vegetativas del cultivo al observar los primeros individuos. No aplicar cuando el cultivo esté en etapas reproductivas.
Maíz			Aplicar en forma foliar en etapas vegetativas del cultivo al observar los primeros individuos. No aplicar cuando el cultivo esté en etapas reproductivas. Máximo 2 aplicaciones con un lapso de 7 días entre ambas.
	Chinche de los cuernos *(Dichelops furcatus)*		Aplicar de forma foliar en etapas vegetativas del cultivo al observar los primeros individuos. Realizar hasta 2 aplicaciones espaciadas hasta 7 días. No aplicar cuando el cultivo se encuentre en etapas reproductivas.
Brócoli Melón Sandía Zapallo	Mosca blanca (*Bemisia tabaci)*	40-60 cm3/hl	Aplicar al observar los primeros ataques de la plaga. En caso de ser necesario, repetir el tratamiento a los 14 días. Emplear una dosis mínima de 250 cm3/ha. Alternar con otros productos de distinto modo de acción.

* Las formulaciones OD requieren un agitado enérgico del producto antes de verter el contenido en el interior del tanque del equipo pulverizador.

Aplicar cuando se llegue al umbral que se detalla a continuación:

Plaga:	R3 - R4	R5
Chinche verde:	0,8 - 1 chinche/metro	2 chinches/metro
Chinche espinosa:	0,5 - 0,7 chinches/metro	1 chinche/metro
Chinche de la alfalfa:	0,5 - 0,7 chinches/metro	1 chinche/metro
Alquiche chico:	0,8 - 1 chinche/metro	2 chinches/metro
Chinche de los cuernitos:	0,5 - 0,7 chinches/metro	1 chinche/metro
Oruga de las leguminosas:	(*)	(**)
Isoca medidora:	(**)	(**)

(*) Oruga de las leguminosas: antes de floración: cuando se observen 15 - 20 orugas mayores de 0,5 cm por metro lineal de surco a 70cm y 35% de defoliación.
(**) Oruga de las leguminosas e Isoca medidora: de floración en adelante; cuando se observen 10 orugas/metro lineal de surco a 52 cm y más de 10% de defoliación.

Información General:

El producto combina la acción insecticida de imidacloprid y beta-ciflutrina, logrando un nuevo estándar en el control de heterópteros fitófagos en el cultivo de soja. Su formulación en base a dos activos de distinta familia lo hace un producto ideal para evitar posibles resistencias. Ambos activos actúan sobre el sistema nervioso central de los insectos, pero con un modo de acción diferente, lo cual lo hace un insecticida versátil y de altísima efectividad. Su acción es por contacto e ingestión, por lo cual es fundamental generar una pulverización uniforme en toda la superficie a tratar.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Llenar la pulverizadora con agua hasta la mitad de su volumen, agitar el envase enérgicamente antes de cargarlo a la pulverizadora, agregar la cantidad necesaria del producto directamente en el tanque y completar el llenado con agua. Es recomendable mantener los agitadores o el retorno en actividad durante la preparación del caldo y la aplicación. Debe evitarse dejar el caldo preparado sin agitación, pues el producto puede precipitarse.
Aplicaciones terrestres: en formulación Suspención Concentrada, el volumen de aplicación deberá ser de 150-200 litros de agua por hectárea, trabajando con una presión 60 lb/pulg2 para lograr un buen mojado de las plantas.
El objetivo es obtener 50 gotas/ cm2, en el estrato medio del cultivo. El tamaño de gotas recomendado es entre 200 y 250 micrómetros (DVM - Diámetro Volumétrico Medio). Para determinar este número de gotas es necesario el uso de tarjetas hidrosensibles. Esta cobertura, expresada en gotas/ cm2 puede lograrse con diferentes caudales. Se recomienda el uso de pastillas de cono hueco en buen estado.
Aplicaciones aéreas: Utilizar caudales de 10 a 15 l/ha. Se debe lograr 50 gotas/cm2, en el estrato medio del cultivo. Para determinar este número de gotas es necesario el uso de tarjetas hidrosensibles.

Restricciones de uso:
Evitar las horas de mayor insolación y menor humedad relativa, ya que se produce la evaporación del agua utilizada como vehículo en el caldo de aplicación. Se recomienda no aplicar con menos de 50% de HR (Humedad Relativa). La temperatura no debe sobrepasar los 30-35 °C. Verificar el correcto funcionamiento de los agitadores del equipo de aplicación. Es importante lograr un buen mezclado del vehículo (agua) con el producto, para que la dosis aplicada sea homogénea en toda la superficie.

Dejar pasar el siguiente período entre aplicación y cosecha.
Soja: 30 días
Maíz dulce, Sandía, Berenjena, Brócoli: 7 días
Zapallo: 5 días
Melón: 4 días
Lechuga, Tomate, Coliflor y Repollo: 3 días
Pimiento: 2 días
Maíz: 50 días

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej.: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. La destrucción debe realizarse en un sitio autorizado, de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (IRAC) + 3 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Suspensión concentrada (SC)
DL 50 oral aguda en rata: > 2500 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en rata: > 4000 mg/kg.

Dispersión oleosa (OD)
DL 50 oral aguda en rata: 500 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en rata: > 2000 mg/kg.

Irritación dermal:	Moderado irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante
Sensibilización dermal:	Sensibilizante

Riesgos ambientales:
Altamente tóxico para abejas. No asperjar sobre colmenas en actividad. Si no puede trasladárselas, tapar las piqueras durante la aplicación con arpillera húmeda. Asperjar durante la mañana temprano o al atardecer fuera del horario de pecoreo de las abejas. Si existe sistema de alarma informar a los apicultores en forma fehaciente. Ligeramente tóxico para organismos acuáticos Prácticamente no tóxico para aves.
NO contaminar fuentes de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CONNECT	AGRO BAYER SRL	34853	SC	10%+ 1,25%	III
SOLOMON O-TEQ	AGRO BAYER SRL	36972	OD	21% + 9%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.