FLUOXASTROBIN + TEBUCONAZOLE

Marcas comerciales: EVITO T MIX - PACK EVITO T - PACK EVITO T MANÍ.

Nomenclatura Química:
fluoxastrobin: (E)-{2-[6-(2-clorofenoxi)-5-fluoropirimidin-4-iloxi]fenil}(5,6-dihidro-1,4,2-dioxazin-3-il) metanona O-metiloxima
tebuconazole: alfa-[2-(4 clorofenil) etil]- alfa-(1-1dimetiletil)-1H-1,2,4 triazol-1etanol.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: estrobilurina + triazol.
Acción: sistémica.

Uso: fungicida (Pack).

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maíz	Helmintosporiosis, Tizon foliar (*Helminthosporium maydis)* Helmintosporiosis, Tizon tardío (*Helminthosporium turcicum)* Roya común del maíz (*Puccinia sorghi)*	* 90 cm3/ha (fluoxastrobin) + 270 cm3/ha (tebuconazole)	60	Acción preventiva: Aplicar ante condiciones predisponentes en estadios vegetativos del cultivo a partir de V6-V8 (6-8 hojas desplegadas) hasta panojamiento (R1/R2).
		** 110 cm3/ha (fluoxastrobin) + 330 cm3/ha (tebuconazole)		Acción curativa: Aplicar ante la aparición de los primeros síntomas.
Trigo	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Roya anaranjada (*Puccinia recondita)* Septoriosis de la hoja (*Septoria tritici)*	100 cm3/ha de fluoxastrobin + 300 cm3/ha de tebuconazole.	35	Acción preventiva: A la aparición de los primeros síntomas.
		130 cm3/ha de fluoxastrobin + 390 cm3/ha de tebuconazole.		Acción curativa: Cuando las enfermedades evolucionan rápidamente o cuando al momento de la aplicación se registra alta incidencia y severidad.
Soja	Mancha marrón de la soja (*Septoria glycines)* Mancha púrpura de la soja (*Cercospora kikuchii)* Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)*	* 80 cm3/ha (fluoxastrobin) + 240 cm3/ha (tebuconazole)	30	Acción preventiva: Aplicar de modo preventivo y/o ante condiciones predisponentes. Aplicar desde R1 (inicio de floración) a R5 (máximo desarrollo de semilla), o cuando se observen los primeros síntomas en la planta.
		** 97 cm3/ha (fluoxastrobin) + 290 cm3/ha (tebuconazole)		Acción curativa: Aplicar ante la aparición de los primeros síntomas. En caso de persistir las condiciones favorables para el avance de las enfermedades o al aparecer nuevas manchas y/o pústulas realizar una segunda aplicación.

Trigo: * 1 pack para 20 ha ** 1 pack para 15 ha
Soja: * 1 pack para 25 ha ** 1 pack para 20 ha
Maíz: * 1 pack para 22 ha ** 1 pack para 18 ha

Parte 1: fluoxastrobin y Parte 2: tebuconazole.

Uso: fungicida (PACK EVITO T MANI).

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Mani	Viruela tardía del maní (*Cercosporidium personatum*) Viruela temprana del maní (*Cercospora arachidicola*)	290 c m3/ha (tebuconazole 43% p/v) + 150 cm3/ha (fluoxastrobin 48% p/v) (*)	35	Acción curativa "Health effect": Aplicar a la aparición de los primeros síntomas o manchas foliares de las enfermedades (VN/R1). Repetir la aplicación si persisten y/o se manifiestan nuevos síntomas. Normalmente se realizarán 4 ó 5 aplicaciones de fungicida cada 14-21 días pero con diferentes grupos químicos. PACK EVITO® MANÍ se usará no más de 2 veces en el programa de tratamientos, siguiendo las buenas prácticas de FRAC.

(*) 1 Pack para 20 has de cultivo

Uso: fungicida (Premezcla).

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maíz	Helmintosporiosis, Tizon foliar (*Helminthosporium maydis)* Roya común del maíz (*Puccinia sorghi)*	350 cm3/ha	60	Acción preventiva: Aplicar ante condiciones predisponentes en estadios vegetativos del cultivo a partir de V6-V8 (6-8 hojas desplegadas) hasta panojamiento (R1/R2).
	Tizon tardío (*Helminthosporium turcicum)*	425 cm3/ha		Acción curativa: Aplicar ante la aparición de los primeros síntomas.
Trigo	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)*	385 cm3/ha	35	Acción preventiva: A la aparición de los primeros síntomas.

	Roya anaranjada (*Puccinia recondita)* Septoriosis (*Septoria tritici)*	500 cm3/ha		Acción curativa: Cuando las enfermedades evolucionan rápidamente o cuando al momento de la aplicación se registra alta incidencia y severidad.
Soja	Mancha marrón de la soja (*Septoria glycines)* Mancha púrpura de la soja (*Cercospora kikuchii)* Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)*	310 cm3/ha	30	Acción preventiva: Aplicar de modo preventivo y/o ante condiciones predisponentes. Aplicar desde R1 (inicio de floración) a R5 (máximo desarrollo de semilla), o cuando se observen los primeros síntomas en la planta.
		375 cm3/ha		Acción curativa: Aplicar ante la aparición de los primeros síntomas. En caso de persistir las condiciones favorables para el avance de las enfermedades o al aparecer nuevas manchas y/o pústulas realizar una segunda aplicación.

Información General:

Fungicida foliar de amplio espectro, compuesto por dos productos (fluoxastrobin al 48% y tebuconazole al 43%), los cuales se deben mezclar en el tanque de la pulverizadora en el momento que se quiera aplicar.
Ofrece las cualidades del fluoxastrobin, ingrediente activo que gracias a su avanzada tecnología ofrece favorables características funcionales y ventajoso comportamiento ambiental. El mismo actúa inhibiendo la respiración mitocondrial, obstruyendo la transferencia electrónica en la mitocondria del patógeno. Gracias a su acción sistémica en la hoja, fluoxastrobin le confiere al producto propiedades preventivas y curativas, ya que no solo actúa sobre la germinación de la espora, sino también sobre el crecimiento del micelio, ofreciendo una protección de larga duración.
Incorpora también tebuconazole, que es un fungicida sistémico siendo absorbido y redistribuido dentro de las plantas, lo cual le otorga una prolongada acción residual. Presenta propiedades preventivas, curativas y erradicantes.

Instrucciones para el uso
Preparación (Premezcla):
Para la preparación del caldo de pulverización se deben seguir los siguientes pasos:
1- Cargar el tanque de la pulverizadora con agua limpia o filtrada, hasta la mitad de su capacidad.
2- Poner el agitador o el retorno en funcionamiento, y añadir el contenido de cada envase.
3- Completar la carga de agua del tanque, y mantener el agitador o el retorno en funcionamiento hasta la total homogeneidad del preparado.

Preparación: (Pack)
Para la preparación del caldo de pulverización se deben seguir los siguientes pasos:
Verter la dosis requerida de cada componente en un recipiente que contenga agua suficiente, agitar enérgicamente hasta formar una buena suspensión. Incorporar esta pre-mezcla al tanque de la pulverizadora, que debe contener previamente un tercio de su capacidad total con agua.
Agregar lentamente a la pre-mezcla, con los agitadores en marcha, el resto del agua hasta completar el volumen necesario para cubrir el área prevista a tratar. En caso de bajo caudal (ej.: aplicación con avión) preparar la carga en un recipiente apropiado y cargar con bomba.

Prepare lo que calcula que utilizará en el día. No es conveniente dejar producto preparado de un día para el otro.
Si por cualquier causa la aplicación se interrumpiese durante algunas horas, antes de reiniciarla se deberá agitar algunos minutos para re-homogeneizar el preparado.
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Puede ser aplicado con pulverizadoras convencionales de bajo volumen, ya sean de arrastre como autopropulsadas, siempre que estén provistas de un agitador adecuado. En caso de no contar con este complemento, la bomba deberá ser capaz de producir un exceso de flujo, de modo de mantener una remoción constante del caldo a través del retorno. Es importante lograr un correcto mojado de las plantas, utilizando un volumen de agua para aplicación terrestre de no menos de 150 l/ha y presión mayor a 75 lb/pulg2 y en aplicación aérea no menos de 15-20 l/ha. El número de impactos deberá ser mayor a 50-70 gotas/cm2 con un diámetro inferior a 130 micrones.
Suspender las aplicaciones con vientos superiores a 15 km/h. No realizar las aplicaciones con temperaturas mayores a 30°C; tampoco si el follaje se encuentra mojado o existe posibilidad de una lluvia inminente.
Se recomienda la aplicación con un coadyuvante, el cual será agregado con posterioridad a la mezcla de los fungicidas en el caldo de aplicación.
En trigo, soja, maíz y maní se recomienda preferentemente el uso de coadyuvantes de base oleosa mineral parafínica al 0,5% - 1,0% (0,5 -1,0 l/100 litros de agua).

Restricciones de uso:
-NO aplicar el producto cuando el cultivo esté bajo situaciones de estrés tales como sequía prolongada, baja fertilidad, ataques de insectos, bajas temperaturas o heladas, porque el control puede ser deficiente y el cultivo resultará afectado.
-NO aplicar el producto, si se espera una lluvia inminente, ya que el control puede ser no satisfactorio.
-NO realizar las aplicaciones con temperaturas mayores a 30°C

Período de carencia: entre la última aplicación y la cosecha deberá transcurrir el siguiente período: Trigo: 35 días; Soja: 30 días; Maíz: 60 días. Maní (grano) 35 días.

Tiempo de reingreso al área tratada: no reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Estrategia anti-resistencia: de modo tal de evitar la aparición de cepas de hongos resistentes, se recomienda alternar la aplicación del producto con aquellos que posean diferente modo de acción bioquímico. No reiterar la aplicación en más de dos oportunidades durante el ciclo del cultivo.

Compatibilidad:
Es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos (fungicidas, insecticidas, coadyuvantes y bioestimulantes) de reacción neutra. No se recomienda aplicar junto a herbicidas. No aplicar en mezcla con otros productos sin realizar previamente una prueba en pequeña escala, de compatibilidad física y biológica de los componentes y de fitotoxicidad para el cultivo. No preparar mezclas de tanque para más de un día de trabajo.

Fitotoxicidad:
No es fitotóxico a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente (Ej. tierra, aserrín, turba, aglutinados de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. La destrucción debe realizarse en un sitio autorizado, de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 11 (FRAC) + 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

De los productos formulados en el Pack:

Parte 1: fluoxastrobin
Toxicidad oral aguda LD50 (rata): > 5.000 mg/kg.
Toxicidad dermal aguda LD50 (rata): > 5.000 mg/kg.
Toxicidad de inhalación aguda LC50 (rata): > 2.170 mg/m3.
Irritación dérmica en conejo: Leve irritante
Irritación ocular en conejo: No irritante

Parte 2: tebuconazole
Toxicidad oral aguda: LD 50 oral, rata: Mayor a 3000 mg/kg.
Toxicidad dermal aguda DL 50 cutánea, rata: > 4000 mg/kg.
Toxicidad de inhalación aguda LC50 (rata): > 2.32 mg/l.
Irritación dérmica en conejo: No irritante
Irritación ocular en conejo: No irritante

En caso de intoxicación llame al médico. Coloque al paciente en lugar ventilado.
En caso de contacto con los ojos: enjuagarlos con abundante agua limpia por espacio 15 minutos.
En caso de contacto con la piel: quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminado, lavar con abundante agua y jabón.
En caso de inhalación: retire a la persona al aire fresco y manténgalo en reposo.
En caso de ingestión NO provocar el vómito. NO administre nada por boca a un paciente inconsciente.

Advertencia para el médico:
Clase III Producto ligeramente peligroso. Moderado irritante ocular (Cuidado). Categoría III. Causa irritación moderada a los ojos. Leve irritante dermal (Cuidado) Categoría IV. Evitar contacto con piel y ropa. Sensibilizante dermal: el contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacción alérgica. Clase Inhalatoria III (Cuidado)
Grupo químico: estrobilurina + triazol

Del formulado al 12,5 % + 32,5 %:

Toxicidad oral aguda LD50 (rata): > 5.000 mg/kg.
Toxicidad dermal aguda LD50 (rata): > 5.000 mg/kg.
Toxicidad de inhalación aguda LC50 (rata): > 1.003 mg/l.

Irritación dérmica en conejo: No irritante dermal
Irritación ocular en conejo: Moderado irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante dermal
Advertencia para el médico:
CLASE IV: Producto que normalmente no ofrece peligro. Irritación ocular: Moderado irritante ocular (Cuidado). Categoría III: Causa Irritación moderada a los ojos. Irritación dermal: No irritante dermal. Sensibilización dermal: No Sensibilizante dermal. Categoría Inhalatoria II (Nocivo).
Grupo químico: estrobilurina + triazol

Riesgos ambientales (productos del Pack)
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico.
Toxicidad para peces: Muy tóxico (debido a su rápida degradación, el producto no se encuentra biodisponible en medio acuosos).

No contaminar fuentes de agua. Medidas de mitigación: se indica dejar una zona de exclusión entre el sector aplicado y las fuentes superficiales de agua de 10 metros.
Toxicidad para abejas: virtualmente no tóxico.

Riesgos ambientales (formulado al 12,5 % + 32,5 %):
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico.
Toxicidad para peces: Moderadamente tóxico. Medidas de mitigación: se indica dejar una zona de exclusión entre el sector aplicado y las fuentes superficiales de agua de 10 metros.
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
EVITO T MIX	UPL ARGENTINA S.A.	38827	SC	12,5 % + 32,5 %	IV
PACK EVITO T	UPL ARGENTINA S.A.	N° PACK 171	SC	48% + 43%	III
PACK EVITO T MANÍ	UPL ARGENTINA S.A.	N° PACK 299	SC	48% + 43%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.