IMIDACLOPRID + LAMBDACIALOTRINA

Marcas comerciales: MAGNETO - SYNERGY - TOUCHE ULTRA WG.

Nomenclatura Química:
imidacloprid: 1-(6-cloro-3-piridinil-metil)-N-nitro-imidazolidin-2-ilideneamina.
lambdacialotrina: (S)- -ciano-3-fenoxibencil (Z) - (1R,3R)-3-(2-cloro-3,3,3 trifluoropropenil) - 2,2 - dimetilciclopropanocarboxilato; y (R)-ciano-3- fenoxibencil (Z) - (1S,3S)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato.
Clasificación Química: neonicotinoide + piretroide.
Acción: de contacto, sistémica e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Algodón	Picudo del algodonero (*Anthonomus grandis)*	PC 35%+10%: 200 - 250 cm3/ha		Comenzar las aplicaciones cuando se detecte la plaga en las trampas. Realizar aplicaciones secuenciales cada 5-7 días, hasta disminuir el nivel de plaga.
Soja	Chinche de la alfalfa (*Piezodorus guildinii)* Chinche verde (*Nezara viridula)*	PC 20%+10%: 200 cm3/ha PC 25% + 10%: 160 g/ha	20	A partir de floración (R1) cuando se observe más de 2 chinches por metro lineal de hilera del cultivo. A partir del comienzo de llenado de semillas en nudo, con semilla de 3mm de longitud (R5) cuando se detecte al menos 1 chinche por metro lineal de hilera del cultivo.
	Tucuras (*Dichroplus spp.)*	PC 35% + 10%: 130 - 200 cm3/ha		Umbrales: Soja estadíos VC - V4 (cotiledonar - 4 nudos): 2 tucuras/metro. Soja estadíos V5 - R5 (5 nudos - inicio llenado de granos): 5 tucuras/metro. Asegurar una óptima calidad de aplicación, especialmente luego del cierre de surco.
	Trips (*Caliothrips phaseoli)*	PC 35%+10%: 150 - 200 cm3/ha		Aplicar al detectar un promedio de 5 ninfas por folíolo. Ante una alta presencia de la plaga utilizar la mayor dosis.
	Alquiche chico (*Edessa meditabunda)*	PC 35%+10%: 170-200 cm3/ha		Aplicar cuando la plaga supera el umbral de acción informado por el INTA. Durante formación de vainas (R3-R4), a partir de 0,8 chinches/m lineal. Durante la formación de granos (R5-R6), a partir de 1,5 chinches/m. Valores para siembras a 52 cm.
	Chinche de la alfalfa (*Piezodorus guildinii)*			Durante formación de vainas (R3-R4), a partir de 0,4 chinches/m lineal. Durante la formación de granos (R5-R6), a partir de 0,7 chinches/m. Valores para siembras a 52 cm.
	Chinche de los cuernos (*Dichelops furcatus)*			
	Chinche verde (*Nezara viridula)*			Aplicar cuando la plaga supera el umbral de acción informado por el INTA. Durante formación de vainas (R3-R4), a partir de 0,8 chinches/m lineal. Durante la formación de granos (R5-R6), a partir de 1,5 chinches/m. Valores para siembras a 52 cm.
	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)* Oruga medidora (*Rachiplusia nu)* Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*			Antes de floración cuando se observen 15 orugas mayores a 1,5 cm por metro lineal de surco y 35% de defoliación. A partir de floración (R1) cuando se detecten 8 orugas por metro lineal de surco y 10% de defoliación.
	Picudo grande de la soja (*Sternechus subsignatus)* Picudo negro (*Rhissomatus subtilis)*	PC 35%+10%: 200 cm3/ha		Aplicar cuando se observen los primeros adultos. Repetir la aplicación en caso de re-infección. Se recomienda realizar las aplicaciones en el momento de mayor exposición de la plaga utilizando un volumen de agua suficiente para lograr un buen mojado del cultivo.

Información General:

Es un insecticida que combina dos ingredientes activos de acción complementaria y sinérgica: un piretroide (lambdacialotrina) que actúa por contacto, ingestión y repelencia; y un cloronicotinilo (imidacloprid) de acción sistémica, otorgando acción rápida (poder de volteo) y efecto prolongado (residualidad) en el control de chinches, orugas, trips y tucuras en el cultivo de soja.

Preparación: llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad del agua que va a utilizar, agregar la dosis requerida de, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre el agitador en marcha. Realizar un mojado adecuado para lograr una buena cobertura del follaje.
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: puede ser aplicado con cualquier equipo pulverizador, con un mínimo de 80 a 100 litros de solución por hectárea y una presión de 30 - 50 lb/pulg2. Asegurar una buena cobertura aplicando entre 25 y 35 gotas /cm2 medidas en el suelo del entresurco.
Restricciones de uso: entre la última aplicación y la cosecha, debe dejarse transcurrir la siguiente cantidad de días: 20 días en soja.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Compatibilidad: se utiliza generalmente solo. Para la mezcla con otros plaguicidas deberá realizarse pruebas previas que demuestren la compatibilidad entre los productos y de la mezcla con el cultivo.

Fitotoxicidad: ha demostrado una alta selectividad para el cultivo de soja. En las condiciones de uso indicadas, el producto no resulta fitotóxico.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra o arena para contener y adsorber el derrame. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (IRAC) + 3 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Del producto formulado al 20%+10%
Toxicidad oral aguda (rata): DL 50: 20 - 200 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL 50 : > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL 50: 1,40 mg/l

Irritación dermal(conejo): No irritante.
Irritación ocular (conejo): Mínimamente irritante
Sensibilización cutánea (cobayo): No sensibilizante.

Del producto formulado al 35%+10%
Toxicidad oral aguda (rata): DL 50: 1030 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL 50 : > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL 50: 1,248 mg/l

Irritación dermal (conejo): Leve irritante.
Irritación ocular (conejo): Moderado irritante
Sensibilización cutánea (cobayo): No sensibilizante.

Riesgos ambientales:
Abejas: producto altamente tóxico. Se aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de aplicación por lo menos a cuatro kilómetros del límite tratado y por un tiempo mínimo de treinta días. En caso de no poder trasladar las colmenas, no realizar aplicaciones en sus cercanías, en cultivos en floración y en el horario del pecoreo de las abejas. Tapar la entrada de las piqueras con arpillera o espuma de goma húmeda durante la aplicación. Hacer aplicaciones nocturnas o por la mañana temprano.
Aves: producto moderadamente tóxico muy tóxico.
Organismos acuáticos: producto extremadamente tóxico para peces. Para evitar contaminar cursos de agua naturales, ríos, lagunas o lagos dejar una distancia mínima de 1 metro entre la zona tratada y el espejo de agua.
NO contaminar fuentes de agua con el agua del lavado de los equipos de aplicación. Asperjar el agua remanente sobre campo arado o camino de tierra.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
MAGNETO	INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.	37.060	WG	12% + 5%	II
SYNERGY	NUFARM S.A.	36833	SC	35% + 10%	II
TOUCHE ULTRA WG	NUTRIEN AG SOLUTIONS	37882	WG	25% + 10%	II