Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

# TEBUCONAZOLE + AZOXISTROBINA

**Nomenclatura Química:**
tebuconazole: alfa-[2-(4 clorofenil)etil]-alfa-(1-1 dimetiletil)-1 H-1,2,4 triazol-1 etanol (parte A).
azoxistrobina: metil (E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi] fenil}-3-metoxiacrilato (parte B).
**Clasificación Química:** triazol + estrobilurina.
**Acción:** de contacto y sistémica.

**Uso:** fungicida.

| Cultivo | Enfermedad | Dosis | Momento de Aplicación |
|---|---|---|---|
| Soja | Alternaria (*Alternaria spp.)* Antracnosis (*Colletotrichum truncatum)* Mancha marrón (*Septoria glycines)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)* Mancha púrpura de la semilla (*Cercospora kikuchii)* Mildiu (*Peronospora manshurica)* Tizón de la hoja (*Cercospora kikuchii)* Tizón del tallo y de la vaina (*Phomopsis sojae)* Tizón del tallo y de la vaina (*Diaporthe spp.)* Tizón del tallo y de la vaina (*Diaporthe phaseolorum var. sojae)* Tizón del tallo y de la vaina (*Phomopsis phaseolli)* | 230 cm3/ha parte A (tebuconazole 43%) + 200 cm3/ha parte B (azoxistrobina 25%) (*) | Aplicar en inicio de formación de vainas (R3) hasta R6 o con la aparición de los primeros síntomas. Repetir 20 días después de la enfermedad. |
| Trigo | Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Mancha de la hoja del trigo (*Septoria tritici)* Roya anaranjada del trigo (*Puccina recondita)* | 350 - 450 cm3/ha parte A (tebuconazole 43%) + 250 - 300 cm3/ha parte B (azoxistrobina 25%) | Al observar las primeras pústulas o manchas. |

(*) Complejo de enfermedades de fin de ciclo.

**Información General:**

El producto es una combinación de fungicidas (Twin pack) pertenecientes al grupo de los triazoles (parte A tebuconazole) y metoxiacrilatos (parte B azoxistrobina). Posee acción preventiva, curativa y erradicante. Inhibe la biosíntesis del ergosterol del hongo. Es sistémico porque es absorbido y redistribuido en el interior de la planta. Posee un amplio espectro de acción destacándose en el control de enfermedades en trigo y soja, aumentando el rendimiento y calidad de la cosecha.

Instrucciones de uso: antes de abrir los envases, agitarlos para homogeneizar su contenido.

Preparación: preparar la cantidad requerida del producto (según el cuadro de recomendaciones de uso) y adicionar al tanque de la pulverizadora a medio llenar y luego completar a volumen total. Verificar que el sistema de agitación funcione desde el vertido del producto al tanque hasta el final de la aplicación. Utilizar el producto el mismo día de su preparación.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: el producto puede aplicarse con equipos pulverizadores terrestres y aéreos. En aplicaciones terrestres no aplicar menos de 150 l/ha. En aplicaciones aéreas el volumen mínimo debe ser de 15 l/ha y en frutales aplicar caudales de 1000 a 1200 l/ha. Lograr buena cobertura del producto sobre el cultivo a tratar, 20 a 30 gotas/cm3 de follaje. Suspender los tratamientos con vientos superiores a 10 km/ha y evitar la aplicación aérea sobre ríos, arroyos y lagunas.

Período de carencia:
Entre la última aplicación y la cosecha deberán transcurrir: 35 días para trigo y 30 días para soja. En caso que el producto o sus subproductos se destinen a la exportación deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período máximo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Compatibilidad: el producto generalmente se utiliza sólo.

Incompatible con productos de reacción alcalina. No mezclarlo con concentrados emulsionables.

Fitotoxicidad: el producto a las dosis indicadas no es fitotóxico para los cultivos en los cuales se recomienda.

**Derrames:**

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

Recoger el producto previa ligazón con material absorbente(Ej. Tierra, aserrín, turba, aglutinados de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. La destrucción debe realizarse en un sitio autorizado, de acuerdo a la legislación local vigente.

**Clasificación (modo o sitio de acción):** 3 (FRAC) + 11 (FRAC).

**Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:**
Durante la preparación y aplicación usar ropa y elementos de protección: guantes impermeables y botas de goma, barbijo de tela para cubrir boca y nariz, camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas.

**Información Toxicológica:**

Tebuconazole:

| | |
|---|---|
| Toxicidad oral aguda (rata): | DL50: > 4000 mg/kg |
| Toxicidad dermal aguda(rata): | DL50: > 5000 mg/kg |

Azoxistrobina:

| | |
|---|---|
| Toxicidad oral aguda (rata hembra): | DL50: > 5000 mg/kg |
| Toxicidad dermal aguda (rata hembra): | DL50: > 4000 mg/kg |

Riesgos ambientales:

| | |
|---|---|
| Toxicidad para abejas: | Virtualmente no tóxico |
| Toxicidad para aves: | Prácticamente no tóxico |
| Toxicidad para peces: | Muy tóxico para peces |

Se recomienda tener especial cuidado a fin de evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad de 1 metro entre el área a tratar y el agua libre en superficie cercana.
NO contamine el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas o diques.

**No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.**