ACETAMIPRID + ESFENVALERATO

Marcas comerciales: RETAKER.

Nomenclatura Química:
acetamiprid: (E)-N1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-N2-ciano-N1-metilacetamidina.
esfenvalerato: (S)-alfaciano-3-fenoxibencil (S)-2-(4 clorofenil)-3-metilbutirato.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: neonicotinoide + piretroide.
Acción: de contacto, sistémica e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Algodón	Picudo del algodonero (*Anthonomus grandis)*	300cm3/ha	21	Aplicar según las recomendaciones de manejo para esta plaga dadas por INTA y SENASA y teniendo en cuenta los hábitos de la misma.
	Pulgón del algodón (*Aphis gossypii)*	200cm3/ha		Aplicar el producto cuando se observan los primeros pulgones o la formación de las primeras colonias. Tomar como referencia un 5-10 % de plantas con presencia de colonias de no más de 10 pulgones en alguna de sus hojas.
Soja	Chinche de la alfalfa (*Piezodorus guildinii)* Chinche verde (*Nezara viridula)*	200 - 250 cm3/ha		Aplicar según los umbrales establecidos por INTA. A partir de 0,4 chinches/m2 cuando la soja esté en estado de formación de vainas.
	Isoca bolillera (*Heliothis gelotopoeon)*	150 - 200 cm3/ha		Para Isoca bolillera se recomienda aplicar ante la presencia de las primeras orugas. Es fundamental una buena calidad de aplicación para asegurar la llegada del producto a los brotes y sitios donde se ubica la plaga, ya que la mayoría de los casos de escape es debido a la falta de llegada del producto. Utilizar la dosis alta para ataques severos. RETAKER es sistémico y residual, protegiendo a los nuevos brotes y vainas.
	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)* Oruga medidora (*Rachiplusia nu)*			Aplicar cuando se alcancen los umbrales establecidos para estas plagas: Etapa vegetativa, hasta R3: cuando se contabilicen 15-20 orugas grandes (>1.5 cm) y una defoliación entre 20 - 30%. Desde R3 hasta R7: cuando se contabilicen 10 orugas grandes (> 1,5 cm) y una defoliación del 10 %. Daños en vaina: cuando se observe 5% de vainas dañadas.
	Picudo grande (*Sternechus subsignatus)* Picudo negro de la vaina (*Rhyssomatus subtilis)*	250cm3/ha		Ver umbrales según especie.
	Tucura (*Rhammatocerus spp.)*	150 cm3/ha		Cuando se encuentre al estado de saltona, en números de 10 saltonas grandes o 20 saltonas chicas por m2. Realizar las aplicaciones en horas tempranas o a última hora de la tarde.
	Picudo chico (*Promecops carinicollis)* Trips *(Caliothrips phaseoli)*	200 – 250 cm3/ha		Aplicar cuando se observen 5 ninfas por folíolo.
Papa	Pulgón verde del duraznero (Myzus Persicae)	300cm3/ha	30	Aplicar al detectar primeros ejemplares.
	Trips (Frankliniella occidentalis) Trips (Thrips tabacii)			Aplicar al detectar primeros ejemplares. Momento de mayor susceptibilidad: Floración.

(*) Para todos los casos se recomienda aplicar con 500 ml/ha de ésteres metílicos de ácidos grasos al 70%.

Información General:

El producto es una mezcla de activos, acetamiprid más esfenvalerato, dos potentes insecticidas que controlan una gran variedad de plagas.

El esfenvalerato es un piretroide que afecta el sistema nervioso central y periférico de los insectos. Actúa por contacto e ingestión, es de rápida acción y aporta un excelente poder de volteo.

El acetamiprid presenta una acción rápida y de efecto residual prolongado; tiene alta acción sistémica y translaminar (sistémica dentro de las hojas) y es absorbido muy bien por el follaje. Actúa por ingestión y contacto. Afecta el sistema nervioso central de los insectos, como un análogo de la acetilcolina (Ach) que es un transmisor químico natural de los impulsos. El producto combina la acción de ambas moléculas, dando como resultado un insecticida de alto volteo y muy buen persistencia en el cultivo.

Preparación

Llenar el tanque de la maquina pulverizadora hasta la mitad con agua, agregar la cantidad necesaria del producto (previamente agitando el envase) completar el faltante del tanque con agua, mantener en funcionamiento el sistema de agitación.

Equipo y volumen de aplicación
Puede aplicarse con equipos terrestres ó aéreos, considerando los siguientes parámetros en cuanto a calidad de aplicación: cobertura: 30-40 gotas/cm2, tamaño de gota: 200-400 micrones, uniformidad: 30% coeficiente de variación.

Recomendaciones de uso
Se recomienda aplicar con 500 cm3/ha de aceite. Evitar aplicar frente a condiciones ambientales desfavorables: temperatura mayor de 30°C, humedad relativa menor a 40%, viento mayor a 15 km/h.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. El operario debe usar mameluco con delantal, guantes y botas. Colocar mascara para evitar su inhalación. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.
En caso de derrame, cubra el producto con cal y luego con un material adsorbente (arena, tierra, aserrín). El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales. Proceder a lavar con abundante agua el área contaminada.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4A (IRAC) + 3A (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: usar protector facial, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:

Principio activo acetamiprid:
Toxicidad oral aguda (rata macho): DL50: > 217 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 2.000 mg/kg

Principio activo esfenvalerato:
Toxicidad oral aguda(rata): DL50: 458 mg/kg
Toxicidad dermal aguda(conejo): DL50: > 2.000 mg/kg

Producto formulado acetamiprid 10% + esfenvalerato 10%:
Toxicidad oral aguda(rata): DL50: 200-2.000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda(rata): DL50: > 2.000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda(rata): CL50: > 1,25 mg/l

Irritación dermal: Leve irritante
Irritación ocular: Severo irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas: Altamente tóxico
Toxicidad para peces: Extremadamente tóxico
Toxicidad para aves: Moderadamente toxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
RETAKER	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	35749	EC	10% + 10%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.