PIRIMIFOS METIL + LAMBDACIALOTRINA

Marcas comerciales: ACTELLIC PLUS PACK.

Nomenclatura Química:
pirimifós-metil: 2 dietilamino-6-metil pirimidín-4-il-dimetil-fosforotioato
lambdacialotrina: mezcla de isómeros (ZR cis S y ZS cis R) del - alfa - ciano-3 fenoxibencil-cis-3(Z-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: pirimidina organotiofosfato + piretroide.
Acción: de contacto, ingestión y fumigante.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Bolsas vacías	Acaro de los cereales (*Acarus siro)* Arañuela de la harina (*Acarus siro)* Carcoma dentada (*Oryzaephilus surinamensis)* Gorgojo del arroz (*Sitophilus oryzae)* Gorgojo del trigo (*Sitophilus granarius)* Palomita de los cereales (*Sitotroga cerealella)* Taladrillo de los granos (*Rhizopertha dominica)* Tribolio castaño (*Tribolium castaneum)* Tribolio confuso (*Tribolium confusum)*	50 - 200 cm3 de pirimifos metil 50% (parte líquida 1) + 10 - 100 cm3 de lambdacialotrina 5% (parte líquida 2) cada 100 m2 de superficie de bolsas.	(*)	Diluir en 5 a 20 litros de agua. Aplicar sobre una cara de las bolsas, superponiéndolas en camadas.
Camiones Depósitos Silos Vagones y bodegas de barcos		10 cm3 de pirimifos metil 50% (parte líquida 1) + 2 cm3 de lambdacialotrina 5% (parte líquida 2) cada 100 m3 del ambiente a tratar.		Aplicar diluido en 90 cm3 de aceite blanco o destilado de petróleo para termonebulización. Aplicar como niebla con máquinas termonebulizadoras.
		50 - 200 cm3 de pirimifos metil 50% (parte líquida 1) + 25 - 100 cm3 de lambdacialotrina 5% (parte líquida 2) cada 100 m2 de superficie en instalaciones.		Aplicar diluido en agua suficiente (3 a 5 litros) o aceite mineral blanco (50 a 150 cm3). Pulverizar con equipos manuales o de motor. En superficies muy porosas como madera o arpillera se debe aumentar el caudal hasta 20 litros. Si fuera necesario repetir cada 6 semanas.
Cebada Granos de Arroz con cáscara Sorgo	Gorgojo castaño de la harina (*Tribolium castaneum)* Gorgojo del arroz (*Sitophilus oryzae)* Taladrillo de los granos (*Rhizopertha dominica)*	8-16 cm3 de Actellic® 50 + 2-4 cm3 de Karate ® Zeon® 5 CS por tonelada de grano en movimiento.		Aplicar diluido en 1 litro de agua, y asperjados con dosificadores adecuados según las condiciones en la época y lugar de aplicación.
Granos de Maíz	Gorgojo de la harina (*Tribolium castaneum)* Gorgojo del arroz (*Sitophilus oryzae)* Taladrillo de los granos (*Rhizopertha dominica)*	8 cm3 de pirimifos metil 50% (parte líquida 1) + 2 cm3 de lambdacialotrina 5% (parte líquida 2) por tonelada de grano en movimiento.		Aplicar diluido en 1 litro de agua, y asperjados con dosificadores adecuados.
Granos de Trigo	Acaro de los cereales (*Acarus siro)* Arañuela de la harina (*Acarus siro)* Carcoma dentada (*Oryzaephilus surinamensis)* Gorgojo del arroz (*Sitophilus oryzae)* Gorgojo del trigo (*Sitophilus granarius)* Palomita de los cereales (*Sitotroga cerealella)* Taladrillo de los granos (*Rhizopertha dominica)* Tribolio castaño (*Tribolium castaneum)* Tribolio confuso (*Tribolium confusum)*			
Granos de Trigo estibados		50 - 200 cm3 de pirimifos metil 50% (parte líquida 1) + 10 - 100 cm3 de lambdacialotrina 5% (parte líquida 2) cada 100 m2 de superficie de estiba.		Diluir en 5 a 20 litros de agua, según las condiciones de limpieza, aeración, altura de estiba, entre otros factores. Pulverizar con mochila manual. Repetir cada 30 días en verano y 60 días en invierno, según dosis empleada, en las partes externas de las estibas.

(*) Los granos de arroz con cáscara, cebada, maíz, sorgo y trigo pueden ser utilizados al día siguiente de realizada la aplicación. En caso que los granos o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos (LMR) del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Información General:

Insecticida, presentado en forma de "Twin Pack", que consta de dos partes líquidas: parte líquida 1 (pirimifós-metil) y parte líquida 2 (lambdacialotrina micro-encapsulada).

El pirimifós metil, contenido en la parte líquida 1, tiene un amplio espectro y persistencia de control para el tratamiento de granos y semillas de trigo, maíz, arroz con cáscara, cebada y sorgo almacenados en bolsas o a granel, transportes e instalaciones. Provee control por contacto, ingestión e inhalación sobre arañuela de la harina o ácaro de los cereales (Acarus siro), gorgojo del trigo (Sitophilus granarius), gorgojo del arroz (Sitophylus oryzae), carcoma dentada (Oryzaephilus surinamensis), palomita de los cereales (Sitrotoga cerealella), tribolio castaño o de la harina, (Tribolium castaneum) y tribolio confuso (Tribolium confusum).
En maíz provee control para gorgojo del arroz (Sitophylus oryzae); gorgojo castaño de la harina (Tribolium castaneum) taladrillo de los granos (Rhizopertha dominica).
En arroz con cáscara, cebada y sorgo, controla gorgojo del arroz (Sitophylus oryzae); gorgojo castaño de la harina (Tribolium castaneum); taladrillo de los granos (Rhizopertha dominica).
La lambdacialotrina, presente en la parte líquida 2, se caracteriza por su buen poder de volteo, residualidad y propiedades repelentes, ejerciendo control sobre las plagas por contacto e ingestión. Actúa sobre el sistema nervioso del insecto, provocando hiperexcitación, convulsiones, parálisis y finalmente su muerte. Posee la particularidad de tener control sobre Taladrillo de los cereales (Rhizoperta dominica).
De este modo, la mezcla de ambos ingredientes activos tiene un efecto protector sobre todo el espectro de plagas de granos de trigo y maíz, arroz con cáscara, cebada y sorgo almacenados. El producto no es volátil, por lo cual los granos tratados pueden ser transitados sin perder su efectividad. Controla larvas, pupas, y adultos. No transmite olores, ni sabores extraños a los granos. No afecta el poder germinativo de las semillas.

Preparación: consta de una parte formulada como concentrado emulsionable (pirimifos metil 50% - parte líquida 1) y otra parte como suspensión de encapsulado (lambdacialotrina 5% parte líquida 2).
Para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones:
- Agregar agua al tanque, hasta la mitad de su volumen.
- Poner el sistema de agitación en funcionamiento.
- Agregar la cantidad necesaria de ambas partes del producto, de acuerdo a la calibración realizada, directamente en el tanque y sin disolución previa.
- Terminar de llenar el tanque con agua, hasta el volumen final.
- Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento.
- Usar el producto dentro de las 12 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
- Recordar re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
- Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Tratamientos:
- Granos de trigo, maíz, arroz con cáscara, cebada y sorgo a granel;
  a) Mercadería infestada.
  b) Mercadería sin infestar.
- Granos de trigo, maíz, arroz con cáscara, cebada y sorgo embolsados y estibados.
- Bolsas vacías.
- Depósitos, camiones, silos, vagones y bodegas de barcos.

Los usos de este producto se refieren a granos en adecuadas condiciones de humedad, para un correcto almacenamiento y/o transporte, así como en instalaciones y vehículos previamente limpiados, sin polvo ni restos de mercadería y secos. Antes de efectuar aplicaciones en instalaciones vacías, limpiar prolijamente las mismas y sus adyacencias. Vehículos y bolsas vacías deberán estar también limpios. En instalaciones se recomienda la aplicación mediante nebulización en frío previo al llenado de granos y en aquellos depósitos que su estructura lo permita, continuar con tratamientos periódicos.

Recomendaciones de uso: las dosis recomendadas varían según los riesgos habituales de infestación o tiempo de almacenamiento de las bolsas o granos.
Según la dosis de ambos ingredientes activos, en tratamientos preventivos, la residualidad es de 6 a 9 meses de protección. En condiciones óptimas de humedad y almacenaje puede extenderse a 1 año.
Este producto no transmite olores o sabores extraños a los granos tratados, ni afecta su poder germinativo, siguiendo las recomendaciones indicadas.

Período de carencia: los granos de arroz con cáscara, cebada, maíz, sorgo y trigo pueden ser utilizados al día siguiente de realizada la aplicación. En caso que los granos o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos (LMR) del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia. El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie.

Compatibilidad:
No aplicar en mezcla con otros productos sin realizar previamente una prueba en pequeña escala para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes.

Fitotoxicidad: no se han observado síntomas de fitotoxicidad en el cultivo de trigo, maíz, arroz, cebada y sorgo siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1B (IRAC) + 3A (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber ni fumar durante el manipuleo del producto. No destapar picos ni boquillas con la boca. Evitar el contacto con el pulverizado.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Bañarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata) parte líquida 1:	DL50: >1522 mg/kg
Toxicidad oral aguda (rata) parte líquida 2:	DL50: 512 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata) parte líquida 1:	DL50: >2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata) parte líquida 2:	DL50: >4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata) parte líquida 2:	CL50: >5,07 mg/l

Moderado irritante dermal. Severo irritante ocular. No sensibilizante cutáneo.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:
Extremadamente tóxico para peces.
Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el agua remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Altamente tóxico para abejas.
Respetar los cultivos y momentos de aplicación de esta etiqueta en forma estricta. Retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de aplicación por un tiempo mínimo de 30 días. Si las colmenas no pudieran retirarse, entornar las piqueras o tapar las colmenas con bolsas húmedas durante la aplicación, retirando las bolsas pasada la misma. Evitar la aplicación aérea en las horas de mayor actividad de las abejas. Se debe tomar la precaución de no contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.
Moderadamente tóxico para aves.
Evitar la presencia de las mismas en el área de aplicación e impedir que tomen contacto con las semillas e instalaciones tratadas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ACTELLIC PLUS PACK	SYNGENTA AGRO	PACK-062	EC + CS	50% + 5%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.