BORO Y AMINOACIDOS

Nomenclatura Química:
Boro y Aminoácidos.
Clasificación Química: orgánico + microelementos.
Acción: corrección de deficiencias.

Uso: fertilizante (foliar y ferti-irrigación).

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Caña de azúcar Cítricos o citrus Frutales Hortícolas Olivo Vid (Cualquier cultivo que presente deficiencia de Boro)	En fertirriego la conductividad eléctrica de la solución a regar no debe sobrepasar los 2 ds/m o mmhos/cm. Foliar: 100 - 300 ml/ha en cada aplicación. Riego por goteo: 3 a 8 l/ha. En cada aplicación.	Aplicar cuando se prevean o presenten los primeros síntomas de deficiencia. Se recomienda utilizar en un programa de tratamiento. Los mejores resultados se obtienen en varias aplicaciones más que en una sola a dosis más elevadas. En Frutales, aplicar en pre-floración (1-2 semanas antes de floración) y en caso de problema de caída de frutos repetir luego del cuaje, cuando los frutos son pequeños. En manzano, peral, durazno, cereza y ciruelo es recomendable realizar una aplicación después de cosecha antes de caída de las hojas. En vegetales y cultivos de campo, aplicar 1-3 veces durante el ciclo de crecimiento de las plantas, comenzando cuando las mismas son jóvenes.

Información General:

Composición:
Aminoácidos libres: 6%
Nitrógeno total: 3%
Nitrógeno orgánico: 3%
Boro (B): 8%
Reacción en el suelo: alcalina.

Grado: 3 - 0 - 0 Grado equivalente: 3 - 0 - 0

El formulado contiene todos y cada uno de los aminoácidos libres biológicamente activos:
Ácido aspártico, serina, ácido glutámico, glicina, histidina, arginina, treonina, alanina, prolina, cistina, tirosina, valina, metionina, lisina, isoleucina, leucina, fenilalanina y triptofano.
Materia prima utilizada: aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis enzimática de mucosa intestinal de origen porcino.

Es un corrector de deficiencia de Boro con aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis enzimática para ser aplicado mediante pulverización foliar o por el riego por goteo en plantas que necesitan un suplemento nutricional con Boro.
El Boro es rápidamente absorbido y traslocado a las puntos de crecimiento de las plantas, donde suele ser normalmente más deficiente.
El Boro es un elemento clave para la formación de pectatos en las células de las plantas y el cuaje de los frutos. Los aminoácidos libres presentes en la formulación son utilizados por la planta para incrementar la actividad fotosintética y otros procesos metabólicos, consecuentemente se reducen los factores de estrés haciendo al Boro más rápidamente disponible para la planta.

Puede ser utilizado para prevenir o corregir deficiencias en muchos cultivos. Los síntomas de deficiencia de Boro más comunes son:
- Decoloración o necrosis de hojas jóvenes y puntos de crecimiento.
- Defoliación de brotes en caso de deficiencia severa.
- Insuficiente floración y cuaje de frutos seguida por caída de frutos y/o malformación de frutos.

Algunos cultivos muestran síntomas específicos cuando sufren de deficiencia de Boro:

- Caña de azúcar: pudrición del cogollo, quemado de la punta en hojas jóvenes.
- Manzano y peral: malformación de frutos, chamuscado, "frutos corchosos".
- Alfalfa: decoloración y atrofia de hojas.
- Vid: insuficiente cuajado de frutos.
- Olivo: decoloración de hojas, defoliación de brotes, chamuscado y caída de frutos.
- Citrus: decoloración de hojas, puntos gomosos internos en frutos, engrosamiento de la piel de los frutos.
- Vegetales: tallo ahuecado, decoloración de hojas, quemado de las puntas de hojas jóvenes, atrofia, chamuscado y agrietado de frutos.
- Frutilla: malformación del fruto.
- Brócoli, coliflor: tallo ahuecado.
- Apio: tallo ahuecado.
- Papa: amarronado del tubérculo, atrofia y hojas enruladas.

Compatibilidad:
- Es normalmente compatible con casi todos los fitosanitarios y fertilizantes comúnmente utilizados.
- Evitar mezclas altamente alcalinas.
- En caso de no conocer la compatibilidad se recomienda realizar una prueba previa a la aplicación.

Almacenamiento:

Consérvese en su envase original, evitando las condiciones extremas de humedad y temperatura. En caso de derrame, lavar con agua. Agitar enérgicamente el producto antes de su uso. Almacenar el producto a temperaturas superiores a 5º C.

Derrames:
Contener el derrame de producto. Prevenir que los derrames ingresen en desagües, cursos de agua, piletas, etc. Evitar la generación de polvo. Para evitar los puntos detallados anteriormente cubrir el derrame con arena, aserrín cualquier material adsorbente, barrer y juntar colocándolo en recipientes adecuados para su reciclado, reutilización o desecho.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Ante cualquier accidente químico consultar con Centros de Atención de Emergencias Toxicológicas.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.