Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

FOSFATO MONOPOTASICO

Marcas comerciales: HAIFA MKP.

Nomenclatura Química:
Fosfato Monopotásico.
Clasificación Química: compuesto inorgánico.
Acción: aporte de fósforo y potasio.

Uso: fertilizante (fertirrigación).

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Berenjena Tomate	a) 1 kg/ha/día	Del transplante a 60 días.
	b) 1,5 kg/ha/día	De 61 días a 120 días.
	c) 0,8 kg/ha/día	Más de 4 meses.
Cebolla	a) 1,5 kg/ha/día	Del transplante a las 3 hojas Periodo de activo desarrollo foliar Final del periodo foliar - inicio bulbo
	b) 1 kg/ha/día	De la bulbificación a la cosecha.
Clavel Rosales	a) 3 kg/ha/día	De 0 a 120 días.
	b) 1,6 kg/ha/día	De 121 a 240 días.
	c) 0 kg/ha/día	De 241 días al final.
Frutilla	10 kg/ha/día	Aplicación vía fertirriego: De 4 a 16 semanas después de la plantación.
Lechuga	a) 0,3 kg/ha/día	Del transplante a los 15 días.
	b) 1 kg/ha/día	De los 16 días a los 30 días.
	c) 1,6 kg/ha/día	Más de 31 días.
Melón	a) 1,5 kg/ha/día	Siembra - Floración - Cuajado - Inicio maduración.
	b) 1 kg/ha/día	De la Maduración a la Cosecha.
Pepino Zapallito Zapallo	a) 1 kg/ha/día	De la siembra a los 60 días.
	b) 1,6 kg/ha/día	De los 61 días a los 90 días.
	c) 0 kg/ha/día	De los 91 días al Fin.
Pimiento	a) 0,9 kg/ha/día	Del transplante a 10 días.
	b) 1,4 kg/ha/día	De los 11 días a los 30 días.
	c) 0,9 kg/ha/día	Y de 31 días a 75 días.
	d) 0,5 kg/ha/día	Más de 76 días.

Información General:

Concentración:
P2O5 52%
P 22,7%
K2O 34%
K 28,7%
Densidad 1.2 g/cm3

Grado: 0 - 23 - 28,5 Grado equivalente: 0 - 52 - 34,5

Es un producto completamente soluble en agua. Libre de cloruros, sodio, y otros elementos perjudiciales.

Bajo pH y bajo Índice Salino.

Usos:
- Nutrigación y aplicaciones foliares.
- Fabricación de mezclas fertilizantes sólidas y líquidas.
Utilizar al comienzo de la temporada del cultivo, cuando la disponibilidad de Fósforo es vital para el establecimiento del sistema radicular.

Solubilidad: libremente soluble
Índice de acidez: Neutro
El agua de riego no deberá sobrepasar la concentración de 2 g de sal por litro o una conductividad eléctrica de 2 decisiemens/m.

Compatibilidades:
Incompatible con, Cianamida de calcio, Escorias Thomas, Hiperfosfato y Cal.

Aplicaciones por fertirrigación:
Preparación de la solución madre. Deben mezclarse la cantidad de producto a utilizar en 50 litros de agua, agitar e incorporar dicha solución nutritiva al tanque fertilizador del equipo de riego.
La dosificación dependerá del tipo de suelo o sustrato, estado de desarrollo del cultivo, clima, etc. por lo que es aconsejable el seguimiento del estado nutricional del cultivo a través de análisis foliares y del asesoramiento de un profesional idóneo.

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

Derrames:
Contener el derrame de producto. Prevenir que los derrames ingresen en desagües, cursos de agua, piletas, etc. ya que puede promover el crecimiento de algas (eutrofización). Evitar la generación de polvo.

Recoger y colocar el material en recipientes adecuados para su reciclado, reutilización o desecho.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para evitar el contacto con la piel o los ojos, use mangas largas, mameluco, guantes de cuero y anteojos de seguridad con defensas laterales, protección respiratoria.

Información Toxicológica:

Producto no tóxico para las abejas. No tiene Riesgos Ambientales.

Ante cualquier accidente químico consultar con Centros de Atención de Emergencias Toxicológicas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Grado/Conc.
HAIFA MKP	BROMETAN	12570	SÓLIDO CRISTALINO	0 - 23 - 28,5 (G.Eq.: 0 - 52 - 34,5)