CALCIO

Nomenclatura Química:
Calcio.
Clasificación Química: elemento secundario.
Acción: aporte de nutrientes.

Uso: fertilizante foliar (prevenir y controlar deficiencias de calcio).

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Ají Tomate	0,1/0,4 % - 3,0/6,0 l/ha	Desorden Fisiológico: Podredumbre apical (Blossom end rot). A partir de frutos con 2cm de diámetro. Repetir cada 10 días. Las últimas 2/3 aplicaciones incrementan la cantidad del fruto.
Cerezas	5,0/6,0 l/ha	Desorden Fisiológico: Déficit de calcio. Aplicaciones quincenales 6/8 semanas antes de la cosecha. Número de aplicaciones: 3/4.
Cucurbitáceas (pepino, melón, sandía)	0,3/0,5 % - 3,0/6,0 l/ha	Desorden Fisiológico: Podredumbre apical. A partir de la formación de los frutos quincenalmente hasta 2 semanas antes de la cosecha.
Frutilla	0,3 % - 3,0 l/ha	Desorden Fisiológico: Déficit de calcio. Junto a las últimas aplicaciones de fungicidas. Número de aplicaciones: 2/3.
Hortalizas	0,3 % - 3,0/6,0 l/ha	Desorden Fisiológico: Corazón hueco. Lechuga, repollo y coliflor iniciar con la formación de la cabeza. Endivia, 10-14 días después del plantío. Apio 5/7 semanas antes de la cosecha. Mojar bien el corazón de la planta. Número de aplicaciones: 2.
Manzano	0,2 % - 3,0 l/ha	Desorden Fisiológico: Bitter-pit Cork spot (acorchamiento). A partir de la caída de los pétalos y hasta 10 días antes de la cosecha. Las dosis y frecuencias mayores para variedades más susceptibles a deficiencias de calcio. Número de aplicaciones: 4/6.
	0,4 % - 5,0 l/ha	Desorden Fisiológico: Bitter-pit Cork spot (acorchamiento). Luego del cuaje y hasta 6 semanas después. Período de máxima absorción. Continuar con tratamiento tradicional. Número de aplicaciones: 2.
Uva	10,0 l/ha	Desorden Fisiológico: Resecamiento del escobajo (Stem Dieback). Luego de la floración y junto a los fungicidas. Luego de formados los frutos, quincenalmente. Número de aplicaciones: 3.
	5,0 l/ha	Desorden Fisiológico: Resecamiento del escobajo (Stem Dieback). Luego de la floración y junto a los fungicidas. Luego de formados los frutos, quincenalmente. Número de aplicaciones: 5.

Información General:

Contenido de nutrientes (%p/p):
Nitrógeno: 10%
Calcio: 10,5%
Magnesio: 1%
Boro: 0,05%
Manganeso: 0,1%
Molibdeno: 0,001%
Hierro: 0,2%
Densidad: 1,67 g/ml
pH: 7,5
Tensión superficial: 51,4 Dyn/cm

Es un producto formulado como suspensión concentrada desarrollado especialmente para que a través de aplicaciones foliares se puedan prevenir y/o controlar las carencias de calcio que provocan desordenes fisiológicos en manzana, tomate, ají, frutilla, pepino, melón, sandía, hortalizas, cereza y uva. Contiene la exacta y necesaria cantidad de nitrógeno y magnesio para favorecer la asimilación del calcio, reguladores de pH para poder aplicarlo conjuntamente con otros agroquímicos y utilizando aguas duras, sin peligro de degradación.

Preparación: la cantidad requerida de producto para el tratamiento debe ser agregada al tanque con agua del equipo pulverizador y con los agitadores en marcha.

Restricciones: no pulverizar durante la floración, en los momentos de máxima temperatura ambiente, de gran insolación y períodos de sequía.

Compatibilidad: puede mezclarse y aplicarse con la mayoría de los pesticidas de uso común.
Observaciones: evitar que la cantidad de caldo sea excesiva u ocurran corrimientos en los extremos de las hojas. Para alterar las recomendaciones de uso, aconsejamos consultar un Ingeniero Agrónomo.

Almacenamiento: Guardar en su envase original cerrado. En lugar fresco y seco. Evitar cambios bruscos de temperatura.

Evitar temperaturas inferiores a 5º C y superiores a 40º C. Si se produce la formación de cristales coloque el envase en un sitio soleado y luego con un ligero agitado la formulación vuelve a su estado original.

"Se deberá utilizar con el agregado de un tensioactívo (no iónico, no polar) o conjuntamente con fitosanitarios.
"Este producto es un complemento y no un sustituto de los fertilizantes de aplicación común (aplicados al suelo)".
"No aplicar en días calurosos o en horas de gran insolación".

Derrames:
Contener el derrame de producto. Prevenir que los derrames ingresen en desagües, cursos de agua, piletas, etc. Evitar la generación de polvo.

Recoger y colocar el material en recipientes adecuados para su reciclado, reutilización o desecho.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Ante cualquier accidente químico consultar con Centros de Atención de Emergencias Toxicológicas.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.