Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

COMPUESTO NPK RECUBIERTO DE LIBERACION CONTROLADA

Marcas comerciales: MULTICOTE 4 - MULTICOTE 6 - MULTICOTE 8.

Nomenclatura Química:
Compuesto de N, P y K.
Clasificación Química: compuesto inorgánico.
Acción: aporte de nutrientes.

Uso: fertilizante.

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Árboles	establecidos: 50 - 200 g gramos/árbol	Bajo el área de la copa.
	transplante: 20 - 40 g gramos/árbol	En el hoyo de plantación.
Arbustos	350 - 500 g cada 10 metros cuadrados	Comienzos de primavera y otoño.
Césped	450 g cada 10 metros cuadrados	Después del corte.
Flores de estación	500 - 600 g cada 10 metros cuadrados	Durante siembra o plantación.
Frutilla Hortalizas	400 - 1000 g cada 10 metros cuadrados	Incorporado a 10 - 15 cm de profundidad.
Plantas en macetas	Plantas muy exigentes 25 - 45 g cada 10 litros de capacidad Plantas poco exigentes 15 - 25 g cada 10 litros de capacidad	
Viveros	200 - 500 g cada 10 metros cuadrados	

Información General:

Composición:
Nitrógeno Total (N): 20,0%
Fósforo soluble (P): 4,5%
Potasio soluble (K): 16,5%
Reacción en el suelo: ácida.
Índice: -17,8

Grado: 20 - 4,5 - 16,5 Grado equivalente: 20 - 10 - 20

Es un fertilizante recubierto N-P-K, de liberación controlada, libre de cloruros. Debe ser aplicado de acuerdo a las condiciones de suelo, ambientales y a los requerimientos específicos del cultivo.

Asegura un abastecimiento balanceado y controlado de nitrógeno, fósforo y potasio de manera continua, durante el periodo de liberación especificado.

Está recubierto con resinas para la liberación de los nutrientes de manera balanceada y según pauta controlada.

En suelos con temperatura media de 21º C libera el 80% de los nutrientes uniformemente durante 4, 6 u 8 meses.
Otros factores como tipo de suelo, pH, actividad microbiana no afectan significativamente la longevidad de la liberación.

Período de liberación controlada de acuerdo a la temperatura media del suelo:
- 15ºC: 6 meses.
- 21ºC: 4 meses.
- 30ºC: 2 - 2,5 meses.

MULTICOTE 6:
- 15ºC: 7 - 8 meses.
- 21ºC: 6 meses.
- 27ºC: 4 meses.
- 32ºC: 3 meses.

MULTICOTE 8:
- 15ºC: 9 - 10 meses.
- 21ºC: 8 meses.
- 27ºC: 6 - 7 meses.
- 32ºC: 5 - 5 meses.

Derrames:

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

Contener el derrame de producto. Prevenir que los derrames ingresen en desagües, cursos de agua, piletas, etc.
Recoger y colocar el material en recipientes adecuados para su reciclado, reutilización o desecho.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para evitar el contacto con la piel o los ojos, use mangas largas, mameluco, guantes impermeables y anteojos de seguridad con defensas laterales.

Protección personal en altas concentraciones: Utilice mameluco de PVC, guantes de PVC y protección respiratoria homologada.

Información Toxicológica:

Precauciones: no ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

Ante cualquier Intoxicación consultar con Centros de Atención de Emergencias Toxicológicas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Grado/Conc.
MULTICOTE 4	BROMETAN	12774	SÓLIDO EN GRANULOS	20 - 4,5 -16,5 (G.Eq.: 20 -10 - 20)
MULTICOTE 6	BROMETAN	15865	SÓLIDO EN GRANULOS	20 - 4,4 - 16,6
MULTICOTE 8	BROMETAN	15854	SÓLIDO EN GRANULOS	20 - 4,4 - 16,6