Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

FLUDIOXONIL + METALAXIL - M + INOCULANTE

Nomenclatura Química:
fludioxonil: 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pirrol-3-carbonitrilo.
metalaxil-M: N-(2,6-dimetilfenil)-N-(2'-metoxiacetil)-D-alanina metil ester.
Medio estéril con bacterias fijadoras de nitrógeno (Bradyrhizobium sp.) para el tratamiento de semillas de soja.
Clasificación Química: acilalanina + fenilpirrol + biológico (no corresponde c.q.).
Acción: de contacto, sistémica y promotor biológico del crecimiento vegetal.

Uso: curasemillas, fungicida e inoculante.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Alternaria (*Alternaria spp.)* Complejo de hongos del suelo o Damping-off (*Phytium spp.)* Hongos del suelo (*Penicillium spp.)* Hongos del suelo (*Fusarium spp.)* Hongos del suelo (*Aspergillus spp.)* Hongos del suelo (*Rhizoctonia spp.)* Hongos del suelo (*Phytophthora spp.)* Hongos del suelo (*Phomopsis spp.)* Hongos del suelo (*Rhizopus spp.)* Mancha púrpura de la semilla (*Cercospora kikuchii)*	1,1 litros de inoculante (Bradyrhizobium sp.) + 1 litro de fungicida (fludioxonil + metalaxil-M) cada 1000 kg de semillas.	(*)	Aplicar a las semillas en forma de dilución. No requiere período de espera entre la aplicación y la siembra.

(*) Exento de período de carencia para el uso como terápico de semillas. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Información General:

Fungicida terápico para tratamiento de semilla + fertilizante biológico líquido de aplicación directa.

Procedimiento básico para inocular 1.000 kg de semillas de soja:
- En el bidón provisto colocar el contenido de un sachet de 1,1 litros de inoculante.
- En el mismo bidón colocar el contenido de un envase de 1 litro de fungicida.
- Agregar agua limpia hasta completar los 5 litros. Agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea.
- Los 5 litros de la mezcla obtenida alcanzan para inocular y proteger 1.000 kg de semilla de soja.
- Con el recipiente dosificador se pueden medir 250 cm3 de la mezcla para inocular 50 kg de semillas de soja.

Recomendaciones importantes:
- Es aconsejable realizar la inoculación en máquinas especiales para el tratamiento de semillas, lo cual permite obtener una distribución y cobertura uniformes del producto sobre las semillas.
- Una vez preparada la mezcla de inoculante + fungicida + agua, realizar la inoculación en forma inmediata.
- Todo el procedimiento de inoculación debe realizarse en sitios donde no incida directamente la radiación solar.
- Mantener las semillas inoculadas a la sombra, sembrar dentro de las 12 horas de realizado el tratamiento.
- Realizar la calibración de la sembradora con la semilla tratada.

Nota: para más información sobre el fungicida terápico para tratamiento de semillas remitirse al marbete correspondiente (fludioxonil + metalaxil-M).

Derrames:
Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas según legislación local vigente. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 12 (FRAC) + 4 (FRAC) + no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar guantes de acrilonitrilo, protección ocular, protección respiratoria adecuada, botas de goma, ropa de mangas y piernas largas y delantal durante la aplicación.

Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

Información Toxicológica:

Ver cada principio activo por separado.

Advertencias para el médico:
Leve irritante dermal. No irritante ocular.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.
La administración de una suspensión de carbón activado puede favorecer la eliminación del tóxico y limitar su absorción desde el tracto digestivo.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.