TIAMETOXAM + TEFLUTRINA

Marcas comerciales: EXCELTO (*) - FORCE ZEA.

Nomenclatura Química:
tiametoxam: 3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5]oxadiazinan-4-ilideno-N-nitroamina
teflutrina: 2,3,5,6-tetrafluoro-4-metilbenceno (1R 3R;1S 3S)-3-(Z-2-cloro-3,3,3,trifluroprop -1-enil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: neonicotinoide + piretroide.
Acción: de contacto, ingestión e inhalación.

Uso: curasemillas insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Bicho torito o Bicho candado o Gusano Blanco (*Diloboderus abderus)*	175 cm3/100 kg de semillas	(*)	Tratamiento de semilla. Aplicar con un volumen de dilución de 1000 - 2000 cm3/100 kg de semillas. No requiere período de espera entre la aplicación y la siembra.
Girasol	Ciclocéfalas, Gusano blanco (*Cyclocephala putrida)*	300-500 cm3/100 kg de semillas		Tratamiento de semilla. Aplicar con un volumen de dilución de 1200 - 1700 cm3/100 kg de semillas. No requiere período de espera entre la aplicación y la siembra.
Maíz	Ciclocéfalas, Gusano blanco (*Cyclocephala modesta)* Dyscinetus, Gusano blanco (*Dyscinetus gagates)* Gorgojos (*Pantomorus spp.)* Gusano alambre (*Conoderus spp.)* Gusano blanco (*Bothynus striatellus)* Gusano blanco (*Heterogomphus pauson)* Gusano blanco (*Phyllochloemia bonariensis)* Gusano blanco (*Diloboderus abderus)* Gusano blanco (*Anomala testaceipes)* Gusano blanco (*Archophileurus vervex)* Gusano blanco o Escarabajo rubio (*Cyclocephala signaticolis)* Gusanos alambre (*Agriotes spp.)* Gusanos de la raíz, Vaquitas (*Colaspis spp.)* Gusanos de la raíz, Vaquitas (*Diabrotica spp.)* Mosca de la semilla (*Hylemyia spp.)*	300 cm3/100 kg de semillas		Tratamiento de semilla. Aplicar con un volumen de dilución de 1000 - 1200 cm3/100 kg de semillas. No requiere período de espera entre la aplicación y la siembra.
Sorgo	Gusano blanco (*Diloboderus abderus)*			Tratamiento de semilla. Aplicar con un volumen de dilución de 800 - 1200 cm3/100 kg de semillas. No requiere período de espera entre la aplicación y la siembra.
Girasol	Tenebriónido de girasol (*Blapstinus punctulatus)*	300-400 cm3/100 kg de semillas 0,26 - 0,34 cm3/1000 semillas		Tratamiento de semilla. Aplicar con un volumen de dilución de 1200 - 1700 cm3/100 kg de semillas. No requiere período de espera entre la aplicación y la siembra.

(*) Se halla exento de período de carencia para el uso como terápico de semillas. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Este producto NO requiere período de espera entre la aplicación y la siembra.

Información General:

Insecticida diseñado para ser aplicado a las semillas de los cultivos de maíz, girasol trigo y sorgo. Está especialmente recomendado para el control de insectos del suelo e insectos que se alimentan o succionan los tejidos vegetales, como gusanos blancos, gusanos alambre, gusanos de la raíz, gorgojos y moscas de la semilla.
Contiene dos principios activos el tiametoxam, neonicotinoide sistémico y de acción residual; y el piretroide teflutrina. Tiametoxam es absorbido por la planta y translocado sistémicamente, siendo ingerido por el insecto al alimentarse del cultivo. Muestra una rápida acción de contacto y estomacal, afectando el sistema nervioso del mismo. Teflutrina es el único piretroide que actúa por efecto vapor, caracterizándose por una alta movilidad en la fase gaseosa del suelo y la formación de un halo protector alrededor de la semilla. Actúa también por contacto e ingestión. Posee rápido poder de volteo y efecto residual.
Las propiedades de los ingredientes activos proveen protección completa a los cultivos de maíz, girasol, trigo y sorgo del ataque de plagas durante su implantación.

Preparación:
Se debe aplicar sobre las semillas a tratar en forma de dilución.
Para prepararla, se debe agregar agua limpia a la cantidad necesaria de producto, hasta alcanzar el volumen de dilución (agua + producto), recomendado para cada tipo de semilla:
Maíz: 1000 - 1200 cm3/100 kg de semillas (300 cm3 de producto + 700 - 900 cm3 de agua).
Girasol: 1200 - 1700 c cm3/100 kg de semillas (300 - 500 cm3 de producto+ 900 - 1200 cm3 de agua).
Trigo: 1000 - 1200 cm3/100 kg de semillas (175 cm3 de producto + 825 - 1825 cm3 de agua).
Sorgo: 800 - 1200 cm3/100 kg de semillas (300 cm3 de producto + 500 - 900 cm3 de agua).

Para una correcta preparación de la dilución respetar las siguientes instrucciones:
- Añadir agua al recipiente en donde se preparará la mezcla hasta la mitad del volumen total.
- Agregar luego la dosis de producto, según la cantidad de semillas a tratar. Agitar en forma mecánica o manual.
- Completar con agua hasta el volumen de dilución requerido.
- Mantener la agitación durante todo el tiempo de uso.
- La dilución debe ser usada dentro de las 24 horas luego de preparada.
- Usar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: suspensión concentrada para ser aplicada sobre las semillas de maíz, girasol, trigo y sorgo. Para obtener una buena protección del cultivo, es indispensable distribuir el producto homogéneamente, asegurando que cada semilla quede cubierta en forma uniforme. Puede ser aplicado en cualquier equipo de tratamiento continuo o de batch. También puede utilizarse tambor rotativo de eje excéntrico, mezcladora tipo hormigonera o máquina mezcladora con sinfín.
NO aplicar este producto directamente dentro de la sembradora. En el momento de la siembra, se debe calibrar la máquina con las semillas tratadas con este producto, debido a que las mismas fluirán más lentamente.

Período de carencia: exento para el uso como terápico de semillas. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Restricciones de uso:
Para asegurar una buena germinación y protección, realizar el tratamiento con este producto a una muestra de cada lote de semillas. Determinar el poder germinativo y energía germinativa antes de realizar el tratamiento a todo el lote. Solo aquellas semillas que tengan los valores testeados aceptables, deberán tratarse en grandes cantidades.
NO debe repetirse el tratamiento sobre semilla ya tratada.

Atención: la venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra está penada por la ley. La ley 18.073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados al consumo humano o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas), la ley dictamina el decomiso y multa. Piense que una sola bolsa de semilla curada mezclada en varios silos de granos para el consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa para la alimentación humana o animal y por lo tanto los infractores serán severamente penados.

Compatibilidad: compatible con otros terápicos para tratamientos de semillas, formulados como polvos dispersables o curasemillas en suspensión de reacción neutra. No es compatible con formulaciones basadas en solventes. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4A (IRAC) + 3A (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma.

Información Toxicológica:

DL50 oral aguda: > 5000 mg/kg (rata)
DL50 dermal aguda: > 5000 mg/kg (rata)
LC50 inhalación >5,52 mg/l

No irritante ocular ni dermal. No sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:

Extremadamente tóxico para peces.
Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza del equipo y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Altamente tóxico para abejas, aunque debido su uso como terápico de semillas, no se espera exposición para las mismas. Se deben respetar los cultivos y momentos de aplicación de esta etiqueta en forma estricta. Retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de siembra por un tiempo mínimo de 30 días. Tomar la precaución de no contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.
Prácticamente no tóxico para aves.
Las semillas tratadas deben ser enterradas adecuadamente y quedar completamente cubiertas por el suelo. Si quedara semilla tratada, recogerla o enterrarla para evitar que sea ingerida por las aves u otros animales. Debe tomarse la precaución de no contaminar posibles fuentes de bebida con remanentes del producto ni del equipo de aplicación.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
EXCELTO (*)	SYNGENTA AGRO	35698	FS	20% + 8%	IV
FORCE ZEA	SYNGENTA AGRO	35350	FS	20% + 8%	IV

(*) Distribuido por RIZOBACTER ARGENTINA S.A.

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.