DIFENOCONAZOLE + FLUDIOXONIL

Marcas comerciales: DIVIDEND EXTRA - NORBIZA EXTRA.

Nomenclatura Química:
difenoconazole: 1-[2-(4-(4-clorofenoxi)-2-clorofenil)-4-metil-1,3-dioxolan-2-il-metil]-1H-1,2,4-triazol
fludioxonil: 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pirrol-3-carbonitrilo
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazol + fenilpirrol.
Acción: sistémica.

Uso: fungicida (terápico para tratamiento de semillas).

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cebada	Hongos del suelo (*Penicillium spp.)* Hongos del suelo (*Fusarium spp.)* Hongos del suelo (*Alternaria spp.)* Mancha borrosa de la cebada (*Bipolaris sorokiniana)* Mancha en red (*Drechslera teres)*	200 - 360 cm3/100 kg de semilla	(*)	Aplicar sobre las semillas en forma de dilución.
Trigo	Carbón hediondo o Caries (*Tilletia caries)* Carbón volador (*Ustilago nuda)*	300 - 360 cm3/100 kg de semilla.		
	Damping-off (*Rhizoctonia spp.)* Fusariosis (*Fusarium graminearum)* Golpe blanco (*Fusarium graminearum)* Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)*	200 - 300 cm3/100 kg de semilla.		

(*) Se halla exento de período de carencia para el uso como terápico de semillas. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Información General:

Fungicida terápico para el tratamiento de semillas de trigo y cebada. Está especialmente diseñado para el control de enfermedades presentes en el suelo y en las semillas de trigo y cebada. Posee acción sistémica, siendo absorbido por la semilla y traslocado a través de la plántula.
Contiene en su formulación dos principios activos, con modos de acción complementarios. Difenoconazole, perteneciente al grupo de los triazoles, actúa inhibiendo el desarrollo subcuticular del micelio de los hongos y previniendo el desarrollo de los síntomas de las enfermedades. Posee propiedades sistémicas locales y capacidad traslaminar. Por otra parte, fludioxonil, perteneciente al grupo de los fenilpirroles, es un fungicida de contacto, amplio espectro y acción residual, que actúa interfiriendo el proceso de regulación osmótica de las membranas celulares de los hongos, lo que provoca la ruptura de las células.
En el cultivo de cebada controla Mancha en red (Dreschlera teres), Mancha borrosa de la cebada (Bipolaris sorokiniana) y Enfermedades de semillas y suelo (Alternaria spp., Fusarium spp., Penicillum spp.). En el cultivo de trigo, está especialmente recomendado para el control de Carbón volador (Ustilago tritici), Caries o Carbón hediondo (Tilletia caries), Fusariosis (Fusarium graminearum), Mancha amarilla (Drechslera tritici-repentis) y Damping off (Rhizoctonia sp).
No afecta el poder germinativo de las semillas de cebada y trigo, permitiendo su normal desarrollo.

Preparación:
Este producto se debe aplicar sobre las semillas en forma de dilución (slurry). La dilución se prepara agregando al producto agua limpia en cantidad necesaria hasta alcanzar un volumen de 1 litro de caldo cada 100 kg de semillas. Según la dosis a utilizar, la dilución deberá prepararse en las siguientes proporciones:
- 200 cm3 de producto + 800 cm3 de agua.
- 300 cm3 de producto + 700 cm3 de agua.
- 360 cm3 de producto + 640 cm3 de agua.

Para la preparación de la dilución (slurry), respetar las siguientes indicaciones:
- Añadir agua al recipiente en donde se preparará la mezcla hasta la mitad del volumen total.
- Agregar luego la cantidad necesaria de producto, según la cantidad de semillas a tratar.
- Agitar en forma mecánica o manual.
- Completar con agua hasta el volumen total de dilución.
- La dilución debe ser usada dentro de las 24 horas de preparada.
- Mantener la agitación durante todo el tiempo de uso.
- Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación
Suspensión concentrada para ser aplicada sobre las semillas de trigo y cebada. Para obtener una buena protección del cultivo, es indispensable distribuir el producto homogéneamente, asegurando que cada semilla quede cubierta en forma uniforme.

El tratamiento en trigo se puede realizar con tambor rotativo de eje excéntrico, mezcladora tipo hormigonera, máquina mezcladora con sinfín o máquinas de tratamiento continuo con picos pulverizadores.
NO aplicar directamente dentro de la sembradora. En el momento de la siembra, se debe calibrar la sembradora con semilla tratada, debido a que la misma fluirá más lentamente.

Restricciones de uso
Periodo de carencia: se halla exento de período de carencia para el uso como terápico de semillas. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Atención: la venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra está penada por la ley. La ley 18.073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados al consumo humano o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas), la ley dictamina el decomiso y multa. Piense que una sola bolsa de semilla curada mezclada en varios silos de granos para el consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa para la alimentación humana o animal, por lo tanto los infractores serán severamente penados.

Compatibilidad
Puede mezclarse con otros terápicos para tratamientos de semillas de reacción neutra. No es compatible con formulaciones basadas en solventes orgánicos. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad
No ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en el cultivo de trigo y cebada, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC) + 12 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No fumar ni comer durante el tratamiento de la semilla, ni durante la manipulación de semilla tratada. En preparaciones prolongadas y sin la debida protección puede irritar la piel.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiar la ropa de trabajo y lavarla inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón, especialmente las manos, la cara y la piel expuesta. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado. Limpiar el equipo aplicador, el lugar de trabajo y de almacenamiento de semilla tratada. Evitar el contacto con la semilla tratada.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50 >2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo):	DL 50 >2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL 50 >2,68 mg/m3
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Primeros auxilios
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para peces y organismos acuáticos:	Moderadamente tóxico

Por su uso como terápico de semillas, no se espera exposición para las abejas. Se deben respetar los cultivos y momentos de aplicación de esta etiqueta en forma estricta. Si es posible, retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de siembra.

Las semillas tratadas deben ser enterradas adecuadamente y quedar completamente cubiertas por el suelo. Las semillas sobrantes no deben ser usadas como alimento para animales. Si quedara semilla tratada, recogerla o enterrarla para evitar que sea ingerida por las aves u otros animales. Tomar la precaución de no contaminar las posibles fuentes de agua de animales y abejas.

Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.

NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza del equipo y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
DIVIDEND EXTRA	SYNGENTA AGRO	35533	FS	2,5% + 2,5%	III
NORBIZA EXTRA	SYNGENTA AGRO	40100	FS	2,5% + 2,5%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.