PARAQUAT DICLORURO + DIURON

Marcas comerciales: CERILLO - ODERIS.

Nomenclatura Química:
paraquat dicloruro: dicloruro de1,1´dimetil-4,4´bipiridilo
diuron: 3(3,4-diclorofenil)-1,1dimetilurea
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: bipiridilo + derivado de urea.
Acción: de contacto.

Uso: herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Barbecho de Cereales de Invierno	Raigrás anual (*Lolium multiflorum)*	2,5 l/ha + 25 cm3/100 litros de agua de coadyuvante alcohol graso etoxilado (RADAR®)	(*)	Uso como herbicida en barbecho.
Barbecho de Girasol Barbecho de Soja	Soja guacha (*Glicyne max)*	1,5 l/ha + 25 cm3/100 litros de agua de coadyuvante alcohol graso etoxilado (RADAR®) 2,5 l/ha + 0,4 - 0,8 l/ha de prometrina 50% + 25 cm3/100 litros de agua de coadyuvante alcohol graso etoxilado (RADAR®)		
	Flor de Santa Lucía (*Commelina erecta)* Parietaria, Ocucha (*Parietaria debilis)*	2,5 l/ha + 0,4 - 0,8 l/ha de prometrina 50% p/v + 25 cm3/100 litros de agua de coadyuvante alcohol graso etoxilado (RADAR®)		
Barbecho de Maíz	Bolsa del pastor (*Capsella bursa pastoris)* Capiquí (*Stellaria media)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Perejilillo (*Bowlesia incana)* Violeta silvestre (*Viola arvensis)*	1,5 l/ha + 0,5 - 1 kg/ha de atrazina 90% + 25 cm3/100 litros de agua de coadyuvante alcohol graso etoxilado (RADAR®)		
	Soja guacha (*Glicyne max)*	1,5 l/ha + 0,5 - 1 kg/ha de atrazina 90% + 25 cm3/100 litros de agua de coadyuvante alcohol graso etoxilado (RADAR®) 1,5 l/ha + 25 cm3/100 litros de agua de coadyuvante alcohol graso etoxilado (RADAR®)		
	Flor de Santa Lucía (*Commelina erecta)* Parietaria, Ocucha (*Parietaria debilis)* Trébol blanco (**) (*Trifolium repens)*	2,5 l/ha + 0,5 - 1 kg/ha de atrazina 90% + 25 cm3/100 litros de agua de coadyuvante alcohol graso etoxilado (RADAR®)		
	Brachiaria sp *(Urochloa panicoides)* Flor de Santa Lucía (***) (*Commelina erecta)* Grama carraspera *(Eleusine indica)* Malva blanca *(Sphaeralcea bonariensis)* Pasto colorado *(Echinochloa colona)*	2,5 l/ha + 25 cm3/100 litros de agua de coadyuvante alcohol graso etoxilado (RADAR®)		

	Rama negra (***) (*Conyza bonariensis)* Senecio (***) (*Senecio argentinus)* Siempre viva del campo (***) (*Gomphrena pulchella)* Yuyo colorado *(Amaranthus quitensis)* Yuyo colorado *(Amaranthus palmeri)*			
Barbecho de Trigo	Soja guacha (*Glicyne max)*	1,5 l/ha + 25 cm3/100 litros de agua de coadyuvante alcohol graso etoxilado (RADAR®) 1,5 l/ha + 5 g/ha de metsulfurón-metil + 25 cm3/100 litros de agua de coadyuvante alcohol graso etoxilado (RADAR®)		
	Bolsa del pastor (*Capsella bursa pastoris)* Capiquí (*Stellaria media)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Perejilillo (*Bowlesia incana)* Violeta silvestre (*Viola arvensis)*	1,5 l/ha + 5 g/ha de metsulfurón-metil + 25 cm3/100 litros de agua de coadyuvante alcohol graso etoxilado (RADAR®)		
	Trébol blanco (**) (*Trifolium repens)*	2,5 l/ha + 5 g/ha metsulfurón-metil + 25 cm3/100 litros de agua de coadyuvante alcohol graso etoxilado (RADAR®)		

(*) No se establece período de carencia por su uso posicionado como herbicida. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
(**) Control parcial
(***) Manejo "doble knock down":
Aplicación secuencial de glifosato 62 % p/v en mezcla con 2,4 D éster, seguido de una aplicación de paraquat dicloruro+ diuron dentro de los 7 a 14 días posteriores a la primera aplicación.
1° aplicación: glifosato 62 % 3,0 l/ha + 2,4 D éster 1,0 l/ha
2° aplicación: paraquat dicloruro+ diuron + coadyuvante alcohol graso etoxilado (RADAR®).

Información General:

Herbicida post-emergente para barbechos químicos de otoño y primavera, especialmente recomendado para el control de malezas como Commelina erecta, Parietaria debilis y Viola arvensis, entre otras. Para el control de Conyza bonariensis (rama negra), se recomienda utilizar la forma de manejo de "doble knock down".
Actúa solamente por contacto. Su acción es rápida y enérgica sobre el follaje o partes verdes de las plantas. Para lograr un buen resultado en el control de las malezas es importante que las mismas se encuentren en estado de activo crecimiento, con un tamaño adecuado y que se presenten buenas condiciones, tanto de humedad de suelo como de temperatura ambiente y humedad relativa.
Se inactiva en contacto con el suelo, o en agua con tierra en suspensión. Temperaturas inferiores a 13°C y días nublados retardan la actividad del producto, sin afectar su eficacia.

Preparación: suspensión concentrada.
Para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones:
- Agregar agua al tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su volumen.
- Poner a funcionar el sistema de agitación.
- Añadir la cantidad necesaria de producto, de acuerdo a la calibración realizada, directamente al tanque y sin disolución previa.
- Verificar la correcta dilución del producto.
- Luego agregar el coadyuvante alcohol graso etoxilado 48% (RADAR®), de acuerdo a las recomendaciones.
- Completar el tanque con agua hasta el volumen final.
- Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento.
- Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
- Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
-Utilizar siempre agua limpia.

Este producto es corrosivo para los metales. Las partes de metal de los equipos pulverizadores que estén expuestos al producto deberán ser lavadas con abundante agua inmediatamente después de su uso.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: debe ser aplicado en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 30-40 gotas/cm2 sobre las hojas de las malezas. Es indispensable realizar una

pulverización uniforme que cubra completamente las malezas. Por lo tanto, asegurarse que las boquillas estén en buen estado y que la barra del equipo pulverizador esté ajustada a una altura suficiente para garantizar una cobertura completa. Puede aplicarse con equipos terrestres de barra o botalón y picos para herbicidas (abanico plano). Aplicar un volumen de 150 a 200 l/ha de caldo, con 2.8 bar (40 lb/pulg2) de presión.

Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas.
Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento.
Evitar la superposición de franjas durante la pulverización.
Evitar la deriva hacia cultivos linderos.
NO realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.
NO utilizar aplicadores manuales de ultra bajo volumen.

Aditivos: para lograr la máxima eficacia, aplicar este producto acompañado de humectante no iónico (coadyuvante alcohol graso etoxilado 48%) en proporción de 0.025% v/v (25 cm3/100 litros de caldo).

Recomendaciones de uso:
Uso como herbicida en barbecho:
Está especialmente recomendado para el control de Commelina erecta, Parietaria debilis, Viola arvensis, Lamium amplexicaule, Bowlesia incana, Stellaria media y Capsella bursa-pastoris en barbechos de otoño y primavera. Se recomienda la aplicación del producto en mezcla con atrazina 90%, prometrina 50% o metsulfuron metil, incluyendo siempre coadyuvante alcohol etoxilado 50 %. Para lograr un buen resultado en el control de las malezas se recomienda siempre el empleo del producto sobre malezas en primeros estadios de crecimiento. Es importante que las mismas se encuentren en estado de activo crecimiento y que se presenten buenas condiciones, tanto de humedad de suelo como de temperatura ambiente y humedad relativa.

Para controlar malezas tolerantes al glifosato como rama negra (Conyza bonariensis), flor de Santa Lucía (Commelina erecta) y senecio (Senecio argentinus) se recomienda utilizar el producto bajo la técnica del "doble knock down". Esta forma de manejo consiste en una aplicación secuencial de herbicidas, utilizando glifosato 62 % en mezcla con 2,4 D éster seguido de una aplicación del producto dentro de los 7 a 14 días posteriores a la primera aplicación.

Restricciones de uso:
Rotaciones: este producto, al contener paraquat, es rápidamente fijado por las arcillas y la materia orgánica del suelo; como consecuencia, no tiene actividad residual en el suelo que pueda afectar a los cultivos posteriores o a la emergencia posterior de las malezas. Todos los cultivos de la rotación pueden ser sembrados inmediatamente después de la última aplicación de este producto. Sin embargo, al ser utilizado en mezcla, se debe tener en cuenta el producto acompañante para definir el cultivo posterior.

Período de carencia: no se establece período de carencia por su uso posicionado como herbicida. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
NO reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.
NO aplicar este producto a través de ningún equipo de riego.
NO utilizar aplicadores manuales de ultra bajo volumen.

Compatibilidad: es compatible con atrazina, prometrina y metsulfurón metil. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: todos los cultivos de la rotación pueden ser sembrados inmediatamente después de la última aplicación de este producto. Sin embargo, al ser utilizado en mezcla, se debe tener en cuenta el producto acompañante para definir el cultivo posterior. Respetar las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 22 (HRAC) + 5 (HRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma.
No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiar y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata): DL50: >2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo): DL50: >1038 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: >9,36 ± 1,48 mg/l

Moderado irritante ocular. Leve irritante dermal. No sensibilizante dermal.
La sustancia activa paraquat corresponde al grupo químico de los bipiridilos y la sustancia activa diuron al grupo de los derivados de la urea.

Antídoto: administrar en forma abundante y repetitiva una suspensión de tierra arcillosa para impedir la absorción.

Riesgos ambientales:
Extremadamente tóxico para peces.
Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad entre el área a tratar y el agua libre en superficie cercana. NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Moderadamente tóxico para abejas.
Retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de aplicación por un tiempo mínimo de 30 días. Si las colmenas no se pudieran retirar, entornar las piqueras o tapar las colmenas con bolsas húmedas durante la aplicación, retirando las bolsas pasada la misma. Evitar la aplicación en las horas de mayor actividad de las abejas. NO contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.
Moderadamente tóxico para aves.
Evitar la presencia de las mismas en el área de aplicación e impedir que tomen contacto con el producto.
Este producto es altamente persistente en el medio ambiente. NO aplicar, drenar o enjuagar el equipo utilizado cerca de forrajes y plantas deseables. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CERILLO	SYNGENTA AGRO	35088	SC	20% + 10%	II
ODERIS	SYNGENTA AGRO	40195	SC	20% + 10%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.