FLUOPICOLIDE + PROPAMOCARB

Marcas comerciales: INFINITO.

Nomenclatura Química:
fluopicolide: 2,6-dicloro-N-[[3-cloro-5-(trifluorometil)-2-piridinil] benzamida
propamocarb: carbamato de propil 3-(dimetilamino) propil clorhidrato.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: acylpicolide + carbamato.
Acción: sistémica con acción fungistática.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Alcaucil	Mildiu de la lechuga (*Bremia lactucae)*	250 cm3//hl	7	Aplicar preventivamente cuando las condiciones ambientales sean predisponentes para la aparición de la enfermedad o al observar los primeros síntomas. En caso de aplicaciones curativas, repetir tratamiento a los 14 días. Emplear un caudal mínimo de 600 l/ha cuando el cultivo está en su máximo desarrollo.
Cebolla	Complejo de hongos del suelo o Damping-off (*Phytium spp.)* Hongos del suelo, Damping off (*Phytophthora spp.)* Hongos del suelo, Damping off (*Rhizoctonia solani)* Mal de los almácigos, Damping off (*Fusarium oxysporum)*	Inmersión bandejas: 250 cm3/hl Riego por goteo: 1,5 - 2,0 l/ha Drench: 15 - 20 cm3/ 10 litros de agua		Aplicar preventivamente a los plantines antes de su transplante sumergiendo las bandejas en el caldo, entre 10-20 segundos, dependiendo del sustrato, procurando que el producto quede retenido en el pan de tierra y cuello de la planta. O bien al post-transplante, aplicar el producto al riego por goteo o planta por planta (drench) al suelo, alrededor del cuello. Repetir tratamiento cada 14 - 21 días.
	Mildiu del ajo y la cebolla (*Peronospora destructor)*	250 cm3//hl	21	Iniciar la aplicación ante la aparición de los primeros síntomas sobre las hojas. Repetir el tratamiento a los 10-14 días. No aplicar menos de 1,5 l/ha cuando el cultivo se encuentre en su estado de mayor desarrollo o bulbificación.
Lechuga	Complejo de hongos del suelo o Damping-off (*Phytium spp.)* Hongos del suelo, Damping off (*Phytophthora spp.)* Hongos del suelo, Damping off (*Rhizoctonia solani)* Mal de los almácigos, Damping off (*Fusarium oxysporum)*	Inmersión bandejas: 250 cm3/hl Riego por goteo: 1,5 - 2,0 l/ha Drench: 15 - 20 cm3/ 10 litros de agua		Aplicar preventivamente a los plantines antes de su transplante sumergiendo las bandejas en el caldo, entre 10-20 segundos, dependiendo del sustrato, procurando que el producto quede retenido en el pan de tierra y cuello de la planta. O bien al post-transplante, aplicar el producto al riego por goteo o planta por planta (drench) al suelo, alrededor del cuello. Repetir tratamiento cada 14 - 21 días.
	Mildiu de la lechuga (*Bremia lactucae)*	250 cm3//hl	7	Aplicar preventivamente cuando las condiciones ambientales sean predisponentes para la aparición de la enfermedad o al observar los primeros síntomas. En caso de aplicaciones curativas, repetir tratamiento a los 14 días. Emplear un caudal mínimo de 600 l/ha cuando el cultivo está en su máximo desarrollo.
Melón	Complejo de hongos del suelo o Damping-off (*Phytium spp.)* Hongos del suelo, Damping off (*Phytophthora spp.)* Hongos del suelo, Damping off (*Rhizoctonia solani)* Mal de los almácigos, Damping off (*Fusarium oxysporum)*	Inmersión bandejas: 250 cm3/hl Riego por goteo: 1,5 - 2,0 l/ha Drench: 15 - 20 cm3/ 10 litros de agua		Aplicar preventivamente a los plantines antes de su transplante sumergiendo las bandejas en el caldo, entre 10-20 segundos, dependiendo del sustrato, procurando que el producto quede retenido en el pan de tierra y cuello de la planta. O bien al post-transplante, aplicar el producto al riego por goteo o planta por planta (drench) al suelo, alrededor del cuello. Repetir tratamiento cada 14 - 21 días.
	Mildiu de las cucurbitáceas (*Pseudoperonospora cubensis)*	250 cm3/hl	3	Aplicar preventivamente cuando las condiciones ambientales sean predisponentes para la aparición de la enfermedad o al observar los primeros síntomas. En caso de aplicaciones curativas, repetir tratamiento a los 14 días. Emplear un caudal mínimo de 600 l/ha cuando el cultivo está en su máximo desarrollo.
Papa	Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)*	1,0 - 1,5 l/ha	7	Las aplicaciones deben iniciarse cuando las plantas tengan entre 10 y 15 cm de altura, de acuerdo a las condiciones predisponentes. Se recomiendan 2 a 3 aplicaciones consecutivas a partir de tuberización. Rango de dosis entre 1,0 a 1,2 l/ha a intervalos de 7 días entre aplicación, para ambientes con mayor presión de enfermedad. Rango de dosis de 1,2 a 1,5 l/ha para intervalos de aplicación de 14 días, para ambientes con menores presiones de enfermedad. Por su flexibilidad, INFINITO® también puede ser aplicado en etapas más tempranas del cultivo.

Pimiento	Complejo de hongos del suelo o Damping-off (*Phytium spp.)* Hongos del suelo, Damping off (*Phytophthora spp.)* Hongos del suelo, Damping off (*Rhizoctonia solani)* Mal de los almácigos, Damping off (*Fusarium oxysporum)*	Inmersión bandejas: 250 cm3/hl Riego por goteo: 1,5 - 2,0 l/ha Drench: 15 - 20 cm3/ 10 litros de agua		Aplicar preventivamente a los plantines antes de su transplante sumergiendo las bandejas en el caldo, entre 10-20 segundos, dependiendo del sustrato, procurando que el producto quede retenido en el pan de tierra y cuello de la planta. O bien al post-transplante, aplicar el producto al riego por goteo o planta por planta (drench) al suelo, alrededor del cuello. Repetir tratamiento cada 14 - 21 días.
	Tristeza o marchitamiento (*Phytophtora capsici)*	Riego por goteo: 1,5 - 2,0 l/ha Drench: 15 - 20 cm3/10 l Foliar: 250 cm3/hl	7	Comenzar las aplicaciones preventivamente al post-transplante, repitiendo el tratamiento cada 14-21 días. En aplicaciones de tipo Drench usar 40-50 cm3 de caldo al cuello de la planta.
Tabaco	Pudriciones de la raíz (*Pythium spp, phytophthora spp.)*	1,0 - 1,5 cm3/ha *	Excento	Campo: el producto debe ser aplicado de forma preventiva. Iniciar las aplicaciones después del trasplante a campo. Aplicar planta por planta en la base del tallo (Drench), asegurando un caldo total de 20 cm3 por planta. Utilizar la dosis mayor en caso de mayor densidad de plantación y/o mayor presión de enfermedad. Re-aplicar en caso de ser necesario.
		1,5 - 2,0 ml/ 10 m2		Floating: el producto debe ser aplicado de forma preventiva. Iniciar las aplicaciones después de la siembra en la bandeja. Aplicar el producto asegurando un caldo total de 10-12 litros/ 10 m2 de bandejas y luego aplicar 10-12 litros de agua/ 10 m2 de bandejas para asegurar que el producto descienda y se absorba por raíz. Almácigo convencional: el producto debe ser aplicado de forma preventiva. Iniciar las aplicaciones después de la siembra del almacigo. Aplicar el producto asegurando un caldo total de 20 litros/ 10 m2 y luego aplicar 20 litros de agua/ 10 m2 para asegurar que el producto descienda y se absorba por raíz.
Tomate	Complejo de hongos del suelo o Damping-off (*Phytium spp.)* Hongos del suelo, Damping off (*Phytophthora spp.)* Hongos del suelo, Damping off (*Rhizoctonia solani)* Mal de los almácigos, Damping off (*Fusarium oxysporum)*	Inmersión bandejas: 250 cm3/hl Riego por goteo: 1,5 - 2,0 l/ha Drench: 15 - 20 cm3/ 10 litros de agua		Aplicar preventivamente a los plantines antes de su transplante sumergiendo las bandejas en el caldo, entre 10-20 segundos, dependiendo del sustrato, procurando que el producto quede retenido en el pan de tierra y cuello de la planta. O bien al post-transplante, aplicar el producto al riego por goteo o planta por planta (drench) al suelo, alrededor del cuello. Repetir tratamiento cada 14 - 21 días.
	Tizón tardío (*Phytophtora infestans)*	250 cm3/hl	7	Aplicar preventivamente cuando las condiciones ambientales sean predisponentes para la aparición de la enfermedad o al observar los primeros síntomas. En caso de aplicaciones curativas, repetir tratamiento a los 14 días. Emplear una dosis mínima de 1,5 l/ha.
Zapallito de tronco	Mildiu de las cucurbitáceas (*Pseudoperonospora cubensis)* Tristeza o marchitamiento (*Phytophtora capsici)*		3	Aplicar preventivamente cuando las condiciones ambientales sean predisponentes para la aparición de la enfermedad o al observar los primeros síntomas. En caso de aplicaciones curativas, repetir tratamiento a los 14 días. Emplear un caudal mínimo de 600 l/ha cuando el cultivo está en su máximo desarrollo.
Zapallo	Complejo de hongos del suelo o Damping-off (*Phytium spp.)* Hongos del suelo, Damping off (*Phytophthora spp.)* Hongos del suelo, Damping off (*Rhizoctonia solani)* Mal de los almácigos, Damping off (*Fusarium oxysporum)*	Inmersión bandejas: 250 cm3/hl Riego por goteo: 1,5 - 2,0 l/ha Drench: 15 - 20 cm3/ 10 litros de agua		Aplicar preventivamente a los plantines antes de su transplante sumergiendo las bandejas en el caldo, entre 10-20 segundos, dependiendo del sustrato, procurando que el producto quede retenido en el pan de tierra y cuello de la planta. O bien al post-transplante, aplicar el producto al riego por goteo o planta por planta (drench) al suelo, alrededor del cuello. Repetir tratamiento cada 14 - 21 días.
	Mildiu de las cucurbitáceas (*Pseudoperonospora cubensis)* Tristeza o marchitamiento (*Phytophtora capsici)*	250 cm3/hl	3	Aplicar preventivamente cuando las condiciones ambientales sean predisponentes para la aparición de la enfermedad o al observar los primeros síntomas. En caso de aplicaciones curativas, repetir tratamiento a los 14 días. Emplear un caudal mínimo de 600 l/ha cuando el cultivo está en su máximo desarrollo.

* dosis referidas a un marco teórico de plantación de 20.800 plantas/ha.

Información General:

Es un fungicida selectivo de uso en papa que combina la actividad protectora del fluopicolide y las propiedades sistémicas y protectoras del propamocarb clorhidrato.

Fluopicolide es un fungicida sistémico (vía xilema, de forma acrópeta) perteneciente al grupo de los acylpicolides, con acción translaminar, con acción curativa y con función antiesporulante. Interrumpe la formación de la pared celular del patógeno.
Propamocarb es un fungicida sistémico perteneciente al grupo químico de los carbamatos. Interfiere en la síntesis de fosfolípidos y los ácidos grasos, interrumpiendo así la formación de la pared celular del hongo. Afecta el crecimiento del micelio, la producción y la germinación de las esporas. Actúa sobre hongos Ficomicetes (Pythium, Phytopthora, Peronospora, Pseudoperonospora y Bremia) que atacan raíces, cuello, base del tallo y hojas.
Es absorbido por las raíces, por lo que debe ser aplicado con el suelo húmedo o posterior a un riego, para lograr una buena profundización del producto hasta la zona radical.
En suelos ácidos la acción inicial es más lenta pero su residual es mayor (3 a 8 semanas) que en los alcalinos.

Preparación:
Está formulado como suspensión concentrada. Se aplica de manera preventiva ante la aparición de los primeros síntomas de tizón tardío de la papa, repetir los tratamientos cada 7 o 14 días, con la dosis de 1000 cm3 a 1500 cm3 del producto, según las condiciones predisponentes del ambiente para la infección de la enfermedad. Llene la pulverizadora con agua hasta la mitad de su volumen, agregue la cantidad necesaria del producto directamente en el tanque y complete el llenado con agua. Es recomendable mantener los agitadores o el retorno en actividad durante la preparación del caldo y la aplicación. Debe evitarse dejar el caldo preparado sin agitación, pues el producto puede precipitarse.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Puede ser aplicado con las pulverizadoras convencionales de bajo volumen, ya sean de arrastre como autopropulsadas, siempre que estén provistas de un agitador adecuado. En caso de no contar con este implemento, la bomba deberá ser capaz de producir un exceso de flujo, de modo de mantener una remoción constante a través del retorno. Puede ser aplicado una vez que aparezcan los primeros síntomas, una vez que el cultivo haya comenzado con su fase de tuberización. El intervalo entre aplicaciones dependerá de la presión de la enfermedad pudiendo efectuarse el tratamiento cada siete días o cada catorce días. Por su flexibilidad, también puede ser aplicado en etapas más tempranas del cultivo.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente (tierra, aserrín, turba, aglutinados de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. La destrucción debe realizarse en un sitio autorizado, de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 43 (FRAC) + 28 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Del producto formulado

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 2500 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria (rata):	CL50: > 3195 mg/m3
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización cutánea:	No sensibilizante dermal

Riesgos ambientales:
Ligeramente tóxico para aves. Moderadamente tóxico para peces. Se recomienda dejar una franja de seguridad de 5 metros entre el área a tratar y el agua libre en superficie cercana.
NO contaminar fuentes ni cursos de agua, aguas de riego ni receptáculos de agua.
NO contaminar fuentes de agua arrojando remanentes de caldos de pulverizaciones, limpieza de equipos ni envases de plaguicidas en acequias o ríos. Virtualmente no tóxico para abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
INFINITO	BAYER	35479	SC	6,25 + 62,5	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.