FENOXAPROP-P-ETIL + IODOSULFURON METIL SODIO

Nomenclatura Química:
Iodosulfuron Metil Sodio: Methyl 4 iodo 2 [3 (4 methoxy - 6 - methyl - 1, 3, 5, triazun - 2 - yl) ureidosulfurfonyl] benzoate, sodium salt.
Fenoxaprop p etil: (D+)-etil-2[4-(6-cloro-2-benzoxazolil-oxi)-fenoxi]-propanoato.
Clasificación Química: sulfonilurea + ariloxifenoxipropionato.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (postemergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Avena guacha, Cizznia, Avena negra, Avena invasora (*Avena fatua)*	800 - 1000 cm3/ha	60	80% de la población de Avena Fatue entre 2 y 4 hojas.
	Capiquí (*Stellaria media)* Cien nudos (*Polygonum aviculare)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabón (*Raphanus sativus)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)*			Hojas anchas de 2 a 4 hojas verdaderas.
	Ryegrass (*Lolium multiflorum)*			80% de la población de Rye Grass entre 2 y 4 hojas.

Información General:

Herbicida post emergente selectivo de uso en cereales, perteneciente al grupo de las sulfunilureas y los ariloxifonoxi-propionatos. Actúa sobre un amplio espectro de gramíneas y algunas dicotiledoneas.
Por su modo de acción interfiere a nivel de la síntesis de aminoácidos y la biosíntesis de lípidos.
Aunque tenga propiedades sistémicas via Floema/Xilema, su principal acción es foliar.
Los síntomas visibles de la acción del herbicida es deteniendo el crecimiento a los pocos días luego de su aplicación, apareciendo partes cloróticas seguido de manchas necróticas.
Las plantas susceptibles cesan el crecimiento casi inmediatamente después de la aplicación post-emergencia, y estarán totalmente muertas a las 4 o 6 semanas luego de su aplicación.

Momento de aplicación:
El producto puede ser aplicado tan rápido como comiencen a crecer las malezas. El período óptimo de control es cuando la mayoría de las malezas han emergido y están entre 2 hojas (para malezas monocotiledóneas) o primer par de hojas verdaderas (para malezas dicotiledoneas). De ésta forma se reduce la competencia de las malezas con el cereal.
Por su flexibilidad, también puede ser aplicado en una etapa más tardía de crecimiento de las malezas.
Recordar el concepto de supresión en el caso de Avena Fatua.
Advertencias:
- No aplique el producto a plantas bajo estrés debido a la falta o exceso de precipitaciones, y/o en condiciones de temperatura muy bajas (heladas) en estas condiciones las malezas son menos susceptibles a la acción del herbicida.
- No aplicar si se espera una lluvia dentro de las 4 hs de realizada la aplicación, ya que el control puede ser no satisfactorio.

Instrucciones de uso:
Este producto está formulado como suspensión concentrada. Llenar la pulverizadora con agua hasta la mitad de su volumen, agregue la cantidad necesaria de producto directamente al tanque y complete el llenado con agua. Es recomendable mantener los agitadores o el retorno en actividad durante la preparación del caldo y la aplicación. Debe evitarse dejar el caldo preparado sin agitación, pues el producto puede precipitarse.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Puede ser aplicado con las pulverizadoras convencionales de bajo volumen, ya sean de arrastre como autopropulsadas, siempre que estén provistas de un agitador adecuado. En caso de no contar con este implemento, la bomba deberá ser capaz de producir un exceso de flujo, de modo de mantener una remoción constante a través del retorno. Es importante lograr un correcto mojado de las malezas, con una distribución un uniforme de 30-40 gotas/cm2 con un coeficiente de variación menor a un 30%.
El volumen de aplicación deberá ser de 80-120 litros/ha, trabajando a una presión de 35ª 45 lib/pul2, con pastillas de abanico plano y ángulo de pastillas entre 80° y 110°. Debe evitarse toda posible deriva a cultivos cercanos sensibles al herbicida.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su disposición de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): A(HRAC) o 1(WSSA) + B (HRAC) ó 2 (WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Riesgos ambientales:
Toxicidad para aves: prácticamente no tóxcico.
Toxicidad para Peces: moderadamente tóxico.
Toxicidad para abejas: virtualmente no tóxico.

El patrón de uso planteado no presenta riesgos ambientales para peces, aves o abejas.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.