TRIFLOXISTROBIN + METALAXIL

Marcas comerciales: CREATE PRO SEMILLERO.

Nomenclatura Química:
trifloxistrobin: metoximino-{2-[1(3-trifluorometil-fenil-)-etilidenamino-oximetil]-fenil}-metiléster del ácido acético.
metalaxil:metil éster de N-(2,6-dimetilfenil)-N-(2'-metoxiacetil)-DL-alanina
Clasificación Química: estrobilurina + acilalanina.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: curasemillas fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Alternaria (*Alternaria spp.)* Antracnosis (*Colletotrichum spp.)* Fusariosis (*Fusarium spp.)* Hongo de la semilla (*Phomopsis sojae)* Hongos del suelo (*Rhizoctonia spp.)* Hongos del suelo (*Rhizopus spp.)* Hongos del suelo, Damping off (*Penicillium spp.)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Aspergillus spp.)* Mancha púrpura de la semilla (*Cercospora kikuchii)* Pythium (*Pythium spp.)*	40 cm3/100 kg de semilla + 20 cm3 Create Pro Max Semillero (prothioconazole 30%)/100 kg de semilla		La aplicación debe ser realizada con antelación a la siembra. Para lograr un mayor stand de plantas agregar 20 cm3 de Create Pro Max Semillero (prothioconazole 30%)/100 kg de semilla
Maíz	Alternaria (*Alternaria spp.)* Fusariosis (*Fusarium spp.)* Hongos de la semilla (*Cladosporium spp.)* Hongos del suelo (*Rhizoctonia spp.)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Aspergillus spp.)* Pythium (*Pythium spp.)*	33 a 66 cm3/100 kg semilla		La aplicación debe ser realizada con antelación a la siembra.
Alfalfa Lotus corniculatus Lotus tenuis Melilotus Trébol blanco Trébol rojo	Alternaria (*Alternaria spp.)* Fusariosis (*Fusarium spp.)* Hongos del suelo (*Rhizoctonia spp.)* Pythium (*Pythium spp.)*	130 cm3/ 100 kg de semilla		
Canola		250 cm3/100 kg semilla		
Maní	Aspergillus (*Aspergillus ssp.)* Fusarium (*Fusarium spp.)* Penicillium (*Penicillum spp.)* Pythium (*Pythium spp.)* Rhizopus (*Rhizopus spp.)* Rizoctonia (*Rhizoctonia spp.)*	40 cm3/100 kg de semilla + 20 cm3 Create Pro Max Semillero (prothioconazole 30%)/100 kg de semilla		La aplicación debe ser realizada con antelación a la siembra.
Algodón	Fusarium (Fusarium spp) Pythium (Pythium spp) Rizoctonia (Rhizoctonia spp),	80 cc / 100 kg de semilla		La aplicación debe ser realizada con antelación a la siembra. Utilizar siempre en combinación con Create Pro Max Semillero (Prothioconazole 30%) a dosis de 20 cc/100 kg de semilla

Información General:

Está compuesto por los ingredientes activos trifloxistrobin y metalaxil. Actúa en forma preventiva, curativa y erradicativa. Tiene acción sistémica y de contacto, controlando tanto las enfermedades que son diseminadas vía semilla, como aquellas presentes en el suelo. Permite un buen establecimiento del cultivo y controla aquellas enfermedades que desde la semilla provocan una disminución en el stand de plantas. Puede ser utilizado en forma preventiva y curativa.

Preparación:
El producto debe ser agregado al recipiente de mezclado del equipo para tratamiento de semillas. No necesita el agregado de agua para crear un slurry ya que su formulación es lista para usar.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Producto formulado para ser usado con equipos específicos para tratamiento de semilla. Es con ellos donde se logran los mejores resultados de aplicación. Cuando no se posea este tipo de tecnología puede usarse tambor curasemilla u hormigonera, cuidando en estos casos de obtener una buena distribución del producto entre semillas y en la semilla. No es recomendado el mezclado en la sembradora o el paleo. Realizar el tratamiento al resguardo de los rayos solares. Es importante que la semilla se encuentre clasificada, totalmente libre de tierra, polvo e impurezas y la incidencia de las enfermedades de semilla que se desean controlar, en ningún caso supere el 40%. Verificar fecha de vencimiento. Almacenar en lugares frescos (T° inferiores a 25°C). No exponer las semillas tratadas al sol.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra o arena para contener y adsorber el derrame. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 11 (FRAC) + 4 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protección respiratoria durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata) :	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 2,59 mg/l
Irritación dermal:	Levemente irritante
Irritación ocular:	Levemente irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Riesgos ambientales: prácticamente no tóxico para aves. No se espera exposición para peces ni abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CREATE PRO SEMILLERO	BAYER	36436	FS	7,69% + 6,15%	III