NOVALURON

Marcas comerciales: ADAMA RIMON SUPRA – QUESTOR.

Nomenclatura Química:
novaluron: 1-(3-cloro-4-(1,1,2-trifluoro-2-trifluorometoxietoxi)fenil)-3-(2,6-difluoro benzoil)urea
Tipo de producción: químico.
Clasificación Química: benzolfenilureas.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Algodón	Oruga de la hoja (*Alabama argillacea)*	100 a 150 cm3/ha	30	Al inicio del ataque cuando se observen 20 a 30 orugas pequeñas (de hasta 1,5 cm-L1, L2 y L3) por metro lineal de cultivo.
Durazno	Gusano del brote del duraznero (*Grapholita molesta)*	100 cm3/hl (*)	1	Comenzar con las aplicaciones cuando se observen los primeros brotes atacados, repitiendo el tratamiento cada 15-20 días. Realizar los tratamientos siguiendo las instrucciones de los servicios de alarma en caso que estos existan. No aplicar más de tres veces por temporada
Maíz	Oruga cogollera (*Spodoptera frugiperda)*	100 a 150 cm3/ha	30	Cuando la planta tiene de 6 a 8 hojas y se detectan 15 a 20% de los cogollos atacados. La plaga debe estar en los primeros estadios (L1 a L3).
Manzano Peral	Bicho canasto (*Oiketicus platensis)*	100 cm3/hl (*)	1	Aplicar al comienzo del nacimiento de las larvas teniendo en cuenta el Manejo Integrado de Plagas y las Buenas Prácticas Agrícolas. No aplicar el producto más de tres veces por temporada.
	Carpocapsa (*Cydia pomonella)*			Como ovicida: aplicar al inicio de los momentos de mayor oviposición. Como larvicida: se puede aplicar en cualquier momento dentro de un plan de rotación teniendo en cuenta el Manejo Integrado de Plagas y las Buenas Prácticas Agrícolas. No aplicar el producto más de tres veces por temporada.
Soja	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)* Oruga medidora (*Rachiplusia nu)* Oruga medidora (*Pseudoplusia includens)*	80 a 100 cm3/ha	30	Iniciar los tratamientos cuando se hayan encontrado 40 orugas ó más por muestreo en estadios larvales juveniles (L1- L2). No aplicar con ataques severos y estadios superiores a L2. Utilizar la dosis mayor cuando haya mayor presión de plaga.
	Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*	(**) 100 cm3/ha		(**)Iniciar los tratamientos cuando se hayan encontrado 10 orugas ó más por muestreo en estadios larvales juveniles (L1-L3). (**)No aplicar el producto solo con ataques severos y estadios superiores a L3.
		80 a 100 cm3/ha		Iniciar los tratamientos cuando se hayan encontrado 40 orugas ó más por muestreo en estadios larvales juveniles (L1- L2). No aplicar con ataques severos y estadios superiores a L2. Utilizar la dosis mayor cuando haya mayor presión de plaga.
Tomate	Polilla del tomate (*Scrobipalpula absoluta)*	30 - 50 cm3/hl	1	Cuando se observa el inicio del ataque (15 - 20 % de daño foliar). Aplicar 3 veces con intervalo de 7 a 10 días entre sí, con un volumen de agua de 1000 l/ha.

(*) Utilizar solo Adama Rimon Supra. Esta formulación solo debe utilizarse en frutales.
(**) Información correspondiente al producto formulado 10% Questor.

Información General:

Es un novedoso insecticida que se caracteriza por inhibir la formación de quitina sobre larvas de lepidópteros, coleópteros, homópteros y dípteros provocando así una deposición anormal de la endocutícula y produciendo la muerte de los insectos al momento de la muda.
Novalurón actúa principalmente por ingestión, aunque también ha mostrado cierta acción de contacto.
Posee un gran efecto ovicida, ejemplificado por el gran porcentaje de mortalidad de los primeros estadios que eclosionan de huevos puestos en el follaje pulverizado. También es supresor de la fecundidad de las hembras.
Dado que sólo los estadios inmaduros (larvas y ninfas) forman quitina, no afecta a los adultos.
No es sistémico, pero posee una gran acción residual en las partes aéreas de las plantas tratadas.
Para obtener la mayor eficacia del producto se recomienda un cuidadoso monitoreo de las plagas en los cultivos observando el grado de infestación para decidir el mejor momento de la aplicación de novaluron.
Por su alta selectividad y baja toxicidad para los enemigos naturales, novalurón es un producto adecuado para ser incorporado a los sistemas de Manejo Integrado de Plagas (MIP).
Es fundamental seguir las instrucciones de uso en cada cultivo con lo que se obtendrán los mejores resultados

Compatibilidad:
Es compatible con un gran número de insecticidas de uso común. No mezclar con materiales alcalinos pues reducen su eficacia. Para la mezcla con otros plaguicidas deben realizarse pruebas previas que demuestren la compatibilidad entre los productos y de la mezcla con el cultivo.

Derrames:
En caso de derrames cubra el producto con un material absorbente (ej.: tierra, arena, aserrín, aglutinante de productos químicos, etc.) y luego barra y recoja con una pala y coloque los desechos en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en plantas habilitadas para tal fin.
Limpiar el área afectada evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 15 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Mascara, guantes de nitrilo, ropa de trabajo tipo Tyvek, botas de goma, lentes de seguridad.

Información Toxicológica:

Del formulado EC 10%:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 5000 mg/kg

Irritación dermal: Leve irritante
Irritación ocular: Severo Irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Del formulado SC 10%:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 5000 mg/kg

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: No Irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Primeros auxilios: en caso de inhalación, se recomienda el trasladar a la víctima a un lugar con aire fresco. Procurar inmediata atención médica. Si fuera por ingestión, no inducir el vómito. Nunca administrar nada oralmente a una persona inconsciente. Lavar la boca con agua. Procurar inmediata atención médica.
Irritante para ojos y piel.
En contacto con la piel, quitar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua y jabón. Procurar inmediata atención médica.
En contacto con los ojos, lavar los ojos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Consultar inmediatamente con un especialista.
Antídoto: no existe un antídoto específico. Tratar sintomáticamente y dar terapia de soporte.

Riesgos ambientales:
Del formulado EC 10%:
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Ligeramente tóxico

Su persistencia/degradabilidad, vida media (t1/2) es desde 68-76 días en suelo.
No presenta bioacumulación en organismos acuáticos.

Del formulado SC 10%:
LD50 oral en aves: > 2000 ppm. Prácticamente no tóxico.
LC50 oral en peces (96 horas): >100 mg/l. Prácticamente no tóxico.
LD50 oral en abejas: > 100 ug/abeja. Virtualmente no tóxico.
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA RIMON SUPRA	ADAMA ARGENTINA SA	35067	SC	10%	IV
QUESTOR	FMC	36693	EC	10%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.